

3. Dane są następująca macierz i wektory:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -116.66654 & 583.33346 & -333.33308 & 100.00012 & 100.00012 \\ 583.33346 & -116.66654 & -333.33308 & 100.00012 & 100.00012 \\ -333.33308 & -333.33308 & 133.33383 & 200.00025 & 200.00025 \\ 100.00012 & 100.00012 & 200.00025 & 50.000125 & -649.99988 \\ 100.00012 & 100.00012 & 200.00025 & -649.99988 & 50.000125 \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -0.33388066 \\ 1.08033290 \\ -0.98559856 \\ 1.31947922 \\ -0.09473435 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -0.33388066 \\ 1.08033290 \\ -0.98559855 \\ 1.32655028 \\ -0.10180541 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 0.72677951 \\ 0.72677951 \\ -0.27849178 \\ 0.96592583 \\ 0.96592583 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_4 = \begin{bmatrix} 0.73031505 \\ 0.73031505 \\ -0.27142071 \\ 0.96946136 \\ 0.96946136 \end{bmatrix}.$$

Definiujemy $\mathbf{z}_i = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}_i$ dla $i = 1, 2, 3, 4$. Obliczyć $\|\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2\|$, $\|\mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_4\|$, $\|\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2\|/\|\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2\|$, $\|\mathbf{z}_3 - \mathbf{z}_4\|/\|\mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_4\|$. Zinterpretować otrzymane wyniki.

Zadanie rozwiązane za pomocą wzoru Shermana-Morrisona oraz funkcji solve z biblioteki numpy.linalg która rozwiązuje układ równań metoda LU.

```
import numpy as np
from numpy.linalg import norm
from numpy.linalg import solve
A=np.matrix([
[-116.66654,583.33346, -333.33308, 100.00012, 100.00012],
[ 583.33346, -116.66654, -333.33308, 100.00012, 100.00012],
[-333.33308, -333.33308, 133.33383, 200.00025, 200.00025],
[ 100.00012, 100.00012, 200.00025, 50.000125, -649.99988],
[ 100.00012, 100.00012, 200.00025, -649.99988, 50.000125
]])
b1=np.array([
[-0.33388066],
[ 1.08033290],
[-0.98559856],
[ 1.31947922],
[-0.09473435]
])
b2=np.array([
[-0.33388066],
[ 1.08033290],
[-0.98559855],
[ 1.32655028],
```

```

        [-0.10180541],
    ])
b3=np.array([
    [ 0.72677951],
    [ 0.72677951],
    [-0.27849178],
    [ 0.96592583],
    [ 0.96592583],
])
b4=np.array([
    [ 0.73031505],
    [ 0.73031505],
    [-0.27142071],
    [ 0.96946136],
    [ 0.96946136],
])
morison_mat=np.matrix([[1, 0, 0, 0, 1],
                        [0, 0, 0, 0, 0],
                        [0, 0, 0, 0, 0],
                        [0, 0, 0, 0, 0],
                        [1, 0, 0, 0, 1]])

def Morison(A,b1):
    Abis=A-morison_mat
    u=np.array([1,0,0,0,1])
    z=solve(Abis,b1)
    q=np.array([solve(Abis,u)])
    v=u.transpose()
    w=z-((v.dot(z))/(1+v.dot(q.transpose())))*q.transpose()
    return (w)

b=[b1,b2,b3,b4]
z=[]
for i in range(4):
    z.append(Morison(A,b[i]))
n=[]
n.append(norm(b1-b2))
n.append(norm(b3-b4))
n.append(norm((z[0]-z[1])/norm(b1-b2)))
n.append(norm((z[2]-z[3])/norm(b3-b4)))
print (n)

```

Rozwiązania:

$\|b1-b2\|=0.0099999889523588337$

$\|b3-b4\|=0.010000003094494577$

$\|z1-z2\|/\|b1-b2\|=0.001595176674760602$

$\|z3-z4\|/\|b3-b4\|=1003.7641153590034$