EQUISTASI

GUIDA PER IL PAZIENTE · DOLORE

Dolore cronico: come usare Equistasi®

Equistasi® è un dispositivo medico pensato per aiutarti a gestire il dolore cronico attraverso vibrazioni focali che stimolano la percezione del corpo, contribuendo a ridurre il dolore. Ecco come utilizzarlo in modo efficace.

1 Dove applicare i dispositivi

1 Sul punto doloroso


Applica il primo dispositivo dove senti il dolore più intenso.

2·3 Sui muscoli coinvolti

Applica gli altri due sui muscoli che sostengono il movimento dell'area dolorante: aiutano la percezione del corpo e riducono la tensione. Nell'app trovi i muscoli di ogni zona.

4 Sulla vertebra del metamero

Applica un dispositivo sulla vertebra del **metamero** collegato al distretto muscolare: premi le vertebre della zona e scegli la **più dolente** (ginocchio → L3-L4). Le trovi nell'app, sezione **Metamero e dermatomero**.



Esempio: dolore al ginocchio. 1 sul punto doloroso, 2 e 3 sui muscoli della coscia, 4 sulla vertebra L3-L4 (vista da dietro).

Come fissarlo: pulisci e asciuga bene la pelle (niente creme o oli) e fissa ogni dispositivo con il cerotto trasparente in dotazione, a contatto con la pelle.

2 Verifica se funziona

Dopo aver applicato i dispositivi, attendi circa **10 minuti**.

✓ Senti anche un leggero sollievo?
Significa che i punti scelti sono corretti.

↻ Nessun sollievo dopo 10–20 minuti?
Sposta i dispositivi su punti vicini, lungo i muscoli o sulla colonna.

Per un beneficio maggiore: regola i punti fino a trovare quelli che ti danno più sollievo; combinare punto di dolore e punti vicini può dare un sollievo più duraturo.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Equistasi S.r.l. · www.equistasi.com · info@equistasi.com
Rev. 1 – ottobre 2026 · pagina 1 di 2

3 Quanto tempo tenerlo

Prima applicazione	Lascia i dispositivi sul punto doloroso e sui muscoli **fino al giorno successivo**; toglili circa **un'ora dopo il risveglio**.
Dispositivo sulla vertebra	Inizia con **1 ora**; se serve, aumenta fino a **2 ore**.
Se il dolore è scomparso	Non serve continuare: quando il dolore ritorna, riapplica i dispositivi nello stesso modo.
Pausa settimanale	Per mantenere l'efficacia nel tempo fai una pausa di **almeno 2 giorni ogni settimana**. **L** **M** **M** **G** **V** S D

⚠ Quando togliere i dispositivi

- Toglili **anche prima** se senti un **fastidio di qualunque genere**: passa in pochi minuti dopo averli tolti.
- Durante l'applicazione il dolore iniziale può ridursi o scomparire e poi ripresentarsi come un **leggero fastidio**: è il momento di togliere i dispositivi. Il fastidio diminuisce rapidamente dopo la rimozione.
- Se avverti **nausea, mal di testa o capogiri**, togli subito i dispositivi e riprova il giorno successivo.

4 In sintesi



1. Un dispositivo sul **punto più doloroso**, due sui **muscoli** che sostengono la zona e uno sulla **vertebra** del metamero (1–2 ore).
2. Dopo **10 minuti** controlla: se non senti sollievo, sposta i dispositivi su punti vicini.
3. La prima volta tienili **fino al mattino dopo**; poi riapplica solo quando il dolore ritorna, con **2 giorni di pausa** a settimana.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.