EQUISTASI

GUIDA PER IL PAZIENTE · DOLORE

Dolore cronico: come usare Equistasi®


Equistasi® genera una stimolazione meccanica focale destinata a influenzare l'informazione propriocettiva. In alcune persone può associarsi a una modificazione della percezione dolorosa: la risposta è individuale. Ecco come utilizzarlo.

1 Dove applicare i dispositivi

1 Sul punto doloroso
Applica il primo dispositivo dove senti il dolore più intenso.

2·3 Sui muscoli coinvolti
Applica gli altri due sui muscoli che sostengono il movimento dell'area dolorante. Nell'app trovi i muscoli di ogni zona.

4 Sulla vertebra del metamero
Applica un dispositivo sulla vertebra del **metamero** collegato al distretto muscolare: premi le vertebre della zona e scegli la **più dolente** (ginocchio → L3-L4). Le trovi nell'app, sezione **Metamero e dermatomero**.



Esempio: dolore al ginocchio. 1 sul punto doloroso, 2 e 3 sui muscoli della coscia, 4 sulla vertebra L3-L4 (vista da dietro).

Come fissarlo: pulisci e asciuga bene la pelle (niente creme o oli) e fissa ogni dispositivo con il cerotto trasparente in dotazione, a contatto con la pelle.

2 Verifica se funziona

Dopo aver applicato i dispositivi, attendi circa **10 minuti**.

✓ Percepisci un eventuale beneficio?
I punti scelti sono adatti a te: la risposta è individuale.

↻ Nessun beneficio percepito dopo 10–20 minuti?
Sposta i dispositivi su punti vicini, lungo i muscoli o sulla colonna.

Risposta individuale: puoi regolare i punti fino a trovare quelli con cui percepisci un eventuale beneficio, anche combinando il punto di dolore con punti vicini.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Equistasi S.r.l. · www.equistasi.com · info@equistasi.com
Rev. 1 – ottobre 2026 · pagina 1 di 2

3 Quanto tempo tenerlo

Prima applicazione	Lascia i dispositivi sul punto doloroso e sui muscoli **fino al giorno successivo**; toglili circa **un'ora dopo il risveglio**.
Dispositivo sulla vertebra	Inizia con **1 ora**; se serve, aumenta fino a **2 ore**.
Se il dolore è scomparso	Non serve continuare: quando il dolore ritorna, riapplica i dispositivi nello stesso modo.
Pausa settimanale	Fai una pausa di **almeno 2 giorni ogni settimana**. **L** **M** **M** **G** **V** S D

⚠ Quando togliere i dispositivi

- Toglili **anche prima** se senti un **fastidio di qualunque genere**: passa in pochi minuti dopo averli tolti.
- Durante l'applicazione la percezione del dolore può modificarsi; se poi compare un **leggero fastidio**, è il momento di togliere i dispositivi. Il fastidio diminuisce rapidamente dopo la rimozione.
- Se avverti **nausea, mal di testa o capogiri**, togli subito i dispositivi e riprova il giorno successivo.

4 In sintesi



1. Un dispositivo sul **punto più doloroso**, due sui **muscoli** che sostengono la zona e uno sulla **vertebra** del metamero (1–2 ore).
2. Dopo **10 minuti** controlla: se non percepisci alcun beneficio, sposta i dispositivi su punti vicini.
3. La prima volta tienili **fino al mattino dopo**; poi riapplica solo quando il dolore ritorna, con **2 giorni di pausa** a settimana.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.