

Hekkefugler i skog

NO_BIRD_004

Økosystem: Skog
Egenskap: B1- Biologisk mangfold
Variabelverdi for 2024: 113,4 %
Usikkerhet (50% KI): 109,2 - 117,0

113,4 %

Om indikatoren

Indikatoren hekkefugler i skog måler utviklingen i bestandsstørrelsen til 24 vanlige fuglearter som er karakteristiske for skog, aggregert til en flerartsindeks (Multispecies Index, MSI). Indikatoren er basert på data fra Norsk hekkefugleovervåking og uttrykker endringer i fuglebestandene relativt til referanseåret 2010. Fugler er valgt som indikator fordi de er en sentral del av det biologiske mangfoldet, utfører viktige økosystemfunksjoner og reagerer på både naturlige og menneskeskapte påvirkninger. Indikatoren beskriver den komposisjonelle tilstanden i skogøkosystemet ved å vise om bestandene av typiske skogsfugler er stabile, økende eller avtakende.

Påvirkningsfaktorer

Indikatorverdien kan påvirkes av skogbruk, arealbruksendringer og andre forhold som endrer skogens struktur og kvalitet som leveområde. Hogst, kortere omløpstider, redusert forekomst av gammel skog, færre gamle og grove trær, mindre død ved og endringer i treslagssammensetningen kan påvirke tilgangen på hekkeplasser, skjul og næring. Habitatfragmentering, redusert landskapskonnektivitet og omdisponering av skogarealer kan også påvirke fuglebestandene. I tillegg kan endringer i forekomsten av insekter, frø og bær ha betydning for næringstilgangen. Klimaendringer kan påvirke bestandene gjennom endrede temperatur- og nedbørsmønstre, forskyvninger i hekkesesongen og endringer i artenes utbredelse og sammensetning. Fordi de 24 artene har ulike habitat- og næringskrav, kan påvirkningsfaktorene virke forskjellig på de enkelte artene.

Hvor kommer dataene fra?

Dataene kommer fra Norsk hekkefugleovervåking som er et landsdekkende overvåkingsprogram med om lag 500 faste telleruter fordelt over hele Norge og på tvers av ulike naturtyper.

Hvert år i hekkesesongen besøker feltobservatører rutene og registrerer alle fugler som sees eller høres ved faste tellepunkter etter en standardisert metode. Dataene kvalitetskontrolleres av NINA (Norsk institutt for naturforskning) og brukes til å overvåke utviklingen i bestandene til norske hekkefugler over tid.

Den brede geografiske dekningen og den årlige datainnsamlingen gjør datasettet godt egnet til å beskrive endringer i fuglebestandene på nasjonalt nivå over tid. Du kan lese mer om overvåkingen **her**.

Datagrunnlag

Datagrunnlaget omfatter 24 vanlige fuglearter som er faglig vurdert som tilknyttet skog:

- Trepiplerke (*Anthus trivialis*)
- Trekryper (*Certhia familiaris*)
- Flaggspett (*Dendrocopos major*)
- Svartspett (*Dryocopus martius*)
- Rødstrupe (*Erithacus rubecula*)
- Bokfink (*Fringilla coelebs*)
- Nøtteskrike (*Garrulus glandarius*)
- Gulsanger (*Hippolais icterina*)
- Toppmeis (*Lophophanes cristatus*)
- Gråfluesnapper (*Muscicapa striata*)
- Svartmeis (*Periparus ater*)
- Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*)
- Gransanger (*Phylloscopus collybita*)
- Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)
- Granmeis (*Poecile montanus*)
- Jernspurv (*Prunella modularis*)
- Dompap (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Fuglekonge (*Regulus regulus*)
- Munk (*Sylvia atricapilla*)
- Hagesanger (*Sylvia borin*)
- Rødvingetrost (*Turdus iliacus*)
- Svarttrost (*Turdus merula*)
- Måltrost (*Turdus philomelos*)
- Duetrost (*Turdus viscivorus*)

Usikkerhet


Indikatoren er basert på bestandsutviklingen til 24 vanlige skogsfuglarter og forutsetter at disse artene og overvåkingsrutene er representative for norske skogøkosystemer.

Usikkerheten er også knyttet til variasjon i observasjoner, værforhold, datadekning og statistisk usikkerhet. Den statistiske usikkerheten uttrykkes ved 50% konfidensintervall.

Siden indikatoren mangler økologiske referanse- og grenseverdier, bør den først og fremst tolkes som et mål på utvikling over tid og ikke som et absolutt mål på skogens økologiske tilstand.

Hvordan beregnes indikatoren og hvordan skal den tolkes?

For hver art beregnes årlige bestandsindekser som deretter aggregeres til én samlet indeks for skog. Indeksen er standardisert slik at verdien i 2010 er satt til 100, og indikatorverdien for 2024 beregnes som gjennomsnittet av de årlige indeksverdiene i en treårig periode (2022-2024). Høye og stabile verdier kan indikere positive utviklingstrekk for skogsfuglene, mens nedgang kan tyde på endringer i habitatkvalitet eller andre påvirkninger. Siden indikatoren ikke har økologiske referanse- eller grenseverdier, kan den imidlertid ikke alene brukes til å avgjøre om skogens økologiske tilstand er god eller dårlig.



Grønne punkter representerer hekkefugler i skog, og som figuren over viser har hekkefuglindikatoren svingt i overvåkingsperioden. Etter en nedgang rundt 2010-2013, viser kurven en oppadgående trend som lander på dagens verdi på 113,4%.

Dette betyr at den samlede hekkefuglbestanden i skog har økt med over 13% siden 2010.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes **her.**
(OBS: indikatorens kode er NO_BIRD_004)

Sist oppdatert: 19.10.2026

Miljø-direktoratet