

Strandsnipe
Av: Nik Borrow. Lisens: CC BY NC 2.0. Bildet er beskjært.

Vannfugl

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: B1 – Biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,77
Usikkerhet (50% KI): 0,74-0,80



Om indikatoren

Vannfugler hekker i nær tilknytning til innsjøer og er sårbare ovenfor menneskelig påvirkning. De regnes derfor som en god indikator på den helhetlige tilstanden i innsjøen fordi de er sårbare for særlig forurensing og habitatødeleggelser. Indikatoren baseres på 11 arter som representer ulike trofiske nivå. Jo høyere indikatorverdien er, jo nærmere er bestanden referansetilstanden og jo mindre påvirket er innsjøen.

Påvirkningsfaktorer

Vannfugler påvirkes av menneskelig aktivitet. Særlig forurensing som forringer leveområdene gjennom forurensing og fysiske inngrep som fører til at de mister leve- og hekkeområder.

Fuglearter som inngår i indikatoren

Planteetere	Mellomnivå-predatorer	Toppredatorer
Havelle	*Svartand*	*Kvinand*
Stokkand	*Smålom*	*Svømmesnipe*
Krikkand	*Storspove*	*Strandsnipe*
Siland		*Toppand*

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren for vannfugl er basert på bestandsindekser for elleve vannfuglarter som inngår i Naturindeks for Norge. Artene representerer ulike trofiske nivåer (planteetere, mellomrovdyr og toppredatorer), og artsgruppene vektes slik at hvert trofiske nivå bidrar likt til den samlede indikatoren. Datagrunnlaget kommer fra det nasjonale programmet for hekkefuglovervåking, og verdiene hentes fra Naturindeks-databasen. Indikatorverdien uttrykkes som forholdet mellom observert bestand og forventet bestand under referansetilstanden, definert som et intakt innsjø-økosystem i perioden 1961–1990. Verdien skaleres fra 0 til 1, der 1 tilsvarer referansetilstanden. Indikatoren kan oppdateres ved ny beregning av naturindeksen hvert 5. år.


Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet


Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Referansetilstanden for vannfuglindikatoren er definert som et intakt innsjøøkosystem i perioden 1961–1990. En indikatorverdi på 1 tilsvarer at bestandene av de elleve vannfuglartene er på samme nivå. Verdier mellom 0 og 1 uttrykker hvor stor andel av den forventede bestanden som gjenstår, mens verdier nær 0 indikerer sterkt reduserte bestander. Det er ikke gjort en vurdering av grenseverdi for god økologisk tilstand (X60).



Skaleringskurve for indikatoren.



Utviklingen av indikatorverdien for strandsnipe over tid.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsvarer en bestand av vannfugl med lik individtetthet som intakte innsjø-økosystem i perioden 1961-1990. Synkende verdi indikerer en proporsjonalt synkende bestand, altså vil 0,5 tilsi at individtettheten er halvert. Indikatorverdi på 0 tilsvarer en utdødd bestand.

Usikkerhet

De viktigste kildene til usikkerhet er knyttet til datagrunnlaget fra Naturindeks for Norge. Overvåkingsdataene representerer ikke nødvendigvis alle områder fullt ut, og utvalgsusikkerheten kan gjøre at indikatorverdiene ikke er helt representative for hele området. I tilfeller der ekspertvurderinger inngår, kan også skjønnsmessige feil påvirke resultatene.

Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet