

Konsentrasjon av fint svevestøv (PM2,5) i byer

NO_URAQ_002

Økosystem: Bebygd og opparbeidet areal
Variabelverdi for 2024: 5,47 µg/m^3

5.47 µg/m^3

Om indikatoren

Konsentrasjon av fint svevestøv (PM2.5) i byer gir et gjennomsnitt for svevestøv i utvalgte norske byer. Svevestøv PM2.5 består av svært små støvpartikler med en diameter på under 2,5 mikrometer som kan holde seg lenge i luften og transporteres over store avstander. Indikatoren beregnes som gjennomsnittlig årlig PM2.5-konsentrasjon innenfor bebygde og kunstige arealer i de største norske byene, basert på modellerte luftforurensningsdata. Byene som er inkludert i indikatoren:

- Oslo
- Bærum
- Lørenskog
- Nordre Follo
- Rælingen
- Bergen
- Trondheim
- Stavanger

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren beregnes ved å kombinere modellerte data for årlig gjennomsnittlig PM2,5-konsentrasjon fra Meteorologisk institutt. PM2,5-dataene er produsert ved hjelp av luftforurensningsmodeller som bygger på målinger fra norske luftkvalitetsstasjoner. Dataene foreligger som rasterkart med 100 meters oppløsning. Grunnkartet (nasjonalt grunnkart for arealanalyse) brukes til å avgrense arealer som tilhører økosystemtypen *bebygd areal og* inneholder byene nevnt over.

Hvordan bør indikatoren tolkes

Indikatoren brukes som et mål på luftkvalitet i urbane økosystemer. Høye konsentrasjoner av svevstøv reflekterer økt luftforurensning, som kan påvirke både mennesker, dyr og vegetasjon negativt. Partiklene kan avsettes på jord, vann og planter og bidra til forringelse av økosystemkvalitet gjennom påvirkning på biologiske prosesser og artsmangfold. Lavere verdier indikerer bedre luftkvalitet og dermed gunstigere miljøforhold i byøkosystemene.

Siden indikatoren ikke er skalert, betyr høyere verdier direkte høyere konsentrasjoner av svevestøv, og sier lite om økologisk tilstand.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes **her**

Påvirkningsfaktorer

Konsentrasjonen av PM2,5 påvirkes av utslipp fra veitrafikk, vedfyring, industri og annen forbrenning, samt av langtransportert luftforurensning. Værforhold som vind og nedbør påvirker også nivåene. Konsentrasjonen reduseres gjennom utslippskutt, renere energikilder, elektrifisering og gode spredningsforhold i atmosfæren.

Sist oppdatert: 16. oktober 2026

Miljø-direktoratet