

Ørret
Av: Per Harald Olsen/NTNU. Lisens: CC BY NC SA 3.0.


Ørret

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: B1 – Biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,78
Usikkerhet (50% KI): 0,74-0,82



Om indikatoren

Ørret er en fisk som gyter i elver og bekker, og finner næring i elver, innsjøer eller sjøen. Arten er utbredt over hele landet. Den er særlig sårbar for sur nedbør som kan føre til rekrutteringssvikt og høy dødelighet hos voksne individ. Rekrutteringen er også særlig følsom for vassdragsregulering siden Ørret primært gyter i elver og bekker. Effekter av sur nedbør og vassdragsregulering kan derfor påvises ved endringer i størrelses- og aldersfordeling. Bestander som opprettholder rekruttering, er dermed en indikator på god vannkvalitet og liten innvirkning fra fysiske inngrep i vassdraget.



Figur: Kart som illustrerer regionale indikatorverdier for 2024. Hentet fra Naturindeks.

Påvirkningsfaktorer

Ørret påvirkes av langtransportert luftforurensing som fører til sur nedbør. Økt utvasking av labilt aluminium bidrar til rekrutteringssvikt og økt dødelighet. Den påvirkes også av ulike fysiske inngrep som vassdragsregulering og igjenfylling, der disse ødelegger gyteområder og danner barrierer mellom gyte- og næringsområder.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren er basert på data samlet inn gjennom intervjuer og data fra 1000-sjøers undersøkelsen (NIVA), data fra overvåkingsprogrammer (Overvåking av kalkede vassdrag, Økostor, Økofersk) samt NINAs prøvefiskedata. Vurdering av hvor skadet en bestand er gjøres ut fra reguleringshøyden, forekomst av nye arter (særlig Gjedde og Ørekyt) i forhold til innsjøens størrelse, samt trender i overvåkningsdataene. Dataene rapporteres som en indeks fra 1 (ingen skader) til 0 (alle bestander tapt). Gjennomsnittlig tilstandsverdi ble beregnet for hvert fylke. Nedre og øvre grenseverdier (25- og 75-persentil) ble fastsatt basert på ekspertvurderinger, da dette ble ansett som den mest hensiktsmessige tilnærmingen for de skjevfordelte dataene.

Sist oppdatert: 15.10.2026


Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

For fastsetting av referanseverdier tas det utgangspunkt i naturtilstanden, dvs. ørretbestander som har blitt omtalt som «uskadet» i intervjuer, som er uregulert eller har en reguleringshøyde på under 1 meter, og som ikke inneholder skadelige fremmede fiskearter.

Fra vurderingen i 2015 har det blitt skilt på skadegrad: ubetydelig skadet (0,9), lite skadet (0,7), betydelig skadet (0,5), sterkt skadet (0,3) og svært fåtallig (0,1).



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid. Indikatoren har vært beregnet med ulik metodikk i ulike år. De kan derfor ikke sammenlignes eksakt på tvers av år. Punktene viser median med øvre og nedre kvartil.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 indikerer en bestand som har blitt omtalt som «uskadet» i intervjuer, som er uregulert eller har en reguleringshøyde på under 1 meter, og som ikke inneholder skadelige fremmede fiskearter. Lavere verdier indikerer at en eller flere av disse er forringet. Indikatorverdi på 0 indikerer en tapt bestand.

Usikkerhet

Usikkerheten i indikatoren skyldes først og fremst begrenset og ujevn datadekning mellom regioner, samt at datagrunnlaget kombinerer intervjuopplysninger, overvåkingsdata og ekspertvurderinger. Endringer i metode mellom indeksoppdateringer kan påvirke sammenlignbarheten over tid. For enkelte fylker mangler tilstrekkelige data, og usikkerheten er generelt størst i områder med svakt overvåkingsgrunnlag.

Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet