

Død ved. Foto: Ulrika J. Asplund

Dødvedmengde

Økosystem: Skog
Egenskap: B1 Biologisk mangfold


År: 2024

0,16

[0,15-0,17]

Om indikatoren

Død ved er viktig som livsmiljø og næringskilde for mange arter, særlig sopp og virvelløse dyr. Mengden død ved varierer naturlig mellom skogtyper avhengig av markas produktivitet, treslag og klimaforhold. Store mengder død ved er typisk for skog med naturlig dynamikk og anses å være positivt knyttet til økosystemtilstanden. Indikatorverdien indikerer stort avvik fra referansetilstanden, som skyldes at den totale mengden død ved er mye lavere enn det som forventes i upåvirkede skogøkosystemer.



Figur 1: Indikatorverdier for Norge og for landsdeler.

Påvirkningsfaktorer

Død ved dannes gjennom naturlige forstyrrelser som brann, flom, stormer og aldring av trær. Skogbruk, brannforebygging og opprydding etter forstyrrelser reduserer mengden død ved. Klimaendringer kan påvirke andelen død ved gjennom økt nedbrytning, men også gjennom økt produksjon av død ved.

Hvordan måles indikatoren


Dødvedmengde overvåkes i Landsskogtakseringen. For hver prøveflate registreres det samlede volumet av død ved per hektar, inkludert både liggende og stående død ved i ulike nedbrytningsstadier, og med diameter på minst 10 cm. Resultatene beregnes for perioder på fem år av gangen, fra 2010 og framover. Indikatorverdier er beregnet for fylker og delfylker og deretter aggregert til regioner og hele landet. Før resultatene aggregeres til regioner og for hele landet, skaleres verdiene opp mot fylkesvise skaleringsverdier.

Sist oppdatert: 01.10.2026

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstand og skalering

Den nedre skaleringsverdien, X_0, er satt til 0 m^3/ha død ved, mens den øvre skaleringsverdien, X_{100}, er fastsatt separat for hvert fylke eller delfylke. X_0 representerer en tilstand uten død ved. X_{100} representerer den best mulige tilstanden for dødvedmengde i lite påvirket skog, gitt treslag og markas produksjonsevne. Mellom X_0 og X_{100} er indikatorverdiene skalert lineært til en skala fra 0 til 1. Skaleringsverdiene er fastsatt med bruk av ekspertvurderinger støttet av data fra prøveflater i naturskogsnær skog.



Figur 2: Skaleringsfunksjoner er fastsatt for ulike fylker/delfylker, se Halbritter et al. 2026 for mer informasjon. Enheten for variabelverdien på x-aksen er volum død ved per hektar.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Les mer om skalering av indikatorer her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 betyr at volumet av død ved per hektar er minst like stort som forventet i referansetilstanden. Verdiene avtar mot null når volumet av død ved faller under den øvre skaleringsverdien.

Usikkerhet

Det er usikkerhet knyttet til beregningene av indikatoren for dødvedmengde. Det er usikkerhet knyttet til variasjon i dødvedmengde mellom prøveflater, måleusikkerhet og usikkerhet i skaleringsverdier. Denne usikkerheten er ikke kvantifisert. Den rapporterte usikkerheten representerer estimeringsusikkerhet og er beregnet ved å gjenta analysene med ulike utvalg av data.

Kilde

Halbritter, A. H., Framstad, E., Snoksrud, O., and Storaunet, K. O. 2026. Total deadwood (ID(s): NO_DWTO_001) v. 1.0.0.
ecRxiv: https://github.com/NINAnor/ecRxiv/tree/main/indicators/NO_DWTO_001

Anbefalt sitering

Bjørkvoll, E. & Kolstad, A. (red). 2026. Faktaark for dødvedmengde. Økologisk tilstand i skog for 2024. Norsk institutt for naturforskning.

Sist oppdatert: 01.10.2026