
Bilde: Heidi Solstad, Multiconsult

Naturindeks for åpent lavland


Økosystem: Åpent lavland
Egenskap: B1 - Biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,45
Usikkerhet (95% KI): 0,41 – 0,48



Om indikatoren

Naturindeks for åpent lavland beregnes som et vektet gjennomsnitt av 15 indikatorer for arter og økologiske funksjoner i naturlige og semi-naturlige åpne naturtyper. Indikatorene representerer blant annet primærprodusenter, nedbrytere, plantespisere, pollinatorer og fugler.

Naturindeksen reflekterer økologisk tilstand ved å vise hvor nær dagens biologiske mangfold er en referansetilstand med intakte økologiske prosesser. Høyere naturindeksverdi indikerer bedre tilstand for biologisk mangfold, mens lavere verdi tyder på større påvirkning fra blant annet arealendringer, gjengroing eller redusert skjøtsel.



Figur fra Naturindeks 2024

Hvordan måles indikatoren

Naturindeksen beregnes for hele Norge og for fem landsdeler (Nord, Midt, Vest, Sør og Øst). Hver indikator som inngår i indeksen gis en verdi mellom 0 og 1. 1 tilsvarer referansetilstanden, og 0 tilsvarer forringet tilstand. Alle indikatorene inngår til slutt i et gjennomsnitt, men hver indikator teller ikke likt. Det vil si at noen indikatorer gis høyere betydning, og derav vektes tyngre, om det er en nøkkelart, og hvilken funksjonell gruppe den tilhører.

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes av faktorer som endrer arealtilstand, artsmangfold og økologiske prosesser i åpne naturtyper. En av de viktigste påvirkningsfaktorene er opphør eller reduksjon av tradisjonell skjøtsel, som beite og slått. Dette kan føre til gjengroing med busker og trær, redusert areal av semi-naturlige naturtyper og tilbakegang for lyskrevende planter, pollinatorer og andre arter knyttet til åpne arealer.

Indikatorverdien påvirkes også av arealendringer og nedbygging, som kan redusere eller fragmentere leveområder. I tillegg kan endringer i landbruksdrift, gjødsling, fremmede arter og klimaendringer påvirke artssammensetning og naturtypenes tilstand.

Usikkerhet

Naturindeksen for åpent lavland er basert på en sammenstilling av 15 arter, artsgrupper og naturtypeindikatorer, og usikkerheten påvirkes både av kvaliteten på de underliggende dataene og av beregningsmetoden. Indikatorene bygger på overvåkingsdata, ekspertvurderinger og modellberegninger med ulik geografisk dekning, tidsoppløsning og datakvalitet. Ved beregning av naturindeksen skaleres indikatorene mot referanseverdier og vektes før de sammenstilles til én samlet indeksverdi. Usikkerhet knyttet til datagrunnlag, valg av referansetilstand, modellforutsetninger og vekting av indikatorene påvirker derfor resultatet. Små endringer over tid bør tolkes med varsomhet.

Basert på variasjonen i dataene, beregnes det et kvantitativt usikkerhetsestimat for naturindeksen (95% konfidensintervall, KI). For 2024 er dette 0,41 – 0,48.

På grunn av stort innslag av ekspertvurdering og vekting, er naturindeksen strengt tatt ikke i tråd med SEEA EA. Vi har likevel tatt den med på grunn av manglende andre indikatorer for åpent lavland.

15 arter, artsgrupper eller indikatorer inngår i indeksen:

- Fiskemåke (kyst)
- Tjeld
- Engvokssopper
- Jordtunger
- Køllesopper
- Praktrødspore
- Blåtopp i fuktig kystlynghei
- Karplanter i semi-naturlig eng
- Humler i åpent lavland
- Tilstand i kystlynghei
- Tilstand i semi-naturlig eng
- Prestekrage
- Purpurlyng
- Solblom
- Dagsommerfugler i åpent lavland

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

Endringer i naturindeksen kan tolkes som endringer i den samlede tilstanden for det biologiske mangfoldet i åpent lavland. En økning i indikatorverdien tyder på at tilstanden bedres, mens en nedgang kan indikere økende påvirkning på det biologiske mangfoldet.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes **her**

Sist oppdatert: 16. oktober 2026

Miljø-direktoratet