

Hvit Nøkkerose
Av: Finn Ervik. Lisens: CC BY NC SA 3.0. Bildet er beskjært.


Vannplanter som tåler næringsrikt miljø (TIc)

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,83
Usikkerhet (50% KI): 0,83-0,83



Om indikatoren

Vannplanter er planter som har sitt normale habitat i vann. Artssammensetningen, mengden av vannplanter og hvor dypt de kan vokse påvirkes av eutrofiering gjennom at økt mengde planteplankton i vannet reduserer lysforholdene. De brukes derfor som en indikator på økt næringsinnhold (eutrofiering) i innsjøer. En typisk endring vil være fra små saktevoksende arter til høyere hurtigvoksende arter med flytende blad.



Figur: Kart som illustrerer regionale indikatorverdier for ferskvannsbestanden i 2024. Hentet fra Naturindeks.

Påvirkningsfaktorer

Indikatoren er et mål på eutrofiering, som kommer av tilførsel av næringsstoffer, særlig nitrogen og fosfor. Menneskelig aktivitet som gjødsling i jordbruk øker mengden næringsstoffer i jordsmonnet og dermed mengden som vaskes ut i innsjøer og vannmagasin. En annen menneskelig kilde er utslipp av avløpsvann.

Hvordan måles indikatoren

Indeksen er basert på differansen i antall arter på en stasjon som er sensitive overfor eutrofiering og antall arter som er tolerante overfor slik påvirkning, relativt til totalantall arter som er til stede. Innsjøer og vannmagasiner som er del av overvåkingsprogrammer (Overvåking av kalkede vassdrag, Økostor, Økofersk), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Målinger registreres i vannmiljø og databaser hos NIVA. Samlet sett samles det inn nok målinger til å beregne regionale indikatorer årlig.


Sist oppdatert: 14.10.2026

Miljø-direktoratet


Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Innsjøer tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For vannplanter som trives i næringsrikt miljø r typene delt i 8 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstandskategoriene (DGVF 2025, tabell 4.5). Referanseverdien varierer mellom 69 og 95, og nedre grense for hva som kan regnes som god tilstand (nEQR > 0,6) varierer mellom 30 og 55.



Eksempel på skaleringskurve for indikatoren, her vist for svært kalkfattige, klare innsjøer.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid. Punktene viser median med øvre og nedre kvartil.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en fordeling mellom forekomst av arter som er sensitive for eutrofiering og arter som er tolerante for eutrofiering tilsvarende det som er forventet i vannforekomsten ved minimal menneskelig påvirkning. Synkende verdi reflekterer redusert andel arter som er sensitive for eutrofiering. En indikatorverdi på 0 tilsvarer ingen registrerte sensitive arter.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at bare en liten andel av de relevante innsjøene er tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av innsjøer ikke er tilfeldig. Innsjøene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Sist oppdatert: 14.10.2026

Miljø-direktoratet