

Parr av Småblank, en variant av Atlantisk laks.
Av: Per Harald Olsen/NTNU Lisens: CC BY SA 3.0. Bildet er beskjært.


Villaks

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: B1 – Biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,29
Usikkerhet (50% KI): 0,29-0,30



Om indikatoren

Indikatoren reflekterer tilstanden på norske villaksbestander gjennom bestandenes reproduksjonsevne, høstingspotensial og genetiske integritet. Villaks er valgt fordi arten er en nøkkelart i norske elver. En livskraftig og genetisk intakt laksebestand er avhengig av gode miljøforhold både i ferskvann og i havet. Indikatoren gir derfor et helhetlig mål på økologisk tilstand i laksevassdragene. Høye verdier indikerer bestander med normal produksjon og høstingspotensiale, mens lave verdier viser redusert bestandskvalitet og påvirkning fra menneskeskapte belastninger.



Regionale indikator-verdier for elver 2024

Påvirkningsfaktorer

Villaks påvirkes negativt av en rekke faktorer: Lakseoppdrett både gjennom spredning av lakselus og andre sykdommer samt genetisk forurensing fra rømt laks, klimaendringer, regulering av vassdrag, pukkellaks, lakseparasitten *Gyrodactylus*, sur nedbør, forurensing og overfiske.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren bygger på data fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), som vurderer tilstanden til norske villaksbestander gjennom kvalitetsnormen for villaks. Datagrunnlaget omfatter blant annet måloppnåelse for gytebestandsmål, høstingspotensial og genetisk integritet. Data hentes fra VRLs rapporter og tilhørende datasett, med supplerende informasjon om genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks og anadrom elvelengde. Variablene uttrykkes som prosentverdier, kategoriske tilstandsklasser eller omregnede nEQR-verdier på en skala fra 0 til 1. Flere sentrale variabler oppdateres årlig, mens den fullstendige kvalitetsnormvurderingen gjennomføres hvert femte år. Indikatoren dekker de fleste norske laksevassdrag med nåværende eller historiske bestander og er representativ for hele landet.

Sist oppdatert: 12.10.2026

Miljø-direktoratet


Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Referansetilstanden for villaks er gitt i Kvalitetsnormen for villaks. Verdien for gytebestand og høstingsnivå beregnes ut fra prosentvis oppnåelse av disse, der 100% er populasjonens naturlige størrelse i upåvirket miljø. Genetisk integritet kategoriseres ut fra registreringer av ulike hybrider, grad av genetisk innblanding og seleksjon.
Kategoriene følger de samme som vanndirektivet, og nedre grense for god tilstand er den samme i begge systemene.

		Gytebestandsmål og høstingspotensiale				
		Svært dårlig	Dårlig	Moderat	God	Svært god
Genetisk integritet	Svært dårlig					
	Dårlig					
	Moderat					
	God					
	Svært god					

Klassifiseringsmatrise for indikatoren.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

For at villaksbestanden i en elv skal få score 1, skal gytebestanden ha en produktivitet tilsvarende uforstyrrede forhold, overlevelse i sjø og retur til elven sikrer normal fangst, og gytebestanden skall ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Ved lavere score er minst en av disse forholdene forringet.

Usikkerhet

Usikkerheten i indikatoren er særlig knyttet til estimater av høstingspotensial og bestander vurdert med den forenklede klassifiseringsmetoden. Manglende data for genetisk integritet og bestandstilstand håndteres ved resampling og randomisering, noe som bidrar til usikkerhet i resultatene. I tillegg er det usikkerhet knyttet til valg av vekting mellom ulike vassdrag ved regional og nasjonal aggregering.

Sist oppdatert: 12.10.2026

Miljø-direktoratet