

# 정수 나누기 계산법

(The Integer Division Algorithm)



$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}$$

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z}$$

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t.}$$

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R$$

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$



$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence]

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$   
[Existence]      [Uniqueness]

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence]      [Uniqueness]

*ex)* 7

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

ex)  $7 \div 3 =$

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence]      [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence]      [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 +$$



$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

7

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 =$$

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2)$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2) \times$$

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2) \times (-3)$$

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2) \times (-3) +$$



$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2) \times (-3) + 1$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2) \times (-3) + 1, 0 \leq 1 < |-2|$$

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$   
[Existence] [Uniqueness]

$$\text{ex) } 7 = 2 \times 3 + 1, 0 \leq 1 < |2|$$

$$7 = (-2) \times (-3) + 1, 0 \leq 1 < |-2|$$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

[Start]

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let

[Start]

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

$\exists R \in S$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

$\exists R \in S \text{ s.t.}$



[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow$

[Start]

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x$

[Start]

$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Existence]

Let  $S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \dots\dots\dots (1)$

$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z}$$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t.}$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$



[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

Assume

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

Assume  $R \geq |B|$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x \mid x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right)$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) =$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B|$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| <$$



[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

$$\therefore R < |B| \quad \dots\dots\dots (3)$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

Assume  $R \geq |B|$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

$$\therefore R < |B| \quad \dots\dots\dots (3)$$

By (1), (2), (3)

$\therefore$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

$$\therefore R < |B| \quad \dots\dots\dots (3)$$

By (1), (2), (3)

$$\therefore \exists Q, \exists R \in \mathbb{Z}$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

Assume  $R \geq |B|$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

$$\therefore R < |B| \quad \dots\dots\dots (3)$$

By (1), (2), (3)

$$\therefore \exists Q, \exists R \in \mathbb{Z} \text{ s.t.}$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

Assume  $R \geq |B|$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

$$\therefore R < |B| \quad \dots\dots\dots (3)$$

By (1), (2), (3)

$$\therefore \exists Q, \exists R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R,$$

[Start]

$$\forall A, \forall B(\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Existence]

$$\text{Let } S = \{x | x = A - B \times n \geq 0, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\exists R \in S \text{ s.t. } x \in S \Rightarrow R \leq x \quad (\because S \subset \mathbb{N} \cup \{0\})$$

$$\exists Q \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } R = A - BQ \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Assume } R \geq |B|$$

$$A - BQ \geq |B|, \quad A - BQ - |B| \geq 0$$

$$A - B \left( Q + \frac{|B|}{B} \right) = A - BQ - |B| < A - BQ \quad \therefore \text{contradiction}$$

$$\therefore R < |B| \quad \dots\dots\dots (3)$$

By (1), (2), (3)

$$\therefore \exists Q, \exists R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$



[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

*Let*  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

*Let*  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

*Let*  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

*Let*  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

*Let*  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

$-|B| < R_2 - R_1 < |B|$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

*Let*  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

*Let*  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

Let  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

Let  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$

$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

Let  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

Let  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$

$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$

[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

Let  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

Let  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$

$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$

by (1), (2)



[Start]

$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$

[Uniqueness]

Let  $A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$

Let  $A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$

$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$

$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$

by (1), (2)

$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|$$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|, \quad |Q_1 - Q_2| < 1$$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|, \quad |Q_1 - Q_2| < 1$$

$$|Q_1 - Q_2| = 0$$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|, \quad |Q_1 - Q_2| < 1$$

$$|Q_1 - Q_2| = 0 \quad (\because Q_1, Q_2 \in \mathbb{Z})$$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|, \quad |Q_1 - Q_2| < 1$$

$$|Q_1 - Q_2| = 0 \quad (\because Q_1, Q_2 \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|, \quad |Q_1 - Q_2| < 1$$

$$|Q_1 - Q_2| = 0 \quad (\because Q_1, Q_2 \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore Q_1 = Q_2$$

[Start]

$$\forall A, \forall B (\neq 0) \in \mathbb{Z}, \exists! Q, \exists! R \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } A = BQ + R, \quad 0 \leq R < |B|$$

[Uniqueness]

$$\text{Let } A = BQ_1 + R_1, \quad 0 \leq R_1 < |B|$$

$$\text{Let } A = BQ_2 + R_2, \quad 0 \leq R_2 < |B|$$

$$-|B| < R_2 - R_1 < |B|, \quad |R_2 - R_1| < |B| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2, \quad B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

by (1), (2)

$$|B(Q_1 - Q_2)| = |R_2 - R_1| < |B|$$

$$|B||Q_1 - Q_2| < |B|, \quad |Q_1 - Q_2| < 1$$

$$|Q_1 - Q_2| = 0 \quad (\because Q_1, Q_2 \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore Q_1 = Q_2, \quad R_1 = R_2$$



Github:

<https://min7014.github.io/math20201204001.html>

Click or paste URL into the URL search bar,  
and you can see a picture moving.