낙 상 예 방

1 목적

노화로 인하여 깊이에 대한 인식이 저하되며, 시야가 좁아지고 색깔 구분이 둔해진다. 또한 자동차의 경적소리, 화재경보 등을 잘 듣지 못한다. 그리고 화재 시 타는 냄새를 잘 맡지 못하고 신경계의 변화로 반응시간이 지연되고 인지 능력이 감소 되어 사고에 취약하다.

낙상은 노인에게 흔히 발생하는데 낙상으로 인하여 찰과상과 타박상뿐만 아니라 골절과 같은 심한 상해를 입을 수 있다. 또한 한번 낙상을 경험한 노인은 낙상의 재발에 대한 공포로 활동을 꺼리게 되어 운동이 감소 되고 이로 인하여 사회적으로 고립되기 쉽다.

이와같이 노인은 환경적 위험요소에 영향을 많이 받으므로 안전한 환경을 유지하여 낙상과 사고로 인한 손상을 미리 예방하여야 한다.

2 낙상 위험요인

질병 요인	환경적 요인
· 신 경 계 : 치매, 우울증, 기면증, 간질, 파킨슨병 시각이상, 평형이상 말초신경병증 등 · 심혈관계 : 부정맥, 심근경색, 대동맥 협착증, 체위성 저혈압 등 · 소화기계 : 설사, 위장관 출혈 등 · 근골격계 : 골다공증, 퇴행성관절염 · 내분비계 : 갑상선질환, 저혈당 등	· 부적절한 조명, 번쩍이는 불빛 · 미끄러운 바닥 · 평편하지 않고 울퉁불퉁한 바닥 · 전화선, 전기코드 등과 같은 장애물 · 턱이 있는 문 · 손잡이가 없는 계단, 경사가 급한 계단, 디딤판이 좁은 계단 · 바닥에 어지르진 물건 · 규격에 맞지 않는 지팡이나 보조기구

3 낙상예방 환경정비

1) 노인생활 공간 공통사항

① 늘어진 줄이나 전기줄, 바닥 여기저기에 있는 방석이나 카펫을 치운다.

② 부득이 방바닥에 양탄자나 이불을 깔아야 한다면 가장자리를 잘 고정 시킨다.
③ 전화기, 의자나 탁자 등 조그만 가구는 되도록 벽 쪽 익숙한 장소에 둔다.
④ 바닥재는 코르크 등 덜 미끄럽고, 탄성이 있어 넘어졌을 때의 충격을 흡수할 수 있는 재질을 이용하는 것이 좋다.
⑤ 위험과 연결되는 장애물, 턱 등에 대하여 단차를 적게 한다.
⑥ 가구는 모서리가 둥근 형태의 것을 사용하고, 벽 및 가구 표면에는 뾰족한 못 등 날카로운 것이 없어야 한다.
⑦ 모서리가 곡선으로 처리된 가구를 사용하거나, 모서리 쿠션, 모서리방지 안전 가드 등을 부착한다.
⑧ 누워있거나, 잠든 동안에는 항상 침대난간을 올려 고정해둔다.
⑨ 바닥에 물이 떨어진 경우, 즉시 물기가 전혀 없을 때까지 닦는다.
⑩ 깨지기 쉬운 물건, 위험한 것들을 보관해두는 보관함 및 캐비닛을 설치하고 노인들이 열지 못하도록 잠금장치를 한다.

2) 의복 및 신발 착용

① 날씨가 추울 때는 가벼운 옷을 여러 겹 겹쳐 입어, 몸을 움츠려 균형 감각이 저하되지 않도록 한다. (노인시설 적정온도 및 습도 : 18℃～>22℃ / 40%～940%～970%)
② 슬리퍼 나 바닥이 미끄러운 신발은 신지 않는다.
③ 되도록 미끄럼방지 양말을 신는다.
④ 굽이 낮고 폭이 넓으며 미끄럽지 않은 고무바닥 뒤가 막힌 신발을 신는다.
⑤ 보행에 어려움이 있을 경우 보행 보조차 나 지팡이 등을 사용하도록 한다.

3) 조명활용

① 실내적정조도: 200～300 Lux 유지 편하게 책을 읽을 수 있고 그림자가 생기지 않을 정도의 밝기.
② 거실과 계단 현관 화장실은 항상 환하게 밝혀두거나 사람이 있을 때만 켜지는 센서등을 설치한다.
③ 자다가 한밤중에 일어날 때 켤 수 있도록 잠자리 옆에 미등을 마련해 둔다.

4) 화장실

① 벽과 변기 근처에 안전손잡이를 설치한다.

② 욕조안 과 욕실바닥에 미끄러지지 않도록 방수용 테이프를 붙이거나 미끄럼방지액을 도포한다.

③ 별도의 세면대와 목욕탕이 마련되어 있거나, 되도록 가까이 있는 것이 좋다.

5) 부엌

① 싱크대나 가스레인지 근처 바닥에는 미끄러지지 않도록 고무매트를 깔아 놓는다.

② 물을 엎지른 경우에는 즉시 닦는다.

4 낙상시 처치

- 노인이 낙상을 했을 경우 당황하지 말고 노인을 안정시킨다.
- 노인이낙상한 상황을 눈으로 확인하지 못했다면 의사를 표현할 수 있는 경우 상황을 묻고 무리하지 않고 가장 편안한 상태로 있게 한다.
- 통증이 심한 경우 억지로 구부리거나 펴려고 하지 않는다.
- 요양보호사는 간호사 등 응급보고 체계 윗단계로 보고한다.
- 가장 가까운 가족 및 보호자에게 사고 사실을 반드시 알린다.
- 간호사는 출혈이 있으면 지혈하고 환부를 부목 등으로 고정하고, 되도록 신속히 의료기관으로 옮긴다.

※ 다음의 경우 즉시 119안전센터 / 응급의료기관에 전화하도록 함.

- 넘어진 후에 의식이 없다면 무의식 내용을 참고한다.
- 발작 때문에 생긴 낙상인 경우
- 넘어진 뒤 일어나지 못하는 경우
- 심한 골절상태 이거나, 차량까지 안전하게 운반을 할 수 없는 경우
- 넘어진 직후 의식이 없었으나 얼마 지난 후 의식이 돌아온 경우
- 낙상으로 출혈이 심하거나 멍이 든 경우
- 낙상 후 엉덩이, 등허리부분, 손목에 통증이 심해지는 경우.
- 낙상의 원인이 의학적 문제이거나 약물부작용이라고 의심되는 경우