

Gebrauchsinformation: Information für Patienten
2LEBV Streukügelchen zur Entnahme aus Kapseln

Interleukin 1: 7-10CH; Interleukin 2: 7-10CH; Desoxyribonukleinsäure: 8-10CH;
Ribonukleinsäure: 8-10CH; Spezifische Nukleinsäure SNA-HLAI: 10-18CH; Spezifische
Nukleinsäure SNA-EBV: 10-18CH

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist 2LEBV und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 2LEBV beachten?
3. Wie ist 2LEBV einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist 2LEBV aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist 2LEBV und wofür wird es angewendet?

2LEBV ist ein homöopathisches Arzneimittel, das Zutaten enthält, die traditionell in der Mikro-Immuntherapie verwendet werden, als Zusatzstoff für die Immunregulierung bei vom Epstein-Barr-Virus (EBV) verursachten akuten oder chronischen Infektionen, die von einem Arzt diagnostiziert und einem Biologen bestätigt wurden.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 2LEBV beachten?

2LEBV darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie 2LEBV einnehmen.

Einnahme von 2LEBV zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel

einzunehmen. Bis zu diesem Datum sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Vermeiden Sie Arzneimittel auf Minzbasis eine Stunde vor der Einnahme des Arzneimittels.

Einnahme von 2LEBV zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es wird empfohlen, eine Stunde vor der sublingualen Einnahme die Einnahme von Minze oder Aufputzmitteln (Kaffee, Schokolade) zu vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

2LEBV hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

2LEBV enthält Saccharose

Bitte nehmen Sie 2LEBV erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist 2LEBV einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt entsprechend der medizinischen Verschreibung eine Kapsel pro Tag, unter Einhaltung der Nummernfolge der Kapseln.


Bei einer chronischen Infektion: eine Kapsel pro Tag, unter Einhaltung der Nummernfolge der Kapseln. Die Behandlungsdauer beträgt 4 bis 6 Monate.

Bei akuter Virusinfektion: eine Kapsel pro Tag, unter Einhaltung der Nummernfolge der Kapseln. Die Behandlungsdauer beträgt 1 bis 3 Monate.


Die Dosierung kann so lange auf zwei Kapseln pro Tag erhöht werden (unter Einhaltung der Nummernfolge), bis eine Verbesserung der Symptome eintritt. Die Behandlung kann auch länger fortgeführt werden, wenn der Arzt dies für notwendig hält.

Die Streukügelchen werden 15 bis 30 Minuten vor dem Frühstück nüchtern eingenommen. Wenn Sie die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie den Inhalt der Kapsel eine Stunde nach dem Essen ein.


Die Kapsel darf nicht als Ganzes geschluckt werden. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch:




1. Nehmen Sie eine der drei Blisterpackungen aus der Schachtel.



2. Nehmen Sie eine Kapsel unter Einhaltung der Nummernfolge.



3. Öffnen Sie die Kapsel sorgfältig, unter die während Sie den oberen Teil anheben. (*)



4. Schütten Sie den Kapselinhalt Zunge und lassen Sie diesen dort zergehen.

Bei der nächsten Einnahme befolgen Sie die Nummernfolge der Kapseln gemäß Beschriftung auf der Blisterpackung (2, 3, ...). Wenn die erste Blisterpackung leer ist, fahren Sie mit Kapsel 1 der nächsten Blisterpackung fort, bis die Schachtel leer ist.

Wenn Sie eine größere Menge von 2LEBV eingenommen haben, als Sie sollten

Nach den Grundsätzen der Homöopathie hängt die Wirkung von der Verdünnung und nicht von der Dosierung ab. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von 2LEBV eingenommen haben, sollte die Wirkung nicht stärker sein.

Wenn Sie eine größere Menge von 2LEBV eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von 2LEBV vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie sich bei der Einnahmereinfolge der Kapseln geirrt haben, oder wenn Sie die Einnahme einer Kapsel vergessen haben, fahren Sie ab der letzten Kapsel fort, die Sie eingenommen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Ausnahmefällen kann es zu einer Dyspepsie (Verdauungsstörung) bei der Einnahme auf nüchternen Magen kommen. In diesem Fall werden die Streukügelchen 1 Stunde nach dem Essen eingenommen.

Bei einer Einnahme nach 16 Uhr können Einschlafschwierigkeiten auftreten. Wie bei jeder homöopathischen Behandlung kann ein Gefühl der Verschlimmerung der Symptome auftreten, das normalerweise nach wenigen Tagen vergeht. Wenn dieses Gefühl fortbesteht, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine andere Reaktion beobachten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Brechen Sie die Behandlung nicht ohne Zustimmung Ihres Arztes ab.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über:

BELGIEN

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifieruneffetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

LUXEMBURG

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist 2LEBV aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Die ersten beiden Ziffern geben den Monat und die vier Folgenden das Jahr an. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was 2LEBV enthält

- Die Wirkstoffe sind:

Jede Sequenz von 5 Kapseln enthält:

Interleukin 1 (IL-1):	7-10CH
Interleukin 2 (IL-2):	7-10CH
Desoxyribonukleinsäure (DNS):	8-10CH
Ribonukleinsäure (RNS):	8-10CH
Spezifische Nukleinsäure SNA-HLAI:	10-18CH
Spezifische Nukleinsäure SNA-EBV:	10-18CH

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Streukügelchen: Saccharose

Kapseln: Gelatine, blauer Farbstoff (je nach Kapsel): Brillantschwarz BN (E151), schwarzes Eisenoxid (E172), Indigotin (E132), Opacifier: Titandioxid (E171).

Wie 2LEBV aussieht und Inhalt der Packung

2LEBV ist in Form von imprägnierter Streukügelchen.

Verabreichung: sublingual

Schachtel mit 30 Kapseln

Die Streukügelchen werden in Gelatinekapseln verpackt, wie unter Punkt 3 angegeben.

Diese Kapseln dürfen nicht eingenommen werden.

Die Kapseln sind in Al/PVC-Blisterpackungen mit 10 Kapseln verpackt.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

LABO'LIFE BELGIUM, GmbH. Aut 1507 H

Av. d'Ecolys 2 bte 36

5020 Namur, BELGIEN

Tel (32) (0)81 40 87 81 - Fax (32) (0)81 40 87 89

Hersteller:

LABO'LIFE ESPAÑA, S.A. No Reg.3.279 E

Av. des Raiguer 7

07330 Consell, SPANIEN

Zulassungsnummer:

Belgien: HO-BE517377

Großherzogtum Luxemburg: 2018060134

Abgabestatus

Verschreibungspflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12.2024.