

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Aciclovir Vectans Pharma 50 mg mucoadhäsive Buccaltabletten Aciclovir

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Aciclovir Vectans Pharma und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aciclovir Vectans Pharma beachten?
3. Wie ist Aciclovir Vectans Pharma anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aciclovir Vectans Pharma aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Aciclovir Vectans Pharma und wofür wird es angewendet?

Aciclovir Vectans Pharma enthält den Wirkstoff Aciclovir und gehört zu einer Virostatika genannten Arzneimittelgruppe.

Aciclovir Vectans Pharma wird zur Behandlung wiederholt auftretender Fieberblasen auf den Lippen (rekurrenter Herpes labialis), verursacht durch das Herpes-simplex-Virus, bei Erwachsenen mit ordnungsgemäß funktionierendem Immunsystem angewendet. Aciclovir Vectans Pharma sollte beim Auftreten der ersten Symptome (Brennen, Prickeln, Juckreiz) oder Anzeichen (Rötung, Schwellung) auf das Zahnfleisch aufgelegt werden.

Das Virus verursacht Blasen oder Geschwüre, vorwiegend auf den Lippen, manchmal aber auch in anderen Teilen des Gesichts. Die Virusinfektion kann aktiviert werden, wenn das Immunsystem geschwächt ist, z. B. durch Erkältungen oder andere Infektionen. Auch starke Sonneneinstrahlung, Stress oder Menstruation können die Symptome auslösen.

Aciclovir Vectans Pharma hemmt die Fähigkeit des Virus, sich zu vermehren, und reduziert so die Infektion.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser fühlen oder sich Ihre Symptome nicht gebessert haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aciclovir Vectans Pharma beachten?

Aciclovir Vectans Pharma darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Aciclovir oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie allergisch gegen Milch oder Milchderivate sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Aciclovir Vectans Pharma kann versehentlich verschluckt werden. Wenn Aciclovir Vectans Pharma versehentlich verschluckt wird, wird empfohlen, ein Glas Wasser zu trinken.
- Sprechen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt, wenn Sie (aufgrund einer anderen Erkrankung mit Einfluss auf das Immunsystem, zum Beispiel AIDS) ein schwaches Immunsystem haben oder sich einer Behandlung mit Einfluss auf das Immunsystem unterziehen (zum Beispiel Immunsuppressiva). Aciclovir Vectans Pharma sollte in diesem Fall nicht angewendet werden.
- Wir wissen nicht, ob Aciclovir Vectans Pharma wirkt, wenn es angewendet wird, nachdem bereits Blasen erschienen sind. Daher sollten Sie Aciclovir Vectans Pharma anwenden, sobald Sie die ersten Symptome von Fieberblasen fühlen (Juckreiz, Rötung oder Prickeln).

Kinder und Jugendliche

Dieses Arzneimittel sollte bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Aciclovir Vectans Pharma zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben, oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Anwendung von Aciclovir Vectans Pharma zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nachdem Sie Aciclovir Vectans Pharma auf das Zahnfleisch aufgelegt haben, können Sie normal essen und trinken.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aciclovir Vectans Pharma darf während der Schwangerschaft und der Stillzeit angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel hat keinen Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Aciclovir Vectans Pharma enthält Lactose (Milchproteinkonzentrat mit Spuren von Lactose) und Natriumlaurylsulfat.

Bitte wenden Sie Aciclovir Vectans Pharma erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit (z. B. gegenüber Lactose) leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 5,2 mg Natriumlaurylsulfat pro Tablette.

Natriumlaurylsulfat kann lokale Hautreaktionen (wie ein stechendes oder brennendes Gefühl) hervorrufen oder Hautreaktionen verstärken, die durch andere auf dieselbe Hautstelle aufgetragene Produkte verursacht werden.

3. Wie ist Aciclovir Vectans Pharma anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis ist eine einzige Tablette Aciclovir Vectans Pharma.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Dieses Arzneimittel sollte bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden

ACICLOVIR VECTANS PHARMA DARF NICHT GESCHLUCKT WERDEN.

Wenn Sie es versehentlich schlucken, trinken Sie ein Glas Wasser.

Hinweise zur korrekten Anwendung

Dieses Arzneimittel sollte auf das obere Zahnfleisch aufgelegt werden, unmittelbar über einem Vorderzahn, sobald die ersten Symptome oder Anzeichen von Fieberblasen auftreten (Juckreiz, Rötung oder Prickeln):

- Suchen Sie vor dem Auflegen der Tablette die richtige Stelle am oberen Zahnfleisch, über dem Vorderzahn.
- Legen Sie die Tablette unmittelbar, nachdem Sie sie aus der Blisterpackung genommen haben, mit einem trockenen Finger auf. Sie werden sehen, dass die Tablette eine gerundete Seite und eine flache Seite mit der Prägung „AL21“ hat.
- Es ist angenehmer, die gerundete Seite auf das obere Zahnfleisch zu legen, aber beide Seiten sind möglich.
- Bei einem trockenen Mund wird empfohlen, vor dem Auflegen der Tablette etwas Wasser zu trinken, um das Zahnfleisch zu befeuchten. Die Tablette kann verwendet werden, wenn sie statt am Zahnfleisch an der Innenseite der Lippe klebt.

Nach dem Auflegen bleibt die Tablette an ihrer Position und löst sich im Laufe des Tages allmählich auf.



Wie ist Aciclovir Vectans Pharma aufzulegen?

Fixieren Sie die Tablette, indem Sie mit Ihrem Finger 30 Sekunden lang außen auf Ihre Lippe drücken, damit sie haften bleibt.



Nachdem Aciclovir Vectans Pharma aufgelegt wurde, können Sie normal essen und trinken. Sie dürfen nicht auf der Tablette saugen, sie kauen oder schlucken.

Alle Situationen, die das Anhaften der Tablette beeinträchtigen könnten, sind zu vermeiden:

- Eine bereits aufgelegte Tablette berühren oder darauf drücken.
- Kaugummi kauen.
- Tagsüber Ihre Zähne putzen, während die Tablette aufgelegt ist.

Wenn dieses Arzneimittel nicht anhaftet oder sich innerhalb der ersten 6 Stunden ablöst, sollte dieselbe Tablette sofort wieder aufgelegt werden. Wenn die Tablette nicht wieder aufgelegt werden kann, sollte eine neue Tablette aufgelegt werden.

Wenn Sie versehentlich eine Tablette Aciclovir Vectans Pharma schlucken, trinken Sie ein Glas Wasser.

Wenn die Tablette innerhalb der ersten 6 Stunden nach dem Auflegen geschluckt wird, sollte sie einmalig ersetzt werden.

Wenn sich Aciclovir Vectans Pharma nach 6 Stunden löst oder versehentlich geschluckt wird, sollte die Tablette nicht ersetzt werden.

Die Form der Tablette kann sich durch die Aufnahme von Speichel verändern, um sich an die Form Ihres Zahnfleisches anzupassen.

Wenn Sie eine größere Menge von Aciclovir Vectans Pharma angewendet haben, als Sie sollten Sie sollten sich sofort an Ihren Arzt oder Apotheker wenden, obwohl das Risiko einer Überdosis angesichts der geringen Resorption von Aciclovir ins Blut nach der Anwendung von Aciclovir Vectans Pharma niedrig ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Aciclovir Vectans Pharma haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen:

Häufige Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 10 Personen betreffen):

- Kopfschmerzen
- Schmerzen an der Anwendungsstelle

Gelegentliche Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 100 Personen betreffen):

- Schwindel
- Übelkeit
- Reizung an der Anwendungsstelle
- Aphthe
- Zahnfleischschmerzen
- Rötung

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Aciclovir Vectans Pharma aufzubewahren?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Nicht über 30 °C lagern.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf der Blisterpackung nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Aciclovir Vectans Pharma enthält

- **Der Wirkstoff ist:** Aciclovir. Jede mucoadhäsive Buccaltablette enthält 50 mg Aciclovir.
- **Die sonstigen Bestandteile sind:** Hypromellose, Milchproteinkonzentrat mit Spuren von Lactose, Natriumlaurylsulfat, Magnesiumstearat, mikrokristalline Cellulose, Povidon, hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie Aciclovir Vectans Pharma aussieht und Inhalt der Packung

- Dieses Arzneimittel ist eine 8 mm große mucoadhäsive Buccaltablette, weiß bis hellgelb, mit einer gerundeten Seite und einer flachen Seite mit der Prägung „AL21“.
- Jede Karton-Faltschachtel Aciclovir Vectans Pharma enthält 1 oder 2 Einzeldosis-Blisterpackung(en) mit 1 Tablette.

Pharmazeutischer Unternehmer

Vectans Pharma
230 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex - Frankreich

Hersteller

Farméa
10 rue Bouché Thomas
ZAC d'Orgemont
49 000 Angers - Frankreich

Zulassungsnummer

BE663445

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien : Aciclovir Vectans Pharma
Bulgarien : Klivis
Deutschland, Portugal, Spanien : Sitavig
Kroatien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Tschechien, Rumänien, Slowakei : Bravilon
Österreich : HerpesMed
Polen : Aciclovirum Vectans
Schweden, Luxemburg, Niederlande, Island : Virono
Slowenien : Vopir

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 11/2024