

# INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

**ALK Soluprick Positiv kontrol, 10 mg/ml,  
opløsning til priktest**  
Histamin dihydroklorid

og

**ALK Soluprick Negativ kontrol, opløsning til priktest**

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her

## **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol
3. Sådan skal De bruge ALK Soluprick Positiv kontrol og ALK Soluprick Negativ kontrol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

## **1. Virkning og anvendelse**

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol er opløsninger til priktest.

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol anvendes kun til diagnostisk brug. De benyttes til priktest med det formål at bestemme, hvilke stoffer som er årsag til Deres allergiske reaktion.

ALK Soluprick Negativ kontrol medfører ingen reaktion. Histamin dihydroklorid i ALK Soluprick Positiv kontrol fremkalder en vabel og rødme af huden som et positivt resultat, dette viser lægen, at priktesten virker. Disse tests er specielt vigtige, hvis De har anvendt medicin, som formindsker følsomheden overfor priktest, f.eks. antihistaminer, visse præparater mod depression eller stærke steroid præparater til udvortes brug.

Lægen kan ha givet Dem ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol til noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## **2. Det skal De vide, før De begynder at bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol**

### **Brug ikke ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol**

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for histamin dihydroklorid eller et af de øvrige indholdsstoffer .
- hvis De har hudproblemer i området, hvor priktesten skal bruges.
- hvis De er overfølsom (allergisk) over for phenol.

Informér Deres læge hvis et eller flere af punkterne ovenfor gælder for Dem.

### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Vær ekstra forsigtig med at bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

- hvis De lider af eksem i det aktive stadie eller anden hudlidelse i området, hvor priktesten skal udføres
- hvis De har fået fjernet lymfeknuder i armhulen
- hvis Deres almentilstand er alvorligt svækket på grund af sygdom

Visse lidelser kan påvirke resultaterne af priktesten, derfor: Informér Deres læge eller andet sundhedspersonale, før priktesten udføres, hvis De har nogen af ovenfor anførte lidelser.

### **Brug af anden medicin sammen med ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol**

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Visse lægemidler kan påvirke resultaterne af priktesten, derfor: Informér Deres læge eller øvrigt sundhedspersonale, før priktesten udføres, hvis De tager nogen af følgende lægemidler:

- Korttidsvirkende antihistaminer indenfor de seneste 2 til 3 dage
- Langtidsvirkende antihistaminer indenfor de seneste 8 uger
- Medicin, som indeholder hydroxizin indenfor de seneste 2 uger
- Medicin, som indeholder ketotifen indenfor de seneste 2 uger
- Tricykliske antidepressive midler indenfor de seneste 2 uger
- Kortikosteroider (steroider) i doser mindre end 30 mg prednison eller prednisolon pr. dag i mere end 1 uge
- Glykokortikoider (steroider) i doser højere end 10 mg prednisolon pr. dag

- Stærke steroid præparater til udvortes brug påført huden indenfor de seneste 2 til 3 uger

### **Graviditet og amning**

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

De kan få foretaget en priktest, hvis De ammer.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol har ingen kendt negativ påvirkning af evnen til at køre bil eller bruge maskiner.

## **3. Sådan skal De bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol**

Deres læge eller anden sundhedspersonale udfører priktesten. Fremgangsmåden er som følger:

- Priktesten udføres normalt på indersiden af underarmen. Alternativt kan testen foretages på Deres ryg.
- Deres hud skal være tør og ren og kan desinficeres med sprit af sygeplejersken eller lægen.
- Testopløsningerne, ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol, påføres som dråber på huden med passende afstand
- Lægen eller sygeplejersken prikker gennem dråberne på huden med en ALK lancet
- Reaktionen aflæses efter 15 minutter. En positiv reaktion er en lille hævelse eller blære med rød kant.

## **4. Bivirkninger**

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

ALK Soluprick Positiv kontrol vil give de forventede lokale reaktioner forbundet med histaminen. Efter testen vil den positive kontrol frembringe en vabel som kan være omgivet af rødme og klø. I visse tilfælde kan en let smerte forekomme.

I ekstremt sjældne tilfælde kan der forekomme en anafylaktisk reaktion (en alvorlig reaktion i hele kroppen, der ses som blærer, kløe, vejrtrækningsbesvær og besvimelse) efter priktest med aktive allergener. Derfor har Deres læge det nødvendige beredskab

umiddelbart tilgængeligt, herunder en adrenalinsprøjte klar til brug.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)  
E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. Opbevaring**

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Klinikken/hospitalet opbevarer priktest-opløsningen.
- Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)
- Anvend ikke ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned..
- ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol må anvendes op til 6 måneder efter anbrud

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

### **ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol indeholder:**

Aktivt stof ALK Soluprick Positiv Kontrol: histamin dihydroklorid 10 mg/ml

Der er intet aktivt stof i ALK Soluprick Negativ kontrol.

Øvrige indholdsstoffer i ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol:

Phenol  
Glycerol  
Natriumchlorid

Dinatriumphosphatdihydrat  
Natriumdihydrogenphosphat dihydrat  
Vand til injektionsvæsker  
Natriumhydroxid eller saltsyre (til pH justering)

### Udseende og pakningsstørrelser

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol leveres i et hætteglas af glas med 2 ml klar opløsning.  
Hætteglasset er lukket med en gummiprop og et skruelåg.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ALK Abelló A/S  
Bøge Allé 6-8  
DK-2970 Hørsholm  
Danmark

### Fremstiller:

ALK-Abelló S.A.  
Miguel Fleta 19  
E-28037 Madrid  
Spanien

### Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig	ALK Prick Positiv Kontrolle	ALK Prick Negativ Kontrolle
Belgien	Hollandske: Soluprick Positieve controle Franske: Soluprick Contrôle Positif Tyske: Soluprick Positiv Kontrolle	Hollandske: Soluprick Negatieve controle Franske: Soluprick Contrôle Négatif Tyske: Soluprick Negativ Kontrolle
Estland	Soluprick Positiivne kontroll	Soluprick Negatiivne kontroll
Frankrig og Luxembourg	Soluprick Contrôle Positif	Soluprick Contrôle Négatif
Grækenland	Soluprick Θετικός έλεγχος Ισταμίνης	Soluprick Αρνητικός έλεγχος
Island	Soluprick Positiv kontrol	Soluprick Negativ kontrol
Irland	Soluprick Positive Control	Soluprick Negative Control
Letland	Soluprick Pozitīvais testa šķīdums	Soluprick Negatīvais testa šķīdums
Litauen	Soluprick Teigiamos reakcijos	Soluprick Neigiamos reakcijos

	kontrolinis tirpalas	kontrolinis tirpalas
Norge	Soluprick Positiv kontroll	Soluprick Negativ kontroll
Portugal	Soluprick Controlo positivo	Soluprick Controlo negativo
Slovenien	Soluprick Pozitivna kontrola	Soluprick Negativna kontrola

**Markedsføringstilladelsesnummer:**

ALK Soluprick Positiv kontrol 13142

ALK Soluprick Negativ kontrol 13143

**Denne indlægsseddel blev senest revideret: 28. september 2018**