

## **B i e : info ma ie oor de pati nt**

**Alprazolam Grindeks 0,25 mg tabletten**

**Alprazolam Grindeks 0,5 mg tabletten**

**Alprazolam Grindeks 1 mg tabletten**

Alprazolam

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Alprazolam Grindeks en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is Alprazolam Grindeks en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Alprazolam Grindeks is een sedativum en behoort tot de groep van benzodiazepinen.

Alprazolam Grindeks wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van angstsymptomen die ernstig of invaliderend zijn of die de patiënt veel leed bezorgen. Dit geneesmiddel is alleen bestemd voor kortstondig gebruik.

### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor alprazolam, voor andere benzodiazepinen, of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U lijdt aan een ziekte met de naam 'myasthenia gravis', die gekenmerkt wordt door zwakke en vermoeide spieren.
- U heeft ernstige long- of ademhalingsproblemen (bijv. chronische bronchitis of emfyseem).
- U heeft 'slaapapneu' - dit is een aandoening waarbij uw ademhaling onregelmatig wordt of zelfs voor korte perioden onderbroken wordt tijdens uw slaap.
- U heeft ernstige leverproblemen.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

- als u alcohol, drugs of geneesmiddelen misbruikt of in het verleden heeft misbruikt
- als u langdurig alprazolam heeft gebruikt, aangezien de werking kan afnemen
- als u een slechte algemene conditie heeft
- als u problemen heeft met uw longen, nieren of lever
- als u andere geneesmiddelen gebruikt voor een psychische ziekte.

### *Afhankelijkheid*

Het gebruik van dit geneesmiddel kan leiden tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid van het geneesmiddel.

Het risico op afhankelijkheid vergroot met de dosis en duur van de behandeling. Daarom moet de duur van de behandeling zo kort mogelijk zijn. Volg de dosisaanbevelingen van uw arts (zie rubriek 3). U merkt psychische afhankelijkheid doordat u niet wilt stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Lichamelijke afhankelijkheid betekent dat er ontwenningssverschijnselen optreden wanneer de behandeling met dit geneesmiddel plotseling wordt gestopt. Het risico is ook groter bij patiënten die alcohol of geneesmiddelen misbruiken of hebben misbruikt (zie ook rubriek 3). “Als u stopt met het gebruik van dit middel”). Geneesmiddelmisbruik is een bekend risico bij Alprazolam Grindeks. Als dit geneesmiddel verkeerd wordt gebruikt kan dit leiden tot overdosering en overlijden. Volg altijd de dosisaanbevelingen van uw arts. Mensen die voorgeschreven geneesmiddelen misbruiken kunnen op zoek zijn naar dit geneesmiddel. Daarom dient dit geneesmiddel buiten bereik van andere mensen te worden bewaard.

### *Geheugenproblemen*

Tijdens de behandeling met alprazolam kan uw geheugen wat minder goed zijn. Dit gebeurt meestal enkele uren nadat het geneesmiddel is ingenomen. Raadpleeg uw arts als u dit opmerkt. Om het risico hierop te beperken moet u ervoor zorgen dat u een hele nacht (7 tot 8 uur) kunt slapen nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen.

### *Psychische aandoening (psychose)*

Als u lijdt aan psychose, een ernstige psychische aandoening die uw gedrag, handelingen en zelfbeheersing verstoort, is Alprazolam Grindeks niet geschikt voor u.

### *Invloed op de stemming*

Het gebruik van alprazolam kan de kans op episodes van hypomanie (lichte vorm van manie) en manie (overdreven opgewektheid, die zich uit in het hebben van veel energie) vergroten bij patiënten met depressie. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u verschijnselen van hypomanie of manie krijgt.

### *Depressie, gedachten over zelfbeschadiging of zelfdoding*

De behandeling met alprazolam kan de kans op gedachten over zelfbeschadiging of zelfdoding vergroten als u aan depressie lijdt. Vraag uw arts hiernaar voordat u met de behandeling met alprazolam begint.

Als behandeling met alprazolam noodzakelijk is en als u depressief bent of ooit gedachten heeft gehad aan zelfbeschadiging of zelfdoding, zal uw arts u nauwlettend controleren. Als u gedachten krijgt over zelfbeschadiging of zelfdoding, neem dan **onmiddellijk** contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.

### *Ouderen*

Wees vooral voorzichtig met het gebruik van alprazolam als u op leeftijd bent, aangezien het middel tot meer vermoeidheid en/of spierzwakte kan leiden, waardoor de kans dat u valt groter wordt.

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, aangezien de veiligheid en werkzaamheid voor hen niet zijn vastgesteld.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Alprazolam Grindeks nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling kan negatief worden beïnvloed als Alprazolam Grindeks samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van de genoemde aandoeningen wordt gebruikt. Uw arts moet dan misschien uw dosering aanpassen.

- Mentale problemen (antipsychotica, bijv. clozapine)
- slaapproblemen (slaappillen)
- allergieën of hooikoorts (bepaalde antihistaminen)
- als u een grote operatie ondergaat (anesthetica)
- hevige pijn (narcotische analgetica, bijv. dextropropoxyfeen)
- therapie tegen drugsverslaving (substitutie therapie)
- problemen zoals angst of depressie, waaronder bepaalde antidepressiva die fluoxetine, fluvoxamine, nefazodon of imipramine bevatten
- hartfalen (digoxine)
- infecties (antibiotica die erytromycine, claritromycine of telitromycine bevatten)
- schimmelinfecties (itraconazol, fluconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol)
- geneesmiddelen voor de behandeling van angina pectoris en hoge bloeddruk, zoals diltiazem
- HIV en AIDS (genaamd HIV-proteaseremmers, zoals ritovanir)
- brandend maagzuur en maagzweer, zoals cimetidine of omeprazol
- astma en bronchitis zoals theofylline
- epilepsie, zoals carbamazepine
- spierverslappende geneesmiddelen. Wanneer deze samen met alprazolam worden gebruikt, kan het spierverslappende effect sterker zijn en is er een risico op vallen.

Gelijktijdig gebruik van Alprazolam Grindeks en opioïden (sterke pijnstillers, geneesmiddelen voor substitutietherapie en bepaalde middelen tegen hoest) vergroot de kans op sufheid, ademhalingsproblemen (respiratoire depressie), coma, en kan levensbedreigend zijn. Daarom dient gelijktijdig gebruik alleen te worden overwogen wanneer andere behandelingsopties niet mogelijk zijn.

Als uw arts Alprazolam Grindeks echter samen met opioïden voorschrijft, moet uw arts de dosis en de duur van de gelijktijdige behandeling beperken.

Informeer uw arts over alle kalmerende geneesmiddelen (opioïden) die u gebruikt, en volg de dosisaanbeveling van uw arts nauwgezet op. Het is wellicht nuttig uw vrienden en familie op de hoogte te brengen van bovengenoemde tekenen en symptomen. Neem contact op met uw arts zodra u dergelijke symptomen ondervindt.

Het effect van de behandeling met alprazolam kan ook negatief worden beïnvloed door gelijktijdige behandeling met een van de volgende geneesmiddelen: de pil, rifampicine (voor infecties) of sint-janskruid (kruidenmiddel).

### **Alprazolam Grindeks en alcohol**

Tijdens de behandeling met Alprazolam Grindeks mag u geen alcohol drinken, aangezien alcohol het effect van Alprazolam Grindeks op onvoorspelbare wijze kan veranderen en versterken.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

#### Zwangerschap

U moet uw arts onmiddellijk inlichten wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden. Observaties bij de mens hebben aangetoond dat alprazolam schadelijk kan zijn voor de foetus (verhoogde kans op misvorming (gespleten verhemelte)). Tijdens de zwangerschap mag alprazolam alleen worden gebruikt als de arts heeft vastgesteld dat de voordelen van behandeling groter zijn dan de risico's voor het ongeboren kind en dat het geneesmiddel geschikt is voor u.

Als u Alprazolam Grindeks tot aan de bevalling gebruikt, vertel dit dan aan uw arts, aangezien uw pasgeboren baby na de geboorte ontwenningsverschijnselen kan krijgen.

### Borstvoeding

U mag Alprazolam Grindeks niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Alprazolam komt terecht in de moedermelk. Als uw arts heeft besloten dat u dit geneesmiddel moet gebruiken, moet u stoppen met het geven van borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Ook bij correct gebruik kan Alprazolam Grindeks het reactievermogen zodanig verminderen dat de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen negatief wordt beïnvloed. Dit risico is extra groot aan het begin van de behandeling, wanneer de dosis wordt verhoogd, als u niet genoeg slaap krijgt of als u u alcohol of andere middelen gebruikt die op het centrale zenuwstelsel inwerken. Daarom mag u helemaal geen voertuig besturen, machines gebruiken of andere risicovolle activiteiten uitvoeren, of in ieder geval niet tijdens de eerste paar dagen van de behandeling. Het besluit wordt in elk individueel geval genomen door de behandelend arts.

### **Alprazolam Grindeks bevat lactose, natrium en natriumbenzoaat (E211)**

Lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Natrium: Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. dat het in wezen 'natriumvrij' is.

Natriumbenzoaat: Dit geneesmiddel bevat 0,12 mg natriumbenzoaat in elke tablet.

### **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Tenzij de arts anders voorschrijft, zijn de volgende dosisrichtlijnen van toepassing**

Aanvangsdosering: over het algemeen is de dosis aan het begin van de behandeling driemaal daags 0,25 tot 0,5 mg alprazolam.

Onderhoudsdosering: indien het klinisch noodzakelijk is, kan uw arts uw dosis verhogen tot 3 mg tot 4 mg in kleine stappen, verdeeld over diverse individuele doses.

### Oudere en gevoelige patiënten of verzwakte patiënten

Als u een oudere en gevoelige patiënt bent u en een lagere dosis nodig heeft, zult u normaal gesproken beginnen met een dosis van 0,25 mg twee tot drie keer per dag. Deze dosis kan langzaam worden verhoogd indien nodig en als u geen bijwerkingen krijgt.

### Patiënten met nier- of leverproblemen

Als u een nier- of leveraandoening heeft, zal uw arts uw dosis aanpassen.

### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen Alprazolam Grindeks niet gebruiken.

### **Wijze van toediening**

Alprazolam Grindeks is bestemd voor oraal gebruik. Neem de tabletten in met wat vloeistof (bijv. een half glas water).

De tabletten hebben een breukstreep en kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

### **Duur van de behandeling**

Het risico op afhankelijkheid en misbruik kan toenemen met de dosis en duur van de behandeling. Uw arts zal daarom de laagste effectieve dosis en de kortst mogelijke behandelingsduur voorschrijven en regelmatig nagaan of de behandeling nog moet worden voortgezet.

De behandeling mag niet langer dan 2-4 weken duren. Een langdurige behandeling wordt niet aanbevolen. De werking van het geneesmiddel kan afnemen als het langer dan een paar weken wordt gebruikt.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u teveel van Alprazolam Grindeks heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Tekenen van (lichte) overdosering kunnen zijn: slaperigheid, licht gevoel in het hoofd, stoornissen van het gezichtsvermogen, onduidelijke spraak, daling van de bloeddruk, wankel lopen/instabiele bewegingen en spierzwakte. In geval van ernstige intoxicatie kunnen diepe slaap en zelfs bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en hypovolemische shock optreden. Monitoren op de intensive care is essentieel.

De arts moet de mate van intoxicatie beoordelen en moet de maatregelen bepalen om deze te behandelen.

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis bent vergeten in te nemen, sla de gemiste dosis dan over en ga door met het innemen van Alprazolam Grindeks zoals uw arts u dat heeft voorgeschreven.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Overleg altijd met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit middel, aangezien de dosering geleidelijk moet worden verlaagd. Als u stopt met het gebruik van de tabletten of de dosis plotseling verlaagt, kunt u een 'rebound'-effect krijgen, waardoor u tijdelijk angstiger of onrustiger wordt of moeite met slapen heeft. Sommige mensen kunnen ook ontwenningsverschijnselen krijgen (zie rubriek 4. 'Afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen'). Deze verschijnselen zullen verdwijnen naarmate uw lichaam zich weer aanpast. Als u zich zorgen maakt, kan uw arts u hier meer over vertellen. Daarom zal uw arts de dosering geleidelijk verlagen wanneer de behandeling wordt beëindigd. Verlaging van de dosering wordt afgestemd op wat de individuele patiënt nodig heeft, aangezien geleidelijke stopzetting van een aantal factoren afhangt (bijv. de duur van de behandeling en uw dagelijkse dosis). Vraag uw arts hoe u de dosis geleidelijk kunt verlagen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

#### **Redenen om onmiddellijk contact op te nemen met uw arts**

Krijgt u last van deze klachten? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, aangezien de behandeling dan moet worden stopgezet. Uw arts zal dan bepalen hoe de behandeling zal worden stopgezet.

- Behandeling met alprazolam kan ernstige effecten op het gedrag of psychische effecten hebben, bijv. agitatie, rusteloosheid, agressie, prikkelbaarheid, gewelddadige woede, waanideeën, nachtmerries en hallucinaties of ander ongepast gedrag.
- Plotselinge kortademigheid, moeite met slikken of ademen, zwelling van oogleden, gezicht of lippen, huiduitslag of jeuk (met name over het hele lichaam).

#### **Redenen om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw arts**

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u de volgende symptomen krijgt, aangezien uw dosis of de behandeling mogelijk moet worden gewijzigd:

- Geheugenverlies (amnesie).
- Geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht).

### **Afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen**

Het is mogelijk om van geneesmiddelen zoals alprazolam afhankelijk te worden. Als u stopt met de behandeling is de kans op ontwenningsverschijnselen daardoor groter. Ontwenningsverschijnselen komen vaker voor als u:

- plotseling stopt met de behandeling
- hoge doses heeft gebruikt
- dit geneesmiddel lange tijd heeft gebruikt
- een voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik heeft.

Dit kan effecten hebben zoals hoofdpijnen, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid, stemmingswisselingen, slaapproblemen en prikkelbaarheid.

In ernstige gevallen van ontwenning kunt u ook de volgende symptomen krijgen: misselijkheid, braken, zweten, maagkrampen, spierkrampen, een gevoel dat dingen niet echt zijn of een gevoel van onthechting van uw omgeving, ongewone gevoeligheid voor geluid, licht of lichamelijk contact, gevoelloosheid of tintelen van de voeten en handen, hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn, terwijl u wakker bent), tremor of epileptische aanvallen. Vertel het uw arts als u ontwenningsverschijnselen heeft die erger worden of niet ophouden.

### **Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn:**

#### **Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers**

- Depressie
- Slaperigheid en sufheid
- Schokkerige, ongecoördineerde bewegingen
- Sommige dingen niet kunnen onthouden
- Onduidelijke spraak
- Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd
- Hoofdpijnen
- Verstopping
- Droge mond
- Vermoeidheid
- Prikkelbaarheid.

#### **Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers**

- Verlies van eetlust
- Verwardheid en desoriëntatie
- Veranderingen in zin in seks (mannen en vrouwen)
- Nervositeit of angstig of geagiteerd voelen
- Niet kunnen slapen of een onderbroken slaap hebben
- Problemen met evenwicht, en wankelheid (alsof u dronken bent), met name overdag
- Verlies van alertheid of concentratie
- Niet wakker kunnen blijven, futloos zijn
- Beven of trillen
- Dubbel of wazig zien
- Misselijkheid
- Huidreacties
- Veranderingen in uw gewicht.

**Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers**

- Opgetogen of overdreven opgewonden gevoel, dat ongewoon gedrag veroorzaakt
- Hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn)
- Geagiteerd of boos voelen
- Braken
- Spierspasmen of -zwakte
- Incontinentie
- Krampen in de onderrug en dijen, wat kan duiden op problemen met uw menstruatie
- Afhankelijkheid van geneesmiddelen
- Ontwenningssverschijnselen na stoppen met een geneesmiddel waar u afhankelijk van bent.

**Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald**

- Bij vrouwen, onregelmatige menstruatie of productie van te veel prolactine (het hormoon dat de melkproductie stimuleert)
- Vijandig of agressief voelen
- Abnormale gedachten
- Draaiende of schokkerige bewegingen
- Overactief zijn
- Maagklachten
- Problemen met de leverfunctie (dit blijkt uit bloedonderzoek), ontsteking van de lever (hepatitis)
- Disbalans in zenuwstelsel. De symptomen kunnen zijn: snelle hartslag en instabiele bloeddruk (duizelig of licht in het hoofd voelen of flauwvallen)
- Ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt
- Zwelling van de enkels, voeten of vingers
- Huidreactie veroorzaakt door gevoeligheid voor zonlicht
- Moeite met plassen of plas niet goed kunnen ophouden
- Verhoogde druk in de ogen, die ook uw zicht negatief kan beïnvloeden
- Misbruik van geneesmiddelen.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het nationale meldsysteem

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is alprazolam.

- Alprazolam Grindeks 0,25 mg tabletten  
Elke tablet bevat 0,25 mg alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 0,5 mg tabletten:  
Elke tablet bevat 0,5 mg alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 1 mg tabletten:  
Elke tablet bevat 1 mg alprazolam.

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat; microkristallijne cellulose (E460); gepregelatiniseerd maïszetmeel; docusaatsodium; natriumbenzoaat (E211); magnesiumstearaat (E572); colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), ijzeroxide rood (E172) (*alleen 0,5 mg tabletten*); indigotine (E132) (*alleen 1 mg tabletten*).

### **Hoe ziet Alprazolam Grindeks eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Alprazolam Grindeks 0,25 mg is een witte of bijna witte, ovale (10 mm x 5 mm) tablet met een breukstreep aan de ene zijde en gegraveerd met "0.25" aan de andere zijde.

Alprazolam Grindeks 0,5 mg is een lichtroze tot roze ovale (10 mm x 5 mm) tablet met een breukstreep aan de ene zijde en gegraveerd met "0.5" aan de andere zijde.

Alprazolam Grindeks 1 mg is een lichtblauwe tot blauwe ovale (10 mm x 5 mm) tablet met een breukstreep aan de ene zijde en gegraveerd met "1" aan de andere zijde.

Alprazolam Grindeks tabletten zijn beschikbaar in OPA/Alu/PVC//Alu blisterverpakkingen met daarin 10, 20, 30, 50, 60 of 100 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Letland

Tel.: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

Alprazolam Grindeks 0,25 mg tabletten: BE662888

Alprazolam Grindeks 0,5 mg tabletten: BE662889

Alprazolam Grindeks 1 mg tabletten: BE662890

### **Afleveringswijze**

Op medisch voorschrift.

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:**

Duitsland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Oostenrijk	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten



België	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Bulgarije	Алпразолам България 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg България
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Kroatië	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Tsjechië	Alprazolam Grindeks
Denemarken	Alprazolam Grindeks
Estland	Ixhalanex
Finland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Frankrijk	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Griekenland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Hongarije	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletta
Ierland	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Italië	Alprazolam Grindeks
Letland	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletēs
Litouwen	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luxemburg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pëllen
Nederland	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Polen	Alprazolam Grindeks
Portugal	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Roemenië	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Slowakije	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Slovenië	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Spanje	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Zweden	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2024**