

## **Notice : information de l'utilisateur**

### **Apixaban Viatris 2,5 mg comprimés pelliculés**

*apixaban*

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Apixaban Viatris et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Apixaban Viatris ?
3. Comment prendre Apixaban Viatris ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Apixaban Viatris ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Apixaban Viatris et dans quel cas est-il utilisé ?**

Apixaban Viatris contient de l'apixaban comme substance active et appartient à la classe de médicaments appelés anticoagulants. Ce médicament aide à prévenir la formation de caillots sanguins en bloquant le Facteur Xa, qui est un élément important de la coagulation sanguine.

Apixaban Viatris est utilisé chez l'adulte :

- pour prévenir la formation de caillots sanguins (thrombose veineuse profonde [TVP]) après la pose d'une prothèse totale de hanche ou de genou. Après une chirurgie de la hanche ou du genou, vous pourriez avoir un risque plus élevé de développer des caillots sanguins au niveau des veines de vos jambes. Cela peut entraîner un gonflement des jambes qui peut être douloureux ou non. Si un caillot sanguin circule de vos jambes à vos poumons, il peut bloquer la circulation sanguine entraînant un essoufflement, avec ou sans douleur dans la poitrine. Cette affection, l'embolie pulmonaire, peut menacer votre vie et demande un examen médical immédiat.
- pour prévenir la formation d'un caillot sanguin dans le cœur chez les patients présentant des battements cardiaques irréguliers (fibrillation atriale) et au moins un facteur de risque supplémentaire. Les caillots sanguins peuvent se détacher, transiter jusqu'au cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral, ou vers d'autres organes et altérer l'irrigation sanguine vers cet organe (une pathologie dénommée embolie systémique). L'accident vasculaire cérébral peut engager le pronostic vital et nécessite des soins médicaux immédiats.

- pour traiter la formation de caillots sanguins dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) et dans les vaisseaux sanguins de vos poumons (embolie pulmonaire), et pour prévenir la récurrence de la formation de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos jambes et/ou de vos poumons.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Apixaban Viatris ?

### Ne prenez jamais Apixaban Viatris

- si **vous êtes allergique** à apixaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;
- si vous êtes sujet à des **saignements excessifs** ;
- si vous présentez une **pathologie d'un organe** susceptible d'aggraver le risque de saignement grave (telle que **ulcère évolutif ou récent** de l'estomac ou de l'intestin, **saignement récent dans le cerveau**) ;
- si vous présentez une **maladie du foie** augmentant les risques de saignement (coagulopathie hépatique) ;
- si vous **prenez des médicaments empêchant la coagulation sanguine** (par exemple, warfarine ou autre anti-vitamine K, rivaroxaban, dabigatran ou héparine), sauf en cas de changement de traitement anticoagulant, si un accès veineux ou artériel a été mis en place et que vous recevez de l'héparine dans la tubulure pour qu'elle ne s'obture pas, ou si le tube est inséré dans votre vaisseau sanguin (ablation par cathéter) pour traiter un rythme cardiaque irrégulier (arythmie).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ce médicament si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

- **risque accru de saignement**, par exemple :
  - **troubles hémorragiques**, notamment les affections résultant de la réduction de l'activité des plaquettes ;
  - **pression artérielle très élevée**, non contrôlée par un traitement médical ;
  - si vous êtes âgé de plus de 75 ans ;
  - si vous pesez 60 kg ou moins ;
- **affection rénale sévère ou si vous êtes sous dialyse** ;
- **problèmes au foie ou des antécédents de problèmes au foie** ;  
Ce médicament sera utilisé avec précaution chez les patients présentant les signes d'une fonction hépatique altérée.
- **un tube (cathéter) ou une injection dans votre colonne vertébrale** (pour une anesthésie ou pour le soulagement de la douleur), votre médecin vous dira de prendre ce médicament 5 heures ou plus après le retrait du cathéter ;
- si vous êtes porteur d'une **prothèse valvulaire cardiaque** ;
- si votre médecin juge votre tension artérielle instable ou si un autre traitement ou une procédure chirurgicale visant à retirer le caillot sanguin de vos poumons est programmé.

Faites attention avec Apixaban Viatris

- si vous savez que vous souffrez d'une maladie appelée syndrome des antiphospholipides (une affection du système immunitaire qui cause un risque accru de formation de caillots sanguins), dites-le à votre médecin; il décidera si le traitement doit éventuellement être modifié.

Si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une procédure susceptible d'entraîner

un saignement, votre médecin pourra vous demander d'interrompre temporairement la prise de ce médicament pendant une brève période. Si vous ne savez pas si une procédure est susceptible d'entraîner un saignement, demandez conseil à votre médecin.

### **Enfants et adolescents**

Ce médicament n'est pas recommandé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

### **Autres médicaments et Apixaban Viatris**

Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets d'Apixaban Viatris et d'autres peuvent diminuer ses effets. Votre médecin décidera si vous devez être traité par Apixaban Viatris alors que vous prenez ces médicaments et comment vous devrez être surveillé.

Les médicaments suivants peuvent augmenter les effets d'Apixaban Viatris et le risque de saignement indésirable :

- certains **médicaments contre les infections fongiques** (par exemple, kétoconazole, etc.) ;
- certains **médicaments antiviraux contre le VIH/SIDA** (par exemple, ritonavir) ;
- d'autres **médicaments utilisés pour réduire la formation de caillots sanguins** (par exemple, énoxaparine, etc.) ;
- des **médicaments anti-inflammatoires** ou des **anti-douleurs** (par exemple, acide acétylsalicylique ou naproxène). En particulier si vous avez plus de 75 ans et que vous prenez de l'acide acétylsalicylique, vous pouvez avoir un risque plus élevé de saignement ;
- des **médicaments pour l'hypertension ou les problèmes cardiaques** (par exemple, diltiazem) ;
- des **médicaments antidépresseurs** appelés **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine** ou **inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline**.

Les médicaments suivants peuvent réduire la capacité d'Apixaban Viatris à aider à prévenir la formation de caillots sanguins :

- **médicaments pour prévenir l'épilepsie ou les crises épileptiques** (par exemple, phénytoïne, etc.) ;
- **millepertuis** (préparation à base de plantes utilisée pour la dépression) ;
- **médicaments pour traiter la tuberculose ou d'autres infections** (par exemple, rifampicine).

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament.

Les effets d'Apixaban Viatris sur la grossesse et l'enfant à naître ne sont pas connus. Si vous êtes enceinte, vous ne devez pas prendre ce médicament. **Contactez votre médecin immédiatement** si vous tombez enceinte pendant que vous prenez ce médicament.

On ne sait pas si Apixaban Viatris passe dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament pendant l'allaitement. Ils vous conseilleront d'arrêter l'allaitement ou d'arrêter / de ne pas commencer à prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Apixaban Viatris n'a pas montré qu'il pouvait altérer votre aptitude à conduire ou utiliser des machines.

### **Apixaban Viatris contient du lactose (un type de sucre) et du sodium**

Si votre médecin vous a indiqué que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».

## **3. Comment prendre Apixaban Viatris ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin, votre pharmacien ou de votre infirmier/ère en cas de doute. Vérifiez auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère en cas de doute.

### **Posologie**

Avalez le comprimé avec un verre d'eau. Apixaban Viatris peut être pris pendant ou en dehors des repas. Essayez de prendre les comprimés à heure fixe chaque jour afin d'obtenir le maximum de bénéfices de votre traitement.

Si vous avez des difficultés à avaler le comprimé en entier, discutez avec votre médecin des autres façons de prendre Apixaban Viatris. Le comprimé peut être écrasé et mélangé avec de l'eau, ou du glucose à 5 %, ou du jus de pomme ou de la compote de pomme, immédiatement avant de le prendre.

### **Instructions pour l'écrasement :**

- Écraser les comprimés avec un pilon et un mortier.
- Transférer soigneusement toute la poudre dans un récipient approprié puis mélanger la poudre avec 30 ml (2 cuillères à soupe) par exemple d'eau ou d'un des autres liquides mentionnés ci-dessus pour faire un mélange.
- Avalez le mélange.
- Rincer le mortier et le pilon que vous avez utilisé pour écraser le comprimé et le récipient, avec un peu d'eau ou l'un des autres liquides (par exemple 30 ml), et avaler le liquide de rinçage.

Si nécessaire, votre médecin peut également vous donner le comprimé d'Apixaban Viatris écrasé mélangé dans 60 ml d'eau ou du glucose à 5 %, par le biais d'une sonde nasogastrique.

**Veillez à toujours prendre Apixaban Viatris conformément à la prescription de votre médecin, à savoir dans les situations suivantes :**

Pour la prévention de la formation de caillots sanguins après la pose d'une prothèse totale de hanche ou de genou.

La posologie recommandée est d'un comprimé d'Apixaban Viatris 2,5 mg deux fois par jour. Par exemple, un le matin et un le soir.

Vous devez prendre le premier comprimé 12 à 24 heures après votre opération.

Si vous avez bénéficié d'une intervention majeure sur la **hanche**, vous prendrez généralement les comprimés pendant 32 à 38 jours.

Si vous avez bénéficié d'une intervention majeure sur le **genou**, vous prendrez généralement les comprimés pendant 10 à 14 jours.

Pour la prévention de la formation de caillots sanguins dans le cœur chez les patients présentant des battements cardiaques irréguliers et au moins un facteur de risque supplémentaire.

La posologie recommandée est d'un comprimé d'Apixaban Viatris **5 mg** deux fois par jour.

La posologie recommandée est d'un comprimé d'Apixaban Viatris **2,5 mg** deux fois par jour dans les cas suivants :

- vous présentez une **altération significative de la fonction rénale** ;
- **vous répondez à au moins deux des critères suivants** :
  - vos analyses sanguines suggèrent une fonction rénale altérée (valeur de la créatinine sérique de 1,5 mg/dL [133 micromoles/L] ou plus) ;
  - vous êtes âgé d'au moins 80 ans ;
  - votre poids est inférieur ou égal à 60 kg.

La dose recommandée est d'un comprimé deux fois par jour, par exemple, un le matin et un le soir. Votre médecin décidera pendant combien de temps vous devrez poursuivre ce traitement.

Pour traiter la formation de caillots sanguins dans les veines de vos jambes et la formation de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos poumons.

La dose recommandée est de **deux comprimés** d'Apixaban Viatris **5 mg** deux fois par jour durant les 7 premiers jours, par exemple, deux le matin et deux le soir.

Au-delà de 7 jours, la dose recommandée est d'un **comprimé** d'Apixaban Viatris **5 mg** deux fois par jour, par exemple, un le matin et un le soir.

Pour prévenir la récurrence de la formation de caillots sanguins à l'issue de 6 mois de traitement

La dose recommandée est d'un comprimé d'Apixaban Viatris **2,5 mg** deux fois par jour, par exemple, un le matin et un le soir.

Votre médecin décidera pendant combien de temps vous devrez poursuivre ce traitement.

**Votre médecin pourra changer votre traitement anticoagulant de la façon suivante :**

- *Relais d'Apixaban Viatris par des médicaments anticoagulants*  
Arrêtez la prise d'Apixaban Viatris. Commencez le traitement par les médicaments anticoagulants (par exemple, héparine) au moment où vous deviez prendre le comprimé suivant.
- *Relais de médicaments anticoagulants par Apixaban Viatris*  
Arrêtez la prise des médicaments anticoagulants (par exemple héparine). Commencez le traitement par Apixaban Viatris au moment où vous deviez prendre la dose suivante du médicament anticoagulant, puis continuez selon le schéma normal.
- *Relais d'un traitement anticoagulant contenant un anti-vitamine K (par exemple, warfarine) par Apixaban Viatris*  
Arrêtez de prendre le médicament contenant un anti-vitamine K. Votre médecin devra effectuer certaines analyses sanguines et vous indiquera quand commencer Apixaban

Viатris.

- *Relais d'un traitement anticoagulant contenant un anti-vitamine K (par exemple, warfarine)*  
Si votre médecin vous indique que vous devez commencer à prendre un médicament contenant un anti-vitamine K, continuer à prendre Apixaban Viатris pendant au moins deux jours après votre première dose du médicament contenant un anti-vitamine K. Votre médecin devra effectuer certaines analyses sanguines et vous indiquera quand arrêter Apixaban Viатris.

#### **Patients bénéficiant d'une cardioversion**

Si votre rythme cardiaque anormal doit être rétabli à la normale par une procédure appelée cardioversion, prenez ce médicament aux heures indiquées par votre médecin pour prévenir la formation de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins du cerveau et des autres vaisseaux sanguins de votre corps.

#### **Si vous avez pris plus de Apixaban Viатris que vous n'auriez dû**

*Si vous avez pris trop de Apixaban Viатris, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).*

**Contactez votre médecin immédiatement** si vous avez pris plus que la dose prescrite de ce médicament. Prenez la boîte avec vous, même s'il n'y a plus de comprimés.

Si vous avez pris plus d'Apixaban Viатris que recommandé, vous pouvez présenter un risque accru de saignement. Si des saignements apparaissent, une opération chirurgicale, des transfusions sanguines, ou d'autres traitements qui peuvent inverser l'activité de l'anti-Facteur Xa peuvent être nécessaires.

#### **Si vous oubliez de prendre Apixaban Viатris**

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez et :

- prenez la dose suivante d'Apixaban Viатris à l'heure habituelle ;
- puis poursuivez votre traitement normalement.

**Si vous n'êtes pas sûr(e) de ce qu'il faut faire ou si vous avez oublié de prendre plus d'une dose**, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

#### **Si vous arrêtez de prendre Apixaban Viатris**

N'arrêtez pas de prendre ce médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin car le risque de formation d'un caillot sanguin pourrait être plus élevé si vous arrêtez le traitement trop tôt.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

#### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Apixaban Viатris peut être administré pour trois types de pathologies différentes. Les effets indésirables connus et leurs fréquences dans chacune de ces pathologies peuvent varier et sont présentés séparément.

Pour ces pathologies, l'effet indésirable général le plus fréquent de ce médicament est la survenue de saignements, qui peuvent potentiellement engager le pronostic vital et nécessiter des soins médicaux immédiats.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Apixaban Viatris dans la prévention de la formation de caillots sanguins après la pose d'une prothèse totale de hanche ou de genou.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)**

- Anémie qui peut être à l'origine de fatigue et pâleur ;
- Saignements, notamment :
  - hématome et gonflement ;
- Nausées (envie de vomir).

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)**

- Diminution du nombre de plaquettes dans votre sang (ce qui peut affecter la coagulation) ;
- Saignements :
  - survenant suite à votre opération dont des bleus et gonflements, du sang ou du liquide sortant de la plaie/incision chirurgicale (suintement au niveau de la plaie) ou du site d'injection ;
  - dans votre estomac, dans vos intestins ou présence de sang rouge/clair dans les selles ;
  - dans les urines ;
  - de votre nez ;
  - de votre vagin ;
- Faible pression artérielle pouvant entraîner une sensation d'évanouissement ou une accélération du rythme cardiaque ;
- Analyses biologiques sanguines pouvant montrer :
  - une fonction hépatique anormale ;
  - une augmentation de certaines enzymes du foie ;
  - une augmentation de la bilirubine, une diminution de la production de globules rouges, ce qui peut provoquer un jaunissement de la peau et des yeux ;
- Démangeaisons.

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1000)**

- Réactions allergiques (hypersensibilité) pouvant provoquer un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue et/ou de la gorge et des difficultés respiratoires.  
**Contactez votre médecin immédiatement** si vous présentez l'un de ces symptômes.
- Saignement :
  - dans un muscle ;
  - dans vos yeux ;
  - de vos gencives et dans vos crachats quand vous toussiez ;
  - de votre rectum ;
- Chute de cheveux.

**Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des seules données disponibles)**

- Saignement :
  - dans votre cerveau ou votre colonne vertébrale ;
  - dans vos poumons ou votre gorge ;
  - dans votre bouche ;
  - dans votre abdomen ou dans l'espace à l'arrière de votre cavité abdominale ;

- à partir d'une hémorroïde ;
- analyses biologiques révélant du sang dans les selles ou dans les urines ;
- Éruption cutanée pouvant former des cloques et ressemblant à de petites cibles (tâches sombres centrales entourées d'une zone plus pâle, avec un anneau sombre autour du bord) (érythème polymorphe);
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) pouvant entraîner une éruption cutanée ou des taches pointues, plates, rouges, rondes sous la surface de la peau ou des ecchymoses.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Apixaban Viatris pour la prévention de la formation de caillots sanguins dans le cœur chez les patients présentant des battements cardiaques irréguliers et au moins un facteur de risque supplémentaire.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)**

- Saignements, notamment :
  - dans vos yeux ;
  - dans votre estomac ou votre intestin ;
  - de votre rectum ;
  - dans les urines ;
  - de votre nez ;
  - de vos gencives ;
  - hématome et gonflement ;
- Anémie qui peut être à l'origine de fatigue ou de pâleur ;
- Faible pression artérielle pouvant entraîner une sensation d'évanouissement ou une accélération du rythme cardiaque ;
- Nausées (envie de vomir) ;
- Analyses biologiques sanguines pouvant montrer :
  - une augmentation de la gamma-glutamyltransférase (GGT).

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)**

- Saignements :
  - dans votre cerveau ou votre colonne vertébrale ;
  - de votre bouche ou présence de sang dans vos crachats quand vous toussiez ;
  - dans votre abdomen ou de votre vagin ;
  - sang rouge/clair dans les selles ;
  - saignement survenant après votre opération notamment hématome et gonflement, sang ou liquide s'écoulant de la plaie/de l'incision chirurgicale (sécrétion de la plaie) ou du site d'injection ;
  - à partir d'une hémorroïde ;
  - analyses biologiques révélant du sang dans les selles ou dans les urines ;
- Diminution du nombre de plaquettes dans votre sang (ce qui peut affecter la coagulation) ;
- Analyses biologiques sanguines pouvant montrer :
  - une fonction hépatique anormale ;
  - une augmentation de certaines enzymes du foie ;
  - une augmentation de la bilirubine, une diminution de la production de globules rouges, ce qui peut provoquer un jaunissement de la peau et des yeux ;
- Éruption cutanée ;
- Démangeaisons ;
- Chute de cheveux ;
- Réactions allergiques (hypersensibilité) pouvant provoquer un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue et/ou de la gorge et des difficultés respiratoires.



**Contactez votre médecin immédiatement** si vous présentez l'un de ces symptômes.

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1000)**

- Saignements :
  - dans vos poumons ou votre gorge ;
  - dans l'espace situé derrière votre cavité abdominale ;
  - dans un muscle.

**Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10000)**

- Éruption cutanée pouvant former des cloques et ressemblant à de petites cibles (tâches sombres centrales entourées d'une zone plus pâle, avec un anneau sombre autour du bord) (érythème polymorphe).

**Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des seules données disponibles)**

- Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) pouvant entraîner une éruption cutanée ou des taches pointues, plates, rouges, rondes sous la surface de la peau ou des ecchymoses.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Apixaban Viatris pour le traitement et la prévention de la récurrence de formation de caillots sanguins dans les veines de vos jambes ou dans les vaisseaux sanguins de vos poumons.

**Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 10)**

- Saignements, notamment :
  - de votre nez ;
  - de vos gencives ;
  - dans les urines ;
  - hématome et gonflement ;
  - dans votre estomac, votre intestin ou de votre rectum ;
  - dans votre bouche ;
  - de votre vagin ;
- Anémie qui peut être à l'origine de fatigue ou de pâleur ;
- Diminution du nombre de plaquettes dans votre sang (ce qui peut affecter la coagulation) ;
- Nausées (envie de vomir) ;
- Éruption cutanée ;
- Analyses biologiques sanguines pouvant montrer :
  - une augmentation de la gamma-glutamyltransférase (GGT) ou alanine aminotransférase (ALT).

**Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 100)**

- Faible pression artérielle pouvant entraîner une sensation d'évanouissement ou une accélération du rythme cardiaque ;
- Saignements :
  - dans vos yeux ;
  - de votre bouche ou présence de sang dans vos crachats quand vous toussiez ;
  - sang rouge/clair dans les selles ;
  - analyses biologiques révélant du sang dans les selles ou dans les urines ;
  - saignement survenant après votre opération notamment hématome et gonflement, sang ou liquide s'écoulant de la plaie/de l'incision chirurgicale (sécrétion de la plaie) ou du site d'injection ;

- à partir d'une hémorroïde ;
- dans un muscle ;
- Démangeaisons;
- Chute de cheveux ;
- Réactions allergiques (hypersensibilité) pouvant provoquer un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue et/ou de la gorge et des difficultés respiratoires.  
**Contactez votre médecin immédiatement** si vous présentez l'un de ces symptômes.
- Analyses sanguines pouvant montrer :
  - une fonction hépatique anormale ;
  - une augmentation de certaines enzymes du foie ;
  - une augmentation de la bilirubine, une diminution de la production de globules rouges, ce qui peut provoquer un jaunissement de la peau et des yeux.

**Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à une personne sur 1000)**

- Saignements :
  - dans votre cerveau ou votre colonne vertébrale ;
  - dans vos poumons.

**Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des seules données disponibles)**

- Saignement :
  - dans votre abdomen ou dans l'espace à l'arrière de votre cavité abdominale;
- Éruption cutanée pouvant former des cloques et ressemblant à de petites cibles (tâches sombres centrales entourées d'une zone plus pâle, avec un anneau sombre autour du bord) (érythème polymorphe);
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) pouvant entraîner une éruption cutanée ou des taches pointues, plates, rouges, rondes sous la surface de la peau ou des ecchymoses.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte Postale 97

1000 Bruxelles

Madou

Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

Luxembourg :

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

ou

Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver Apixaban Viatris ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la plaquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Apixaban Viatris

- La substance active est l'apixaban. Chaque comprimé contient 2,5 mg d'apixaban.
- Les autres composants sont :
  - Noyau du comprimé : **lactose (voir rubrique 2)**, cellulose microcristalline (E460), croscarmellose sodique, laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium (E470b) ;
  - Pelliculage : **lactose monohydraté (voir rubrique 2)**, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), triacétine, oxyde de fer jaune (E172).

### Aspect de Apixaban Viatris et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés pelliculés sont de couleur jaune, de forme ronde (diamètre d'environ 6 mm), biconvexes (surface bombée des deux côtés), portent l'inscription « IU1 » sur une face et sont unis sur l'autre face.

Apixaban Viatris est disponible sous forme :

- de plaquettes dans des boîtes de 10, 20, 56, 60, 100, 168 ou 200 comprimés, ou
- de plaquettes unitaires prédécoupées dans des boîtes de 10x1, 20x1, 56x1, 60x1, 100x1, 168x1 ou 200x1 comprimé, ou
- de flacons contenant 60, 180 ou 1000 comprimés. Les flacons de 60 comprimés pelliculés sont équipés d'un bouchon à vis avec sécurité enfant.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Carte de surveillance du patient : gestion de l'information

Cette notice ou ce pack contiennent une Carte de surveillance du patient ou votre médecin peut vous remettre une carte similaire. Cette Carte de surveillance du patient contient des informations qui vous seront utiles et avertiront les autres médecins que vous prenez Apixaban Viatris. **Gardez cette carte sur vous en permanence.**

Découpez la carte qui se trouve sur la notice ou dans la boîte et renseignez les sections suivantes, ou demandez à votre médecin de les remplir :

- Nom :

- Date de naissance :
- Indication :
- Dose : ..... mg deux fois par jour
- Nom du médecin :
- N° de téléphone du médecin :

Gardez cette carte sur vous en permanence.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

*Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :*

Viartis GX  
Terhulpsessesteenweg 6A  
B-1560 Hoeilaart

***Fabricants :***

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin, Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlande

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1., Komárom, 2900, Hongrie

Mylan Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1, Bad Homburg v. d. Hoehe, Hessen, 61352, Allemagne

**Numéros de l'Autorisation de mise sur le marché**

BE:

Apixaban Viartis 2,5 mg comprimés pelliculés : BE587955 (plaquette en PVC/PVDC-Al)

Apixaban Viartis 2,5 mg comprimés pelliculés : BE587964 (flacon en PEHD)

LU:

2021120241

**Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :**

Autriche	Apixaban Viartis 2,5 mg Filmtabletten
Belgique	Apixaban Viartis 2,5 mg comprimés pelliculés
Bulgarie	Apixaban Viartis 2.5 mg film-coated tablets
Chypre	Apixaban / Mylan 2.5 mg film-coated tablets
République tchèque	Apixaban Viartis
Danemark	Apixaban Viartis
Estonie	Apixaban Viartis
Finlande	Apixaban Viartis
France	Apixaban Viartis 2,5 mg comprimé pelliculé
Allemagne	Apixaban Mylan 2.5 mg Filmtabletten
Grèce	Apixaban / Mylan 2.5 mg film-coated tablets
Hongrie	Apixaban Viartis 2,5 mg filmtabletta
Islande	Apixaban Viartis
Irlande	Apixaban Mylan 2.5 mg film-coated tablets
Italie	Apixaban Mylan
Lettonie	Apixaban Viartis 2,5 mg apvalkotās tablets
Lituanie	Apixaban Viartis 2,5 mg plėvele dengtos tabletės
Luxembourg	Apixaban Viartis 2,5 mg comprimés pelliculés
Malte	Apixaban Mylan 2.5 mg film-coated tablets
Norvège	Apixaban Viartis
Portugal	Apixabano Mylan

Slovaquie	Apixaban Viatris 2,5 mg
Espagne	Apixaban Viatris comprimidos recubiertos con película EFG
Suède	Apixaban Viatris
Pays-Bas	Apixaban Viatris 2,5 mg, filmomhulde tabletten
Royaume-Uni (Irlande du Nord)	Apixaban Mylan 2.5 mg film-coated tablets

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 10/2023.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2023.**