

Bijsluiter: informatie voor de patiënt
2LVERU JUNIOR globuli in capsules om te openen

Interleukine 1: 10-17CH; Interleukine 2: 10-17CH; Interferon α : 10-17CH; Ribonucleïnezuur: 8-10CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAI: 10-18CH; Specifiek nucleïnezuur SNA-VERU: 10-18CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is 2LVERU JUNIOR en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is 2LVERU JUNIOR en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?

2LVERU JUNIOR is een homeopathisch geneesmiddel dat ingrediënten bevat die traditioneel in micro-immunotherapie gebruikt worden als adjuvans van de immuunrespons bij de behandeling van wratten.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Kinderen

Dit geneesmiddel mag niet ingenomen worden door kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast 2LVERU JUNIOR nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Een interactie met andere geneesmiddelen is niet bekend tot nu toe.

Vermijd de inname van een geneesmiddel op basis van munt tijdens het uur vóór de inname van het geneesmiddel.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is raadzaam om de inname van munt te vermijden evenals genotmiddelen (koffie, chocolade) tijdens het uur vóór de sublinguale inname.

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

2LVERU JUNIOR heeft geen effect op de rijvaardigheid noch op het vermogen om machines te bedienen.

2LVERU JUNIOR bevat sacharose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Pediatrische dosering:


Kinderen van 3 tot 12 jaar:

Eén capsule per dag vóór het ontbijt, altijd de volgorde van 1 tot 10 van de capsules naleven tot de wratten verdwenen zijn.


De globuli moeten op een lege maag, 15 tot 30 minuten vóór het ontbijt, ingenomen worden.

Bij vergeetelheid de capsule één uur na de maaltijd innemen.


De capsule niet in haar geheel inslikken. Neem aandachtig de instructies door:



1. Neem één van de drie blisterverpakkingen uit de doos



2. Neem een capsule in de juiste volgorde



3. Open voorzichtig de capsule door de top op te heffen (*)



4. Giet de inhoud van de capsule onder de tong en laat smelten

Bij de volgende inname de numerieke volgorde van de capsules naleven die op de blisterverpakking aangegeven is (2, 3,...). Aan het einde van de eerste blisterverpakking verdergaan met capsule 1 van de volgende blisterverpakking en zo verder tot het einde van de doos.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Volgens de principes van homeopathie houdt het effect verband met de verdunning en niet de dosering. Als u meer 2LVERU JUNIOR ingenomen heeft dan de aanbevolen dosis, het effect mag niet groter zijn.

Wanneer u teveel van 2LVERU JUNIOR heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u een fout maakt in de volgorde van het nemen van de capsules of als u een capsule vergeet in te nemen, ga dan verder vanaf de laatste capsule die u ingenomen heeft.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

In uitzonderlijke gevallen kan zich dyspepsie (problemen met de spijsvertering) voordoen bij inname op een nuchtere maag. In dit geval de globuli 1 uur na de maaltijd innemen.

Inslaapstoornissen kunnen zich voordoen indien u dit geneesmiddel inneemt na 16.00 uur in de namiddag. Zoals bij elke homeopathische behandeling kunt u de indruk krijgen dat de symptomen verergeren wat doorgaans verdwijnt na enkele dagen. Raadpleeg uw arts als deze indruk blijft bestaan.

Als u een andere reactie waarneemt, raadpleeg dan uw apotheker of arts.

Stop niet met de behandeling zonder de toestemming van uw arts.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

E-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C, ter bescherming tegen licht en vocht.

Houdbaarheid: 3 jaar.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn

Elke reeks van 5 capsules bevat:

Interleukine 1 (IL-1):	10-17CH
Interleukine 2 (IL-2):	10-17CH
Interferon α (IFN α):	10-17CH
Ribonucleïnezuur (RNA):	8-10CH
Specifiek nucleïnezuur SNA-HLAII:	10-18CH
Specifiek nucleïnezuur SNA-VERU:	10-18CH

- De andere stoffen in dit medicijn zijn:

Globuli: sacharose

Capsules: gelatine, blauwe kleurstof (volgens capsule): E151 Briljantzwart BN, E172 zwart ijzeroxide, E132 indigokarmijn, contrastmiddel: E171 titaandioxide.

Hoe ziet 2LVERU JUNIOR eruit en wat zit er in een verpakking?

2LVERU JUNIOR heeft de vorm van geïmpregneerde globuli

Wijze van toediening: sublinguaal gebruik

Doos met 30 capsules

De globuli zijn verpakt in gelatine capsules zoals aangegeven in punt 3.

Deze capsules moeten niet ingenomen worden.

De capsules zijn verpakt in Al/PVC-blisterverpakkingen van 10 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

LABO'LIFE BELGIUM, BV. Aut 1507 H

Av. d'Ecolys 2 bte 36

5020 Namur, BELGIË

Tel. (32) (0)81 40 87 81 - Fax (32) (0)81 40 87 89

Fabrikant:

LABO'LIFE ESPAÑA, S.A. No Reg.3.279 E

Av. des Raiguer 7

07330 Consell, SPANJE

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

België: HO-BE508542

Groothertogdom Luxemburg: 2018060138

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2024.