

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ampicillin STADA 1 g og 2 g, pulver til injektionsvæske, opløsning

ampicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ampicillin STADA
3. Sådan skal du bruge Ampicillin STADA
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ampicillin STADA er et antibiotikum af penicillintypen.

Ampicillin STADA virker på bakterier, som er årsag til betændelse (infektion).

Du får Ampicillin STADA mod betændelse.

Du skal have Ampicillin STADA som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ampicillin STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Ampicillin STADA:

- hvis du er allergisk over for ampicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ampicillin STADA (angivet i punkt 6).
- Hvis du er overfølsom over for penicilliner eller andre antibiotika (beta-lactamantibiotika). Tal med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Ampicillin STADA

- hvis du har kyssepsyse (mononukleose)
- hvis du har blodkræft (lymfatisk leukæmi)
- er overfølsom over for anden medicin mod betændelse eller tidligere har oplevet overfølsomhed overfor penicillin.

Kontakt straks lægen eller hospitalet, hvis du får:

- pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. ring 112. Kan være livsfarligt.
- voldsom eller langvarig, blodig diarré, når du bruger eller har brugt Ampicillin STADA. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Brug af anden medicin sammen med Ampicillin STADA

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Forskellig medicin kan påvirke hinandens virkning, således at dosis af lægemidlerne muligvis skal ændres. For Ampicillin STADA skal du specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende medicin:

- anden medicin mod betændelse (kloramfenikol, tetracyklin)
- medicin mod urinsyreigt (allopurinol, probenecid)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet: Ampicillin STADA kan anvendes under graviditet.

Amning: Ampicillin STADA kan anvendes under amningen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ampicillin STADA påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ampicillin STADA indeholder natrium

Et 1 g hætteglas, indeholder 62 mg (2,7 mmol) natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr hætteglas. Dette svarer til 3 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Et 2 g hætteglas, indeholder 124 mg (5,4 mmol) natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr hætteglas. Dette svarer til 6 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. Sådan skal du bruge Ampicillin STADA

Den sædvanlige dosis er

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og afhænger af din sygdom. En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Ampicillin STADA i en muskel eller i en blodåre.

Brug til børn og unge

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er og hvor længe behandlingen varer.

Nedsat nyrefunktion

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Hvis du har fået for meget Ampicillin STADA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har fået mere af Ampicillin STADA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedssløring, muskeltrækninger, kramper, koma, nyresvigt og blodmangel med gulsot.

Hvis en dosis er glemt

Du må ikke få en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stopppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
- Blodig diarré pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen
- Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock. Kan være livsfarligt. Ring 112)
- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Diarré.
- Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Træthed og bleghed på grund af blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med din læge.
- Kvalme, opkastning
- Mundbetændelse.
- Betændelse i tungen.
- Nældefeber

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Overfølsomhed
- Sort, ”håret” tunge.
- Smerter i leddene.
- Feber
- Forhøjede levertal (ingen symptomer).
- Svampeinfektion i mund og underliv

Ampicillin STADA kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i laboratorieprøver, f.eks. blodets sammensætning (eosinofili) og forhøjede levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Ampicillin STADA utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ampicillin STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ampicillin STADA indeholder:

- Aktivt stof: ampicillintrihydrat
- Øvrige indholdsstoffer: ingen

Udseende og pakningsstørrelser

Hætteglas med hvidt råhvidt pulver.

Pakningsstørrelser:

- 1 g i pakning med 1 hætteglas
- 2 g i pakning med 1 hætteglas
- 1 g i pakning med 10 hætteglas
- 2 g i pakning med 10 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Stada Nordic ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev

Fremstiller

Antibiotice
Str. Valea Lupului nr. 1
Lasi 707410
Romania

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2024