

Notice: Information de l'utilisateur

Aciclovir Farmaprojects 200 mg comprimés aciclovir

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?:

1. Qu'est-ce que Aciclovir Farmaprojects et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aciclovir Farmaprojects
3. Comment prendre Aciclovir Farmaprojects
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Aciclovir Farmaprojects
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Aciclovir Farmaprojects et dans quel cas est-il utilisé

Les comprimés d'Aciclovir Farmaprojects 200 mg contiennent un médicament appelé aciclovir. Celui-ci appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'antiviraux. Il agit en tuant ou en arrêtant la croissance des virus

Aciclovir Farmaprojects peut être utilisé pour :

- traiter la varicelle et le zona ;
- traiter les boutons de fièvre, l'herpès génital et d'autres infections dues à l'herpès simplex
- empêcher ces infections de réapparaître après les avoir contractées ;
- éviter ces virus chez les patients dont la résistance à ces infections est fortement diminuée, ce qui signifie que leur corps est moins capable de lutter contre les infections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aciclovir Farmaprojects

Ne prenez jamais Aciclovir Farmaprojects :

- si vous êtes allergique à l'aciclovir ou au valaciclovir ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).

Ne prenez pas Aciclovir Farmaprojects si les situations susmentionnées s'appliquent à vous. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Aciclovir Farmaprojects

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Aciclovir Farmaprojects si :

- vous avez des problèmes au niveau des reins ;
- vous avez plus de 65 ans.

Si vous n'avez pas la certitude que les éléments ci-dessus s'appliquent à votre cas, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Aciclovir Farmaprojects

Il est important de boire suffisamment d'eau pendant le traitement avec Aciclovir Farmaprojects

Autres médicaments et Aciclovir Farmaprojects

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance ou un médicament à base de plantes.

Informez en particulier votre médecin ou pharmacien si vous prenez un des médicaments ci-dessous :

- le probénécide, médicament utilisé dans le traitement de la goutte ;
- la cimetidine, médicament utilisé pour réduire l'acide gastrique ;
- le mycophénolate mofétil, médicament utilisé pour prévenir le rejet d'une greffe.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Certains effets secondaires, comme la somnolence ou le sommeil, peuvent nuire à votre capacité à se concentrer et à réagir. Assurez-vous que vous n'êtes pas affecté avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

Aciclovir Farmaprojects contient du sodium :

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Aciclovir Farmaprojects

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Prise de ce médicament

- Prenez ce médicament par la bouche.
- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre le comprimé avec ou sans nourriture.
- Commencer à prendre Aciclovir Farmaprojects dès que possible.

La dose que vous devez prendre dépend de la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit. Votre médecin en parlera avec vous. Un comprimé de 800 mg est également disponible.

Traitement de la varicelle et du zona

- La dose recommandée est de 800 mg , 5 fois par jour.
- Chaque dose doit être prise toutes les 4 heures
Heures suggérées : 7h, 11h, 15h, 19h et 21h
- Les comprimés doivent être pris pendant 7 jours.

Traitement des boutons de fièvre et de l'herpès génital

- La dose recommandée est de 200 mg , 5 fois par jour.
- Chaque dose doit être prise toutes les 4 heures
Heures suggérées : 7h, 11h, 15h, 19h et 21h
- Les comprimés doivent être pris pendant 5 jours ou plus si votre médecin vous dit de le faire.

Arrêter ces infections de réapparaître après les avoir contractées

- La dose recommandée est de 200 mg , 5 fois par jour.
- Chaque dose doit être prise toutes les 6 heures
- Les comprimés doivent être pris jusqu'à ce que votre médecin vous dit d'arrêter.

Arrêter ces infections chez les patients dont la résistance est fortement diminuée et dont le corps n'est plus capable de lutter contre ces infections

- La dose recommandée est de 200 mg , 5 fois par jour.
- Chaque dose doit être prise toutes les 6 heures
- Les comprimés doivent être pris jusqu'à ce que votre médecin vous dit d'arrêter.

Votre médecin peut ajuster votre dose d'Aciclovir Farmaprojects; si :

- c'est pour un enfant ;
- vous avez plus de 65 ans ;
- vous avez des problèmes au niveau des reins. Si vous avez des problèmes au niveau des reins, il est important de boire beaucoup d'eau pendant votre traitement avec l'Aciclovir Farmaprojects

Parlez à votre médecin avant de prendre Aciclovir Farmaprojects si l'une des situations ci-dessus vous concerne.

Si vous avez pris plus de Aciclovir Farmaprojects que vous n'auriez dû

Aciclovir Farmaprojects n'est habituellement pas nocif, sauf si vous en prenez une quantité trop importante pendant plusieurs jours. Si vous prenez trop d'Aciclovir Farmaprojects, consultez votre médecin ou votre pharmacien et emportez l'emballage du médicament.

Les signes de surdosage sont entre autres des effets gastro-intestinaux tels que nausées et vomissements et des effets sur le système nerveux tels que céphalée et confusion.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Aciclovir Farmaprojects, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Aciclovir Farmaprojects

- Si vous oubliez de prendre Aciclovir Farmaprojects, prenez-le dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de prendre votre dose suivante, sautez la dose oubliée.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions allergiques (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 1.000)

Si vous présentez une réaction allergique, **arrêtez de prendre Aciclovir Farmaprojects et consultez immédiatement un médecin.**

Les signes peuvent inclure :

- une éruption cutanée, une démangeaison ou une urticaire sur la peau ;
- un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties de votre corps ;
- une haleine courte, une respiration sifflante ou un trouble de la respiration ;
- un collapsus.

Les autres effets indésirables comportent :

Fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- maux de tête ;
- vertiges ;
- nausées, vomissements ;
- diarrhée ;
- douleurs abdominales ;
- éruption cutanée ;
- réaction cutanée après exposition au soleil (photosensibilité) ;

- démangeaisons ;
- sensation de fatigue ;
- une fièvre inexpliquée (température élevée) et une sensation d'évanouissement, en particulier lorsque vous vous levez.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- urticaire, éruption cutanée identique à celle provoquée par la piqure d'ortie) ;
- chute de cheveux.

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1.000)

- effets sur certains tests sanguins et urinaires ;
- augmentations des enzymes du foie.

Très rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10.000)

- réduction du nombre de globules rouges (anémie) ;
- réduction du nombre de globules blancs (leucopénie) ;
- réduction du nombre de plaquettes sanguines (cellules qui aident le sang à coaguler) (thrombocytopénie) ;
- sensation de faiblesse ;
- sensation d'agitation ou de confusion ;
- tremblements ;
- hallucinations (voir ou entendre des choses inexistantes) ;
- crises convulsives ;
- sensation inhabituelle de somnolence ;
- instabilité lors de la marche et manque de coordination ;
- difficulté à parler ;
- incapacité à penser ou à juger clairement ;
- inconscience (coma) ;
- paralysie d'une partie ou de l'ensemble de votre corps ;
- troubles du comportement, de l'élocution et des mouvements oculaires ;
- raideur de la nuque et sensibilité à la lumière ;
- inflammation du foie (hépatite) ;
- jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse) ;
- problèmes rénaux au cours desquels vous n'émettez que peu sinon pas d'urine ;
- douleur dans le bas du dos, la région des reins de votre dos ou juste au-dessus de vos hanches (douleur rénale).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte Postale 97

B-1000 BRUXELLES MadouSite internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@afmps.be

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB)

CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois

Rue du Morvan

54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87
e-mail: crpv@chru-nancy.fr

[ou]

Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél.: (+352) 2478 5592
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Aciclovir Farmaprojects

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Aciclovir Farmaprojects

- La substance active est l'aciclovir. Chaque comprimé contient 200 mg d'aciclovir.
- Les autres composants sont : povidone K 30 (E1201), carboxyméthylamidon de sodium réticulée A (E468), cellulose microcristalline (E460) et stéarate de magnésium (E470b).

Aspect de Aciclovir Farmaprojects et contenu de l'emballage extérieur

Aciclovir Farmaprojects 200 mg comprimés sont blancs, ronds, biconvexes portant la mention « 200 » gravée sur une face.

Les comprimés sont fournis dans une boîte contenant 25 et 30 comprimés en plaquettes PVC/Alu.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Farmaprojects, S.A.U.
Carrer Provença 392, 6a Planta
08025 Barcelona
Espagne

Fabricant

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19 Pelplińska Str.
83-200 Starogard Gdański
Pologne

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

Numéro(s) de l'autorisation de mise sur le marché

BE514835

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

ES: Aciclovir Farmaprojects 200 mg comprimidos EFG

BE : Aciclovir Farmaprojects 200 mg comprimés

LU : Aciclovir Farmaprojects 200 mg comprimés

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2023.