

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Aciclovir AB 200 mg Tabletten**

Aciclovir

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Aciclovir AB und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Aciclovir AB beachten?
3. Wie ist Aciclovir AB einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aciclovir AB aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Aciclovir AB und wofür wird es angewendet?**

Aciclovir AB enthalten ein Arzneimittel, Aciclovir genannt. Dies gehört zu einer Gruppe der antiviralen Arzneimittel. Es wirkt durch das Töten oder Stoppen des Wachstums von Viren.

Aciclovir AB kann angewendet werden:

- zur Behandlung von Windpocken und Gürtelrose;
- zur Behandlung von Fieberblasen, genitalem Herpes und anderen Herpes simplex Infektionen;
- um ein Wiederauftreten dieser Infektionen zu verhindern, wenn Sie schon einmal eine Infektion gehabt haben;
- um die Infektionen zu vermeiden bei Patienten mit einem stark geschwächtem Immunsystem und wasser Körper weniger in der Lage ist, Infektionen zu bekämpfen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Aciclovir AB beachten?**

**Aciclovir AB darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Aciclovir oder Valaciclovir oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Sie dürfen Aciclovir AB Tablets nicht einnehmen, wenn einer der genannten Punkte auf Sie zutrifft. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der Einnahme von Aciclovir AB Tablets bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Aciclovir AB einnehmen, wenn:

- Sie Nierenprobleme haben.
- Sie älter als 65 Jahre sind.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob einer dieser Warnhinweise auf Sie zutrifft, sprechen Sie vor der Einnahme von Aciclovir AB mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Während der Einnahme von Aciclovir AB ist es sehr wichtig, dass Sie regelmäßig Wasser trinken.

### **Einnahme von Aciclovir AB zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Dies schließt Arzneimittel ein, die ohne Rezept erhalten wurden, einschließlich pflanzlicher Arzneimittel.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Probenecid, Arzneimittel gegen Gicht.
- Cimetidin, Arzneimittel, das die Produktion von Magensäure hemmt.
- Mycophenolatmofetil, Arzneimittel, um Abstoßung eines transplantierten Organs zu vermeiden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Einige Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit oder Schlaf können Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht betroffen sind, bevor Sie fahren oder Maschinen bedienen.

Aciclovir AB enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, dh im Wesentlichen „natriumfrei“..

### **3. Wie ist Aciclovir AB einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### **Hinweise zur Einnahme**

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel über den Mund ein.
- Schlucken Sie die Tabletten im Ganzen mit einem Glas Wasser.
- Beginnen Sie mit der Einnahme von Aciclovir AB so schnell wie möglich.

Die empfohlene Dosis hängt davon ab, wofür Ihnen Ihr Arzt Aciclovir AB verschrieben hat. Ihr Arzt wird das mit Ihnen besprechen. Eine 800 mg Tablette ist ebenfalls erhältlich.

#### **Behandlung von Windpocken und Gürtelrose**

- Die übliche Dosis beträgt eine 800 mg Tablette, 5 mal am Tag eingenommen.
- Jede dosis sollte alle 4 Stunden eingenommen werden.
- Die Vorgeschlagene Zeiten sind: 7 Uhr, 11 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr.
- Aciclovir AB müssen 7 Tage lang eingenommen werden.

#### **Behandlung von Fieberblasen und Genitalherpes**

- Die übliche Dosis beträgt eine 200 mg Tablette, 5 mal am Tag eingenommen. Jede dosis sollte alle 4 Stunden eingenommen werden. Die Vorgeschlagene Zeiten sind: 7 Uhr, 11 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr.
- Aciclovir AB müssen 5 Tage lang eingenommen werden, oder länger, wenn Ihr Arzt es Ihnen empfiehlt.

#### **Verhinderung des Wiederauftretens dieser Probleme, nachdem Sie es gehabt haben.**

- Die übliche Dosis beträgt eine 200 mg Tablette, 4 mal am Tag eingenommen.
- Jede dosis sollte alle 6 Stunden eingenommen werden.
- Sie sollten Aciclovir AB so lange einnehmen, bis Ihr Arzt Ihnen sagt, dass Sie aufhören sollen.

#### **Verhinderung dieser Probleme bei Patienten mit einem stark geschwächtem Immunsystem und wessen Körper weniger in der Lage sind, Infektionen zu bekämpfen.**

- Die übliche Dosis beträgt eine 200 mg Tablette, 4 mal am Tag eingenommen.
- Jede dosis sollte alle 6 Stunden eingenommen werden.
- Sie sollten Aciclovir AB so lange einnehmen, bis Ihr Arzt Ihnen sagt, dass Sie aufhören sollen.

**Ihr Arzt wird möglicherweise die Dosierung von Aciclovir AB anpassen, wenn**

- es für ein Kind ist ;
- Sie über 65 Jahre alt sind ;
- Sie Nierenprobleme haben. Wenn Sie Nierenprobleme haben, ist es wichtig, viel Wasser zu trinken, während Sie mit Aciclovir AB behandelt werden.

Wenn einer dieser Punkte auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Aciclovir AB einnehmen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Aciclovir AB eingenommen haben, als Sie sollten**

Aciclovir AB ist normalerweise nicht schädlich, wenn Sie nicht über mehrere Tage zu viel davon einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie zu viel Aciclovir AB eingenommen haben. Nehmen Sie die Tablettenpackung dafür mit.

Wenn Sie eine größere Menge von Aciclovir AB eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

**Wenn Sie die Einnahme von Aciclovir AB vergessen haben**

- Wenn Sie vergessen haben, Aciclovir AB einzunehmen, nehmen Sie es, sobald Sie sich daran erinnern. Wenn es dann aber schon fast Zeit ist für Ihre nächste Dosis, lassen Sie die vergessene Dosis aus.
- Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Allergische Reaktionen** (kann bis zu 1 von 1000 Personen betreffen)

Wenn Sie eine allergische Reaktion entwickeln, **nehmen Sie Aciclovir AB Tablets nicht mehr ein und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.**

Die möglichen Anzeichen umfassen:

- Ausschlag, Juckreiz oder Quaddeln auf Ihrer Haut;
- Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder anderen Körperteilen;
- Kurzatmigkeit, pfeifende Atmung oder Atembeschwerden;
- Kollaps

**Andere Nebenwirkungen umfassen:****Häufig** (kann bis zu 1 von 10 Personen treffen):

- Kopfschmerzen;
- Schwindel;
- Übelkeit oder Erbrechen;
- Durchfall;
- Magenschmerzen;
- Hautausschlag;
- Hautreaktion nach Einwirkung von Licht (Lichtempfindlichkeit);
- Juckreiz;
- Müdigkeit;
- unerklärliches Fieber (hohe Temperatur) und Schwächegefühl, vor allem beim Aufstehen.

**Gelegentlich** (kann bis zu 1 von 100 Personen treffen):

- Juckreiz, den typischen schwarmartigen Ausschlag;

- Haarausfall.

**Selten** (kann bis zu 1 von 1000 Personen treffen):

- Auswirkungen auf einige Blut-und Urintests;
- Anstieg von Substanzen, die in der Leber produziert werden.

**Sehr selten** (kann bis zu 1 von 10.000 Personen treffen):

- Verringerung der Anzahl roter Blutkörperchen (Anämie);
- Verringerung der Anzahl weißer Blutkörperchen (Leukopenie);
- Verringerung der Anzahl von Blutplättchen (Blutkörperchen, die für die Blutgerinnung wichtig sind) (Thrombozytopenie);
- Schwächegefühl;
- Erregtheit oder Verwirrtheit;
- Zittern oder Tremor;
- Halluzinationen (Dinge sehen oder hören, die nicht da sind);
- Anfälle;
- Unübliche Schläfrigkeit oder Benommenheit;
- Unsicherheit beim Gehen oder Koordinationsstörung;
- Sprechstörungen;
- Unfähigkeit, klar zu denken oder zu urteilen;
- Bewusstlosigkeit (Koma);
- Lähmung von Körperteilen, oder des ganzen Körpers;
- Störungen von Verhalten, Sprechvermögen und Augenbewegungen;
- steifer Nacken und Lichtempfindlichkeit;
- Leberentzündung (Hepatitis);
- Gelbfärbung der Haut oder des Augenweißes (Gelbsucht);
- Nierenprobleme, bei denen Sie wenig oder kein Wasser lassen;
- Schmerzen im Unterrücken, im Bereich der Nieren im Rücken oder über der Hüfte (Nierenschmerzen).

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, Avenue Galilée - Galileelaan 5/03, 1210 BRÜSSEL - Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be) - e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Aciclovir AB aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett, dem Umkarton und dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Dieses Arzneimittel erfordert keine besonderen Lagerbedingungen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Aciclovir AB enthält**

- Der Wirkstoff ist: Aciclovir. Jede 200 mg Tablette enthält 200 mg Aciclovir.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Cellulose, mikrokristallin [Klasse 101], Natriumstärkeglykolat [Typ - A], Povidon [K - 30], Wasserfreies Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat.

### **Wie Aciclovir AB aussieht und Inhalt der Packung**

#### Tablette

Weiß bis cremefarbene, runde, bikonvexe, unbeschichtete Tabletten, die auf der einen Seite mit „AR 200“ geprägt und auf der anderen Seite glatt sind.

Aciclovir AB Tabletten sind in einer Blisterpackung verpackt.

Packungsgrößen:

20, 25, 30, 35, 50, 70, 100 und 500 Tabletten

Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

*Pharmazeutischer Unternehmer*

Aurobindo N.V., E. Demunterlaan 5 box 8, 1090 Brüssel

*Hersteller*

APL Swift Services (Malta) Ltd  
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far  
BBG 3000, Birzebbugia  
Malta

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19

2700-487 Amadora

Portugal

Arrow Génériques- Lyon

26 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankreich

*Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.*

Aurobindo N.V., E. Demunterlaan 5 box 8, 1090 Brüssel

### **Art der Abgabe**

Verschreibungspflichtig

### **Zulassungsnummer(n)**

BE562773

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Belgien:	Aciclovir AB 200 mg tabletten
Tschechien:	Aciclovir Aurovitas
Frankreich:	Aciclovir Arrow génériques 200 mg comprimé
Deutschland:	Aciclovir PUREN 200 mg Tabletten
Niederlande:	Aciclovir Aurobindo 200 mg, tabletten
Polen:	Aciclovir Aurovitas
Portugal:	Aciclovir Generis Phar
Rumänien:	Aciclovir Aurobindo 200mg comprimate
Spanien:	Aciclovir Aurobindo 200 mg comprimidos EFG

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 09/2023.**