

Notice : information du patient

Alprazolam Grindeks 0,25 comprimés
Alprazolam Grindeks 0,5 comprimés
Alprazolam Grindeks 1 mg comprimés

alprazolam

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Alprazolam Grindeks et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Alprazolam Grindeks
3. Comment prendre Alprazolam Grindeks
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Alprazolam Grindeks
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Alprazolam Grindeks et dans quel cas est-il utilisé

Alprazolam Grindeks est un sédatif qui appartient à la famille des benzodiazépines.

Alprazolam Grindeks est utilisé chez l'adulte pour le traitement des symptômes d'anxiété lorsqu'ils sont sévères, invalidants ou qu'ils provoquent une grande détresse chez le patient. Ce médicament est uniquement destiné à une utilisation à court terme.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Alprazolam Grindeks

Ne prenez jamais Alprazolam Grindeks

- si vous êtes allergique à l'alprazolam, à d'autres benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous souffrez d'une maladie appelée « myasthénie grave », une maladie qui provoque une faiblesse et une fatigue des muscles,
- si vous souffrez de problèmes au niveau de votre poitrine ou de difficultés respiratoires (p. ex. une bronchite chronique ou de l'emphysème),
- si vous souffrez du « syndrome d'apnée du sommeil » (lorsque votre respiration devient irrégulière, ou même s'arrête pour de courtes périodes, pendant que vous dormez),
- si vous avez des problèmes au foie.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Alprazolam Grindeks

- si avez actuellement ou avez eu dans le passé une consommation abusive d'alcool, de drogues ou de médicaments,
- si vous pris de l'alprazolam pendant une longue période, car l'effet peut diminuer,

- si votre état général est altéré,
- si vous souffrez de problèmes aux poumons, aux reins ou au foie,
- si vous prenez des médicaments pour une maladie mentale.

Dépendance

L'utilisation d'Alprazolam Grindeks peut entraîner une dépendance physique et mentale au médicament.

Le risque de dépendance augmente avec la dose et la durée du traitement, c'est pourquoi la durée du traitement doit être la plus courte possible. Respectez les recommandations de votre médecin concernant la dose (voir rubrique 3). Vous remarquez une dépendance psychologique, mais vous ne voulez pas arrêter de prendre le médicament. La dépendance physique signifie que des symptômes de sevrage apparaissent lorsque le médicament est arrêté brutalement. Le risque est également plus élevé chez les patients qui ont ou ont eu une consommation abusive d'alcool ou de médicaments (voir également la rubrique 3 « Si vous arrêtez de prendre Alprazolam Grindeks »). L'abus médicamenteux est un risque connu d'Alprazolam Grindeks. Si ce médicament est consommé abusivement, il peut entraîner un surdosage et le décès. Respectez toujours les recommandations de votre médecin concernant la dose (voir rubrique 3). Ce médicament pourrait être convoité par des personnes qui ont une consommation abusive de médicaments obtenus sur prescription, il doit donc être conservé hors de la portée des autres personnes.

Troubles de la mémoire

Vous pourriez souffrir de troubles de la mémoire pendant votre traitement par alprazolam. Ces troubles apparaissent généralement quelques heures après la prise du médicament. Veuillez vous adresser à votre médecin si vous remarquez ce symptôme. Pour réduire le risque, vous devez veiller à avoir une nuit de sommeil complète (7 à 8 heures) pendant votre traitement.

Maladie mentale (psychose)

Alprazolam Grindeks n'est pas approprié si vous souffrez de psychose, une maladie mentale sévère qui entraîne des problèmes de comportement, dans vos actions et dans votre maîtrise de soi.

Impact sur l'humeur

L'utilisation d'alprazolam peut augmenter le risque d'épisodes d'hypomanie (une forme plus légère de manie) et de manie (un état d'hyperactivité mentale, une exaltation et une énergie excessives) chez les patients souffrant de dépression. Contactez immédiatement votre médecin si des symptômes d'hypomanie ou de manie apparaissent.

Dépression, pensées d'automutilation et pensées suicidaires

Si vous souffrez de dépression, le traitement par alprazolam peut augmenter le risque d'avoir des pensées d'automutilation ou des pensées suicidaires. Veuillez vous adresser à votre médecin avant de commencer un traitement par alprazolam.

Si un traitement par alprazolam est nécessaire et que vous souffrez de dépression ou que vous avez déjà eu des pensées d'automutilation ou des pensées suicidaires, votre médecin vous surveillera étroitement. Si des pensées d'automutilation ou des pensées suicidaires apparaissent, contactez votre médecin ou rendez-vous dans un hôpital **immédiatement**.

Patients âgés

Si vous êtes une personne âgée, soyez particulièrement prudente si vous utilisez de l'alprazolam parce que ce médicament peut augmenter la fatigue et/ou la faiblesse des muscles et accroître le risque de chutes.

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans, car la sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies.

Autres médicaments et Alprazolam Grindeks

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'effet de ce traitement peut être affecté si Alprazolam Grindeks est utilisé en même temps que d'autres médicaments pour traiter les affections mentionnées ci-dessous. Votre médecin pourrait devoir ajuster votre dose.

- Problèmes mentaux (médicaments antipsychotiques, dont la clozapine)
- Troubles du sommeil (somnifères)
- Allergies ou rhume des foins (certaines antihistaminiques)
- Si vous devez subir une intervention chirurgicale majeure (anesthésiques)
- Douleurs sévères (analgésiques narcotiques, p. ex. le dextropropoxyphène)
- Traitement contre l'addiction médicamenteuse (traitement de substitution)
- Problèmes tels que l'anxiété ou la dépression, y compris certains antidépresseurs contenant de la fluoxétine, de la fluvoxamine, du néfazodone ou de l'imipramine
- Insuffisance cardiaque (digoxine)
- Infections (antibiotiques contenant de l'érythromycine, de la clarithromycine ou de la télicycline)
- Infections fongiques (itraconazole, fluconazole, kétoconazole, posaconazole, voriconazole)
- Médicaments pour traiter l'angine de poitrine ou l'hypertension, tels que le diltiazem
- VIH et SIDA (inhibiteurs de protéase du VIH, tels que le ritonavir)
- Brûlures d'estomac et ulcère gastrique (cimétidine ou oméprazole)
- Asthme et bronchite (théophylline)
- Épilepsie (carbamazépine)
- Médicaments myorelaxants. Lorsque ces médicaments sont utilisés avec l'alprazolam, l'effet décontractant sur les muscles peut être accru et il peut y avoir un risque de chutes.

L'utilisation concomitante d'Alprazolam Grindeks et d'opioïdes (antidouleurs puissants utilisés dans le traitement de substitution et certains remèdes contre la toux) augmente le risque de somnolence, de difficultés respiratoires (dépression respiratoire), de coma et peut menacer le pronostic vital. De ce fait, l'utilisation concomitante ne doit être envisagée que s'il n'existe aucune autre option de traitement.

Cependant, si votre médecin vous prescrit Alprazolam Grindeks avec des opioïdes, la dose et la durée du traitement concomitant devra être limitée par votre médecin.

Veuillez informer votre médecin de tous les médicaments opioïdes que vous prenez et suivre scrupuleusement les recommandations de votre médecin concernant la dose. Il pourrait être utile d'informer vos amis ou parents d'être attentifs aux signes et symptômes indiqués ci-dessus. Contactez votre médecin si vous présentez ces symptômes.

Il est également possible que l'effet du traitement par alprazolam soit affecté par la prise de l'un de ces médicaments : la pilule, la rifampicine (pour le traitement des infections) ou le millepertuis (plante médicinale).

Alprazolam Grindeks avec de l'alcool

Vous devez vous abstenir de consommer de l'alcool pendant le traitement par Alprazolam Grindeks, car l'alcool peut modifier et augmenter l'effet d'Alprazolam Grindeks de manière imprévisible.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Vous devez avertir immédiatement votre médecin si vous êtes enceinte ou si avez le projet d'être enceinte. Des observations chez l'homme ont montré que l'alprazolam peut être nocif pour le fœtus

(risque de malformation accru [fente labio-palatine]). Pendant la grossesse, l'alprazolam ne peut être utilisé que si le médecin a déterminé que les bénéfices du traitement sont supérieurs aux risques encourus par l'enfant à naître et que si le médicament vous convient. Si vous utilisez Alprazolam Grindeks jusqu'à l'accouchement, vous devez en informer votre médecin, car votre nouveau-né pourrait présenter des symptômes de sevrage après la naissance.

Allaitement

Vous ne devez pas prendre Alprazolam Grindeks si vous allaitez. L'alprazolam passe dans le lait maternel. Si votre médecin a décidé de vous prescrire ce médicament, vous devez arrêter l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Même lorsque Alprazolam Grindeks est utilisé conformément aux instructions, il peut altérer vos capacités de réaction du point de compromettre votre aptitude à conduire et à utiliser des machines. Ce risque est particulièrement élevé en début de traitement, lorsque la dose est augmentée, si vous ne dormez pas assez ou si vous consommez de l'alcool ou prenez d'autres substances qui agissent sur le système nerveux central. Vous ne devez donc pas conduire, utiliser des machines ou entreprendre des activités dangereuses, ou au moins pendant les premiers jours du traitement. La décision sera prise au cas par cas par le médecin traitant.

Alprazolam Grindeks contient du lactose, du sodium et de benzoate de sodium (E211)

Lactose : Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Sodium : Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Benzoate de sodium : Ce médicament contient 0,12 mg de benzoate de sodium par comprimé.

3. Comment prendre Alprazolam Grindeks

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Sauf indication contraire de votre médecin, les recommandations posologiques s'appliquent :

Dose de départ : en général, au début du traitement, la dose est de 0,25 à 0,5 mg d'alprazolam trois fois par jour.

Dose d'entretien : si votre état le justifie, votre médecin pourra augmenter progressivement votre dose pour atteindre 3 à 4 mg que vous prendrez en plusieurs prises.

Patients âgés et sensibles ou patients affaiblis

Si vous êtes une personne âgée et sensible et si vous nécessitez une dose plus faible, vous commencerez normalement votre traitement à la dose de 0,25 mg deux à trois fois par jour. Si nécessaire et si vous n'avez pas d'effet secondaire, la dose pourra être augmentée lentement.

Patients souffrant de problèmes rénaux ou hépatiques

Si vous avez des problèmes aux reins ou au foie, votre médecin ajustera la dose.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Alprazolam Grindeks ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans.

Mode d'administration

Alprazolam Grindeks est destiné à une administration par voie orale. Prenez les comprimés avec du liquide (p. ex. un demi-verre d'eau).

Les comprimés présentent une barre de cassure qui permet de diviser le comprimé en doses égales.

Durée du traitement

Le risque de dépendance et d'abus peut augmenter avec la dose et la durée du traitement. Le médecin vous prescrira alors la dose efficace la plus faible pour la durée la plus courte possible, et il réévaluera fréquemment la nécessité de poursuivre le traitement.

La durée maximale du traitement ne doit pas dépasser 2 à 4 semaines. Un traitement à long terme n'est pas recommandé. L'effet du médicament peut s'estomper si vous l'utilisez au-delà de quelques semaines.

Si vous avez pris plus de Alprazolam Grindeks que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Alprazolam Grindeks, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Les signes d'un (léger) surdosage peuvent être une somnolence, des étourdissements, des troubles de la vue, des difficultés d'élocution, une chute de la tension artérielle, une démarche instable/des problèmes de coordination des mouvements et une faiblesse musculaire. En cas d'intoxication sévère, un sommeil profond voire une perte de connaissance, des difficultés respiratoires et un collapsus circulatoire peuvent survenir. La surveillance en unité de soins intensifs est essentielle.

Le médecin évaluera le degré d'intoxication et prendra les mesures nécessaires pour la traiter.

Si vous oubliez de prendre Alprazolam Grindeks

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous oubliez de prendre votre dose, passez la dose oubliée et continuez à prendre Alprazolam Grindeks comme prescrit par votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre Alprazolam Grindeks

Consultez toujours votre médecin avant d'arrêter de prendre Alprazolam Grindeks, car la dose doit être réduite progressivement. Si vous arrêtez de prendre les comprimés ou si vous réduisez la dose brusquement, vous pourriez présenter des effets « rebond » qui, pendant un moment, vous rendraient plus anxieux et agité ou vous occasionneraient des difficultés à dormir. Certaines personnes présentent également des effets « de sevrage » (voir rubrique 4 « Dépendance et symptômes de sevrage »). Ces symptômes disparaîtront au fur et à mesure que votre corps se réadaptera. Si vous êtes inquiet, votre médecin peut vous expliquer ces effets plus en détail. Pour cette raison, votre médecin réduira progressivement la dose lorsque le traitement sera terminé. La dose est réduite en fonction des besoins individuels, car l'arrêt progressif dépend de plusieurs facteurs (p. ex. la durée du traitement et votre dose quotidienne). Demandez à votre médecin comment réduire votre dose progressivement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Raisons pour lesquelles vous devez consulter un médecin immédiatement

Si vous présentez l'un de ces symptômes, vous devez consulter immédiatement votre médecin, car le traitement devra être arrêté. Votre médecin vous dira alors comment arrêter le traitement.

- Le traitement par alprazolam peut avoir de graves effets comportementaux ou psychiatriques (par exemple agitation, impatience, agressivité, irritabilité, colère violente, fausses croyances, cauchemars et hallucinations ou autre comportement inapproprié).
- Respiration sifflante, difficulté à avaler ou à respirer, gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, éruption cutanée ou démangeaisons (en particulier si elles affectent l'ensemble du corps) apparaissant brusquement.

Raisons pour lesquelles vous devez consulter votre médecin dès que possible

Informez votre médecin dès que possible si vous présentez les symptômes suivants, car votre dose ou votre traitement pourrait devoir être modifié :

- Perte de mémoire (amnésie).
- Jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse).

Dépendance et symptômes de sevrage

Il est possible de développer une dépendance aux médicaments comme l'alprazolam pendant votre traitement, ce qui augmente la probabilité de présenter des symptômes de sevrage lorsque vous arrêtez le traitement. Les symptômes de sevrage sont plus fréquents si :

- vous arrêtez le traitement brusquement
- vous avez pris des doses élevées
- vous avez pris ce médicament longtemps
- vous avez des antécédents de consommation abusive d'alcool ou de drogues

Vous pourriez alors présenter des effets tels que maux de tête, douleurs musculaires, anxiété extrême, tension, agitation, confusion, sautes d'humeur, difficultés à dormir et irritabilité.

Dans les cas extrêmes, vous pourriez également présenter les symptômes suivants : nausées, vomissements, sueurs, crampes d'estomac, crampes musculaires, sensation d'irréalité ou de détachement, sensibilité inhabituelle aux bruits, à la lumière, aux contacts physiques, engourdissement et picotements dans les pieds et les mains, hallucinations (voir ou entendre des choses qui ne sont pas là lorsque vous êtes éveillé), tremblements ou crises d'épilepsie. Vous devez avertir votre médecin si l'un de ces symptômes de sevrage s'aggrave ou de disparaît pas.

Autres effets indésirables susceptibles de survenir :

Très fréquent : peut affecter plus de 1 personne sur 10

- Dépression
- Envie de dormir et somnolence
- Secousses, manque de coordination des mouvements
- Incapacité à retenir des bribes d'informations
- Difficultés d'élocution
- Étourdissements, tête qui tourne
- Maux de tête
- Constipation
- Bouche sèche
- Fatigue
- irritabilité

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- Perte d'appétit
- Confusion et désorientation
- Modification de la libido (hommes et femmes)
- Nervosité ou anxiété ou agitation
- Insomnie (incapacité à dormir ou sommeil perturbé)
- Problèmes d'équilibre, vacillations (comme si on était saoul), en particulier pendant la journée
- Manque de vivacité d'esprit ou de concentration
- Incapacité à rester éveillé, léthargie
- Tremblements
- Vision double ou floue
- Nausées

- Réactions cutanées
- Variations du poids corporel

Peu fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- Sensation d'exaltation ou de surexcitation provoquant un comportement inhabituel
- Hallucinations (voir ou entendre des choses qui n'existent pas)
- Agitation, colère
- Vomissements
- Spasmes ou faiblesse musculaires
- Incontinence
- Crampes douloureuses dans le bas du dos ou les cuisses pouvant indiquer des troubles menstruels
- Addiction médicamenteuse
- Symptôme de sevrage médicamenteux

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

- Chez les femmes, règles irrégulières ou production trop élevée de prolactine (l'hormone qui stimule la production de lait)
- Hostilité ou agressivité
- Pensées anormales
- Mouvements de torsion ou de secousse
- Hyperactivité
- Maux d'estomac
- Problèmes au niveau du foie (visibles dans les analyses de sang), inflammation du foie (hépatite)
- Déséquilibre du système nerveux. Les symptômes peuvent inclure : battements de cœur rapides et tension artérielle instable (étourdissements, tête qui tourne ou évanouissement)
- Grave réaction allergique provoquant un gonflement du visage ou de la gorge
- Gonflement des chevilles, des pieds ou des doigts
- Réaction cutanée provoquée par une sensibilité au soleil
- Difficultés à uriner ou à contrôler sa vessie
- Augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil pouvant affecter la vision
- Consommation abusive de médicaments

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance:

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

5. Comment conserver Alprazolam Grindeks

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Alprazolam Grindeks

La substance active est l'alprazolam.

- Alprazolam Grindeks 0,25 comprimés sécables
Chaque comprimé contient 0,25 mg d'alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 0,5 comprimés sécables
Chaque comprimé contient 0,5 mg d'alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 1 mg comprimés sécables
Chaque comprimé contient 1 mg d'alprazolam.

Les autres composants sont : lactose monohydraté ; cellulose, microcristalline (E460) ; amidon de maïs prégélatinisé ; docusate de sodium ; benzoate de sodium (E211) ; stéarate de magnésium (E572) ; silice colloïdale anhydre (E551), oxyde de fer rouge (E172) (*comprimés à 0.5 mg uniquement*) ; laque carmin d'indigo (E132) (*comprimés à 1 mg uniquement*).

Aspect d'Alprazolam Grindeks et contenu de l'emballage extérieur

Alprazolam Grindeks 0,25 mg est un comprimé blanc ou blanc cassé de forme ovale (10 mm x 5 mm) présentant une barre de cassure sur une face et gravé « 0,25 » sur l'autre face.

Alprazolam Grindeks 0,5 mg est un comprimé rose pâle à rose de forme ovale (10 mm x 5 mm) présentant une barre de cassure sur une face et gravé « 0,5 » sur l'autre face.

Alprazolam Grindeks 1 mg est un comprimé bleu pâle à bleu de forme ovale (10 mm x 5 mm) présentant une barre de cassure sur une face et gravé « 1 » sur l'autre face.

Alprazolam Grindeks est disponible en plaquettes OPA/Alu/PVC//Alu contenant 10, 20, 30, 50, 60 ou 100 comprimés sécables.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettonie

Téléphone : +371 67083205

E-mail : grindeks@grindeks.com

Numéros de l'Autorisation de mise sur le marché

Alprazolam Grindeks 0,25 mg comprimés : BE662888

Alprazolam Grindeks 0,5 mg comprimés : BE662889

Alprazolam Grindeks 1 mg comprimés : BE662890

Mode de délivrance

Sur prescription médicale.

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Économique Européen sous les noms suivants :

Allemagne	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Autriche	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten

Belgique	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
Bulgarie	Алпразолам Гриндекс 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg таблетки
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Croatie	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
République tchèque	Alprazolam Grindeks
Danemark	Alprazolam Grindeks
Estonie	Ixhalanex
Finlande	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
France	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Grèce	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Hongrie	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tableta
Irlande	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Italie	Alprazolam Grindeks
Lettonie	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletes
Lituanie	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luxembourg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pëllen
Pays-Bas	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Pologne	Alprazolam Grindeks
Portugal	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Roumanie	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Slovaquie	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Slovénie	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Espagne	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Suède	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2024.