

**Gebrauchsinformation: Information für Patienten**  
**2LVERU JUNIOR Streukügelchen zur Entnahme aus Kapseln**

Interleukin 1: 10-17CH; Interleukin 2: 10-17CH; Interferon  $\alpha$ : 10-17CH; Ribonukleinsäure: 8-10CH; Spezifische Nukleinsäure SNA-HLAI: 10-18CH; Spezifische Nukleinsäure SNA-VERU: 10-18CH

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist 2LVERU JUNIOR und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 2LVERU JUNIOR beachten?
3. Wie ist 2LVERU JUNIOR einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist 2LVERU JUNIOR aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist 2LVERU JUNIOR und wofür wird es angewendet?**

2LVERU JUNIOR ist ein homöopathisches Arzneimittel, das Inhaltsstoffe enthält, die traditionell in der Mikro-Immuntherapie eingesetzt werden. Es unterstützt die Immunantwort bei der Behandlung von Warzen.

**2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 2LVERU JUNIOR beachten?**

**2LVERU JUNIOR darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie allergisch gegen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie 2LVERU JUNIOR einnehmen.

**Kinder**

Dieses Arzneimittel darf nicht von Kindern unter 3 Jahren eingenommen werden.

**Einnahme von 2LVERU JUNIOR zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Vermeiden Sie Arzneimittel auf Pfefferminzbasis eine Stunde vor der Einnahme des Arzneimittels.

### **Einnahme von 2LVERU JUNIOR zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Der Konsum von Pfefferminze sowie von aufputschenden Produkten (Kaffee, Schokolade) ist eine Stunde vor der sublingualen Einnahme zu vermeiden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Nicht zutreffend.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

2LVERU JUNIOR wirkt sich nicht auf die Verkehrstüchtigkeit oder auf die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen aus.

### **2LVERU JUNIOR enthält Saccharose**

Bitte nehmen Sie 2LVERU JUNIOR erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. Wie ist 2LVERU JUNIOR einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.


### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

*Kinder von 3 bis 12 Jahren:*


Den Inhalt einer Kapsel täglich morgens auf nüchternen Magen unter Beachtung der Nummernfolge von 1 bis 10 der Kapseln, bis die Warzen verschwunden sind.

Die Streukügelchen werden auf nüchternen Magen 15 bis 30 Minuten vor dem Frühstück eingenommen. Wurde die Einnahme vergessen, nehmen Sie die Streukügelchen eine Stunde nach der Mahlzeit ein.


Nicht die gesamte Kapsel hinunterschlucken. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch:




1. Nehmen Sie eine der drei Blisterpackungen aus der Schachtel.



2. Nehmen Sie eine Kapsel unter Einhaltung der Nummernfolge.



3. Öffnen Sie vorsichtig die Kapsel, indem Sie den oberen Teil abnehmen. (\*)



4. Schütten Sie den Kapselinhalt unter die Zunge und lassen Sie diesen dort zergehen.

Bei der nächsten Einnahme halten Sie die Nummernfolge der Kapseln gemäß Beschriftung auf der Blisterpackung (2, 3, ...) ein. Wenn die erste Blisterpackung aufgebraucht ist, fahren Sie mit Kapsel 1 der nächsten Blisterpackung fort, bis die gesamte Schachtel aufgebraucht ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von 2LVERU JUNIOR eingenommen haben, als Sie sollten**

Nach den Grundsätzen der Homöopathie hängt die Wirkung von der Verdünnung und nicht von der Dosierung ab. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von 2LVERU JUNIOR eingenommen haben, sollte die Wirkung nicht stärker sein.

Wenn Sie eine größere Menge von 2LVERU JUNIOR eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

**Wenn Sie die Einnahme von 2LVERU JUNIOR vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie sich in der Reihenfolge der Kapsel-einnahme geirrt oder eine Kapsel vergessen haben, fahren Sie ab der letzten eingenommenen Kapsel fort.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Einnahme auf nüchternen Magen kann in Einzelfällen eine Dyspepsie (Verdauungsstörung) auftreten. In diesem Fall sollten die Streukügelchen eine Stunde nach der Mahlzeit eingenommen werden.

Bei der Einnahme nach 16 Uhr können Schwierigkeiten beim Einschlafen auftreten.

Wie bei jeder homöopathischen Behandlung kann der Eindruck einer Verschlimmerung der Symptome auftreten (Erstverschlimmerung), der hingegen in der Regel einige Tage später nachlässt. Dauert dieser Eindruck an, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Bei auftretenden Nebenwirkungen sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Unterbrechen Sie die Behandlung nicht ohne Zustimmung Ihres Arztes.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über:

### **BELGIEN**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz:

Website: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

### **LUXEMBURG**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist 2LVERU JUNIOR aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die beiden ersten Zahlen stehen für den Monat, die vier weiteren für das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was 2LVERU JUNIOR enthält**

- Die Wirkstoffe sind:

Jede Sequenz von 5 Kapseln enthält:

Interleukin 1 (IL-1):	10-17CH
Interleukin 2 (IL-2):	10-17CH
Interferon $\alpha$ (IFN $\alpha$ ):	10-17CH
Ribonukleinsäure (RNS):	8-10CH
Spezifische Nukleinsäure SNA-HLAI:	10-18CH
Spezifische Nukleinsäure SNA-VERU:	10-18CH

- Die sonstigen Bestandteile sind:

Streukügelchen: Saccharose

Kapseln: Gelatine, blauer Farbstoff (je nach Kapsel): Brillantschwarz BN (E151), schwarzes Eisenoxid (E172), Indigotin (E132), Opacifier: Titandioxid (E171).

**Wie 2LVERU JUNIOR aussieht und Inhalt der Packung**

2LVERU JUNIOR ist in Form imprägnierter Streukügelchen.

Verabreichung: sublingual

Schachtel mit 30 Kapseln

Die Streukügelchen werden in Gelatinekapseln verpackt, wie unter Punkt 3 angegeben.  
Diese Kapseln werden nicht geschluckt.

Die Kapseln sind in Al/PVC-Blisterpackungen enthalten. Jede Blisterpackung enthält 10 Kapseln.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer:

LABO'LIFE BELGIUM, GmbH. Aut 1507 H

Av. d'Ecolys 2 bte 36

5020 Namur, BELGIEN

Tel (32) (0)81 40 87 81 - Fax (32) (0)81 40 87 89

Hersteller:

LABO'LIFE ESPAÑA, S.A. No Reg.3.279 E

Av. des Raiguer 7

07330 Consell, SPANIEN

**Zulassungsnummer:**

**Belgien:** HO-BE508542

**Großherzogtum Luxemburg:** 2018060138

**Abgabestatus**

Verschreibungspflichtig.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12.2024 .**