

代数几何课程笔记

minamomo

Monday 5th October, 2026

References:

[1]

Marks:

1.

1. 定义 **Definition**.

2. 定理 **Theorem**.

3. 例题 **Example**.

4. 习题 **Exercise**.

Preface

minamomo
2026.9 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	14th Sept. Lecture 1 曲线的参数化	7
2	21th Sept. Lecture 2 简单相交理论	9
3	23th Sept. Lecture 3 退化圆锥曲线	11
4	28th Sept. Lecture 4 一般椭圆曲线	15

Chapter 1

14th Sept. Lecture 1 曲线的参数化

射影平面 $\mathbb{P}^2(k)$ 内的直线 $l = ax + by - z$ 有参数化

$$\begin{aligned}\alpha: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [x, y] &\mapsto [x, y, ax + by].\end{aligned}$$

过两点 $[x_1, y_1, z_1]$ 和 $[x_2, y_2, z_2]$ 的直线 $l = ax + by + cz$ 满足

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0.$$

如果一点 $[x, y, z]$ 也在 l 上, 则

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$$

表明矩阵行线性相关, 从而

$$[x, y, z] = [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2, \lambda z_1 + \mu z_2].$$

注意射影空间的定义商掉了等价关系, 因此 $\lambda : \mu$ 一定的所有 (λ, μ) 给出的是相同的点, 因此可以认为 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$, 给出了直线的一般参数化

$$\begin{aligned}\alpha: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [\lambda, \mu] &\mapsto [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2, \lambda z_1 + \mu z_2].\end{aligned}$$

形如 $c = z^2 - xy$ 的圆锥曲线有参数化

$$\begin{aligned}\alpha: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [u^2, v^2, uv],\end{aligned}$$

容易验证这是一个双射.

一般三次曲线无参数化.

Chapter 2

21th Sept. Lecture 2 简单相交理论

设 k 为代数闭域, f 为平面射影曲线, 则 f 总是可以分解为一次式乘积

$$f = \prod_{i=1}^r (\beta_i x - \alpha_i y)^{m_i},$$

其中 $[\alpha_i, \beta_i] \in \mathbb{P}^1(k)$. 称 m_i 为 f 关于点 $[\alpha_i, \beta_i]$ 的**重数 (multiplicity)**.

以下考虑 Bezout 定理的简单形式.

设 $f = l$ 为直线, g 为 d 次二元齐次式 (d 次平面射影曲线), f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 l 变为无穷远直线 $l = z$. 由于 f 不包含于 g , 则 $g(x, y, 0)$ 不为零多项式, $g(x, y, 0) = 0$ 的解恰好与 $f \cap g$ 一一对应, 但 d 次多项式至多有 d 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq d$.

设 $f = c$ 为圆锥曲线, g 为 d 次二元齐次式, f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 c 变为 $c = z^2 - xy$. 注意到 c 有参数化 $[u^2, v^2, uv]$, 因此 c 与 g 的交点与 $g(u^2, v^2, uv) = 0$ 在 $\mathbb{P}^1(k)$ 内的解一一对应, 而 $2d$ 次多项式至多有 $2d$ 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq 2d$.

如果 c_1, c_2 为射影圆锥曲线, 均经过五点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$, 且无四点共线. 我们证明 c_1 与 c_2 相同.

先考虑有一个非退化的情形, 不妨设为 c_1 . 如果此时 $c_1 \subseteq c_2$, 则通过射影变换让 $c_1 = z^2 - xy$, 并将 c_2 按 z 的幂次排列为

$$c_2(x, y, z) = A(x, y) + zB(x, y) + \lambda(z^2 - xy).$$

考虑 c_1 的参数化, 由于 $c_1 \subseteq c_2$, 必然有

$$c_2(u^2, v^2, uv) = A(u^2, v^2) + uvB(u^2, v^2) = 0$$

恒成立. 注意到左边关于 u 的偶数次幂完全来自于 $A(u^2, v^2)$, 奇数次幂完全来自于 $uvB(u^2, v^2)$, 要恒为 0 只可能两式均为 0, 即 $c_2 = \lambda(z^2 - xy)$, 从而 c_1 与 c_2 确定了相

同的圆锥曲线. 如果此时 c_1 不含于 c_2 , 根据非退化可知无公因子, 否则公因子是一次式, 表明 c_1 退化. 如果 $c_1 \neq c_2$, 则根据 Bezout 定理, 相交数至多为 4, 矛盾.

再考虑 c_1, c_2 均退化的情形, 即均为两条直线的并. 如果 c_1 与 c_2 有公因子, 则必然是一次式 l , 设 $c_1 = ll_1, c_2 = ll_2$, 则交点是 l 上所有点以及 $l_1 \cap l_2$ 的一点, 这表明 P_i 中除了 $l_1 \cap l_2$ 至少有四点在 l 上, 矛盾. 如果 c_1 与 c_2 无公因子, 显然交点数不超过 4, 同样矛盾.

再说明通过这样五点的圆锥曲线的存在性. $\mathbb{P}^2(k)$ 上的圆锥曲线有形式

$$c(x, y, z) = ax^2 + bxy + cy^2 + dxz + eyz + fz^2,$$

从而构成 6 维向量空间. 现在过五个点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$ 给出了关于变量 (a, b, c, d, e, f) 的 5 个线性方程组

$$Av = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1z_1 & y_1z_1 & z_1^2 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2z_2 & y_2z_2 & z_2^2 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3z_3 & y_3z_3 & z_3^2 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4z_4 & y_4z_4 & z_4^2 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5z_5 & y_5z_5 & z_5^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} = 0,$$

从而解空间的维数为 $6 - \text{rank}(A) \geq 6 - 5 = 1$, 这就说明这样的圆锥曲线存在.

Chapter 3

23th Sept. Lecture 3 退化圆锥曲线

平面射影圆锥曲线的一般形式为

$$c(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^T Q \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

在代数闭域 k 上 Q 可作合同对角化变为规范型 $(U\mathbf{v})^T \bar{Q} (U\mathbf{v})$, 其中 $\bar{Q}$ 只能取

$$\text{diag}(0, 0, 0), \text{diag}(1, 0, 0), \text{diag}(1, 1, 0), \text{diag}(1, 1, 1)$$

之一. 如果 c 退化, 则作为多项式可约, 作换元 $\mathbf{u} = U\mathbf{v} = (x', y', z')$ 后必定仍然可约, 但是 $(x')^2 + (y')^2 + (z')^2$ 不可约, 而 $(x')^2 + (y')^2 = (x' + iy')(x' - iy')$ 和 $(x')^2$ 可约, 因此非零圆锥曲线非退化当且仅当二次型矩阵 Q 满秩, 也即 $\det(Q) \neq 0$. 更进一步, $\text{rank}(Q) = 2$, 即只有一个 0 特征值时 $(x')^2 + (y')^2$ 分裂不分歧, 因此 c 退化为相交直线. $\text{rank}(Q) = 1$, 即有两个 0 特征值时 $(x')^2$ 只分歧不分裂, 因此 c 退化为**重合直线 (double line)**.

任意两个圆锥曲线 c_1, c_2 的交点确定一族经过的圆锥曲线

$$c = \lambda c_1 + \mu c_2, \quad [\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k),$$

称为过这些点的**圆锥曲线束 (pencil of conics)**, 一族圆锥曲线束形如

$$c(x, y, z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda a_1 + \mu a_2 & \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda d_1 + \mu d_2 \\ \lambda b_1 + \mu b_2 & \lambda c_1 + \mu c_2 & \lambda e_1 + \mu e_2 \\ \lambda d_1 + \mu d_2 & \lambda e_1 + \mu e_2 & \lambda f_1 + \mu f_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

如果 c_1 非退化, 则若 c 退化, 有 $\det(Q(\lambda, \mu)) = 0$, 这是关于 $[\lambda, \mu]$ 的三次方程, 至多有三个解. 如果这三个解有重根, 则该重根 $[\lambda_0, \mu_0]$ 使得 $Q(\lambda_0, \mu_0)$ 有两个 0 特征值, 因此退化为重合直线. 如果出现 3 重根, 则表明相应的 $Q(\lambda_0, \mu_0) = 0$, 即 $\lambda_0 c_1 + \mu_0 c_2 = 0$, 也即 c_1 和 c_2 代表同一个圆锥曲线.

现在考察代数闭域 k 上的一维射影圆锥曲线

$$q(u, v) = a_0 u^2 + a_1 uv + a_2 v^2$$

和三次曲线

$$c(u, v) = b_0 u^3 + b_1 u^2 v + b_2 uv^2 + b_3 v^3.$$

如果 q 与 c 相交, 则存在非零的公共零点. 注意到全体 4 次齐次多项式

$$Au^4 + Bu^3v + Cu^2v^2 + Duv^3 + Ev^4$$

的系数构成仿射空间 $\mathbb{A}^5(k)$, 既然 q 与 c 有公共零点, 则 u^2q, uvq, v^2q, uc, vc 有公共零点, 也即

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & & \\ & a_0 & a_1 & a_2 & \\ & & a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & \\ & b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u^4 \\ u^3v \\ u^2v^2 \\ uv^3 \\ v^4 \end{bmatrix} = 0$$

有非零解, 于是行列式为 0. 反之如果上述矩阵的行列式为 0, 则矩阵行线性相关, 特别地 u^2q, uvq, v^2q, uc, vc 线性相关, 即存在不全为 0 的二次齐次式 $f(u, v)$ 和一次齐次式 $g(u, v)$ 使得 $qf + cg = 0$, 特别地 $q \mid cg$. 如果 q 与 c 互素, 则 $q \mid g$, 但 g 是一次式, 必须 $g = 0$, 于是 $qf = 0$ 导致 $f = g = 0$ 矛盾. 因此 q 与 c 有公因子, 当然有非零公共零点.

设 $f(x, y, z)$ 为一般平面射影三次曲线, 一般形式为

$$f(x, y, z) = z^2 A(x, y) + z B(x, y) + C(x, y),$$

其中 A, B, C 为 1, 2, 3 次齐次式. 如果

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0$$

有解, 则相应的解 $[x, y, z] \in \mathbb{P}^2(k)$ 称为 f 的**奇异点 (singular point)**.

现在我们对不可约奇异三次曲线作分类, 通过射影变换不妨设奇异点为 $[0, 0, 1]$, 则在一般形式中设 $A(x, y) = ax + by$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, 1) = 1^2 a + 1 \frac{\partial B}{\partial x}(0, 0) + \frac{\partial C}{\partial x}(0, 0) = 0.$$

由于 B, C 为二次或三次, 求导后不为常数, 代入 $(0, 0)$ 后必然为 0, 故 $a = 0$, 同理可得 $b = 0$, 即 $A(x, y) = 0$.

注意到 $B(x, y)$ 是二次型, 如果退化, 则可通过射影变换变为 $B(x, y) = xy$, 注意这不改变 $[0, 0, 1]$ 是奇点, 因为 $(0, 0)$ 的线性变换仍然是 $(0, 0)$. 于是有形式

$$f(x, y, z) = xyz + (ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3) = (xy)(z + bx + cy) + ax^3 + dy^3.$$

由于 f 不可约, a, d 均不为 0, 因此作变换 $x' = a^{\frac{1}{3}}x$, $y' = b^{\frac{1}{3}}x$ 和 $z' = -(z + bx + cy)$ 可得

$$f(x', y', z') = (x')^3 + (y')^3 - x'y'z',$$

称为**结点三次曲线 (nodal cubic)**. 如果非退化, 同样可设 $B(x, y) = x^2$, 则有

$$f(x, y, z) = x^2z + (ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3).$$

由于 f 不可约, $d \neq 0$, 先将 $-d^{\frac{1}{3}}y$ 换为新的 y , 整理并配方为

$$x^2z + (ax^3 + bx^2y + cxy^2) - y^3 = x^2 \left(z + \left(a - \frac{c^3}{27} \right) x + \left(b + \frac{c^2}{3} \right) y \right) - \left(y - \frac{c}{3}x \right)^3.$$

作变换

$$x' = x, \quad y' = y - \frac{c}{3}x, \quad z' = z + \left(a - \frac{c^3}{27} \right) x + \left(b + \frac{c^2}{3} \right) y$$

可得

$$f(x', y', z') = (x')^2z' - (y')^3,$$

称为**尖点三次曲线 (cuspidal cubic)**.

Chapter 4

28th Sept. Lecture 4 一般椭圆曲线

代数曲线的**有理参数化** (rational parametrization) 是指对一个 $\mathbb{P}^n(k)$ 上的不可约代数曲线 f , 存在有理映射

$$\begin{aligned}\Phi: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^n(k), \\ [u, v] &\mapsto [q_1([u, v]), q_2([u, v]), \dots, q_n([u, v])],\end{aligned}$$

使得 q_i 均为有理函数, 且像集 $\text{im}(\Phi)$ 在 f 上, 即

$$f(q_1([u, v]), q_2([u, v]), \dots, q_n([u, v])) \equiv 0.$$

尖点三次曲线 $f(x, y, z) = x^2z - y^3$ 有参数化

$$\begin{aligned}\Phi: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [v^3, uv^2, u^3].\end{aligned}$$

我们证明 Φ 是双射, 先证明 Φ 是满射. 对任意 f 上的点 $[x, y, z]$ 有 $x^2z = y^3$, 如果 $x = 0$, 则必有 $y = 0$, 从而这点只能是 $[0, 0, 1]$, 有原像 $[u, v] = [1, 0]$. 如果 $x \neq 0$, 则必有 $z = \frac{y^3}{x^2}$, 只要取 $u = y$ 和 $v = x$ 就有

$$\Phi([u, v]) = [x^3, x^2y, y^3] = \left[x, y, \frac{y^3}{x^2} \right] = [x, y, z].$$

再证 Φ 是单射. 在 f 的 $z \neq 0$ 的点如果有两个原像 $[u_1, v_1]$ 和 $[u_2, v_2]$, 则 $u_1u_2 \neq 0$, 否则 $z = 0$. 因此可以取 $z = 1$ 的代表元

$$[v_1^3, u_1v_1^2, u_1^3] = [v_2^3, u_2v_2^2, u_2^3] \implies \frac{v_1^3}{u_1^3} = \frac{v_2^3}{u_2^3}, \quad \frac{v_1^2}{u_1^2} = \frac{v_2^2}{u_2^2},$$

当然有 $u_1 : v_1 = u_2 : v_2$, 即 $[u_1, v_1] = [u_2, v_2]$. 在 $z = 0$ 的点必有原像 $u = 0$, 因此 $[u, v] = [0, 1]$ 唯一.

为了找到结点三次曲线 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 - xyz$ 的参数化, 考虑从结点 (奇点) $[0, 0, 1]$ 出发作斜率参数为 $[a, b]$ 的射影直线

$$\begin{aligned} \alpha : \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [au, bu, v]. \end{aligned}$$

则由于在 $[0, 0, 1]$ 处于 f 相交两次, 与 f 交于第三个点

$$(a^3 + b^3)u = abv \implies [u, v] = [ab, a^3 + b^3] \implies \alpha([u, v]) = [a^2b, ab^2, a^3 + b^3].$$

即对每个斜率参数 $[a, b]$ 都给出了 f 上的一个点 $[a^2b, ab^2, a^3 + b^3]$, 这就给出了参数化

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [u^2v, uv^2, u^3 + v^3]. \end{aligned}$$

另一个想法是先考虑自然的投射

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{P}^2(k) \setminus \{[0, 0, 1]\} &\rightarrow \mathbb{P}^1(k), \\ [x, y, z] &\mapsto [x, y], \end{aligned}$$

注意 $[0, 0, 1]$ 不能投影到 $[0, 0] \notin \mathbb{P}^1(k)$. 我们把 π 限制在 $f \setminus \{[0, 0, 1]\}$, 其逆如果把一点 $[x, y]$ 映到 f 上, z 必然满足 $x^3 + y^3 = xyz$, 即

$$\pi^{-1} : [x, y] \mapsto \left[x, y, \frac{x^3 + y^3}{xy} \right].$$

现在我们把 π^{-1} 延拓到 $\mathbb{P}^1(k)$ 上, 当然同样给出了上述的 Φ .

我们证明 Φ 在奇点 $[0, 0, 1]$ 以外是双射, 先证明 Φ 总是满射. 显然 $[0, 0, 1]$ 有原像 $[0, 1]$, 而 x, y 不都为 0 时, 不妨设 $x \neq 0$, 则若 $y = 0$ 导致 $x^3 = 0$, 矛盾, 因此 x, y 均不为 0, 从而 $[x, y, z] \in f$ 必须有

$$x^3 + y^3 = xyz \implies z = \frac{x^3 + y^3}{xy}.$$

于是取 $u = x$ 和 $v = y$ 就有

$$\Phi([u, v]) = [x^2y, xy^2, x^3 + y^3] = \left[x, y, \frac{x^3 + y^3}{xy} \right] = [x, y, z].$$

再证 Φ 在 $[0, 0, 1]$ 以外是单射. 不妨设在 $[x, y, z] (x \neq 0)$ 处有两个原像 $[u_1, v_1]$ 和 $[u_2, v_2]$, 则可以把第一个分量化为 1, 即

$$[u_1^2v_1, u_1v_1^2, u_1^3 + v_1^3] = [u_2^2v_2, u_2v_2^2, u_2^3 + v_2^3] \implies \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2},$$

立即得到 $[u_1, v_1] = [u_2, v_2]$. 特别地, 在 $[0, 0, 1]$ 处确实有两个原像 $[u, v] = [0, 1], [1, 0]$.

以上说明奇异三次曲线均可作有理参数化, 但一般三次曲线不能被有理参数化. 我们考虑椭圆曲线的仿射标准形式, 如果其不可被参数化, 则射影情形也不可被参数化, 进而一般三次曲线也不可被参数化.

Theorem. 设 k 是代数闭域, 则其上的仿射椭圆曲线

$$f(x, y) = y^2 - x(x-1)(x-\lambda), \quad \lambda \neq 0, 1$$

不可被有理参数化.

Proof. 假设不然, 则存在多项式 $p, q, r, s \in k[t]$ 使得 $\gcd(p, q) = \gcd(r, s) = 1$, 使得

$$\frac{r^2}{s^2} = \frac{p}{q} \left(\frac{p}{q} - 1 \right) \left(\frac{p}{q} - \lambda \right)$$

对一切 $t \in k$ 恒成立. 整理为

$$r^2 q^3 = s^2 p(p-q)(p-\lambda q),$$

则根据互素可知 $q^3 \mid s^2$ 和 $s^2 \mid q^3$, 于是不妨设 $a \in k$ 使得 $s^2 = aq^3$. 由于 k 是代数闭域, $q^3 = (\sqrt{a}s)^2$ 导致 q 是完全平方多项式. 现在

$$r^2 = ap(p-q)(p-\lambda q),$$

而 $p, p-q, p-\lambda q$ 两两互素, 根据 $k[t]$ 是唯一分解整环, 作不可约分解可知 $p, p-q, p-\lambda q$ 均为完全平方多项式. 如果此时我们能证明 p, q 均为常数, 则就能导出矛盾. 这归结于下面的引理, 证明方法是经典的 Fermat 无穷下降法. $\square$

Lemma. 设 k 为代数闭域, $p, q \in k[t]$ 是互素多项式. 如果存在 4 个不同的 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$, 使得 $\lambda p + \mu q$ 是完全平方多项式, 则 p, q 均为 k 中常数.

Proof. 注意到分式线性变换

$$\mu(p, q) = (ap + bq, cp + dq), \quad ad - bc \neq 0$$

是 $\mathbb{P}^2(k)$ 上的全纯自同构, 因此存在 4 个不同的 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$ 满足条件当且仅当经过分式线性变换后仍然存在 4 个不同的 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$ 满足条件 (只改变 p, q 的系数而不改变本身), 且 p, q 为常数当且仅当分式线性变换后为常数, 因此可以取一个适当的分式线性变换, 使得 $p, q, p-q, p-\lambda q$ 为完全平方多项式.

现在设 $u, v \in k[t]$ 互素使得 $p = u^2$ 和 $q = v^2$, 则若 p, q 不全为常数, 都有

$$\max\{\deg u, \deg v\} < \max\{\deg p, \deg q\},$$

但是由于 k 是代数闭域

$$p - q = (u - v)(u + v), \quad p - \lambda q = (u - \sqrt{\lambda}v)(u + \sqrt{\lambda}v)$$

也是完全平方多项式, 而 $u - v, u + v, u - \sqrt{\lambda}v, u + \sqrt{\lambda}v$ 两两互素, 根据唯一分解整环可知这 4 个也都是完全平方多项式, 但次数严格小于 $p, q, p - q, p - \lambda q$, 由此无穷下降直到 u, v 为常数, 但这说明原始的 p, q 为常数, 矛盾. $\square$

现在我们将相应的射影曲线

$$y^2z = x(x - z)(x - \lambda z), \quad \lambda \neq 0, 1$$

视作 $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ 中的曲面, 则

$$y = \sqrt{x(x - 1)(x - \lambda)}$$

是其中一支, 相应的图像是 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 去除分支点 $0, 1, \lambda, \infty$ 连线. 将两支粘合就得到复射影曲线的图像, 即一个环面, 这可以视作 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的二重覆盖.

另一个看法是 f 上的全纯 1-形式

$$\omega = \frac{dx}{y}$$

可以通过有理参数化拉回到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上, 但实际上其上不存在全纯 1-形式.