



—

一个公司在六个城市 c_1, c_2, \dots, c_6 有分公司，下面的矩阵 (i, j) 号元素是 c_i 到 c_j 的机票价格，试为该公司制作一张 c_1 到每个城市的路线图，使得每个城市的机票价格都最便宜。


$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{pmatrix}$$

提要：

考最短路径算法，*Dijkstra* 算法

转化为图模型:

在下图中求 c_1 到其他顶点的最短路径





以 c_1 为起点 在图二上跑 *Dijkstra* 算法。

迭代次数i	$l(v_2)$	$l(v_3)$	$l(v_4)$	$l(v_5)$	$l(v_6)$	S
0	50	∞	40	25	10	v_1
1	50	∞	50	25	10	v_1, v_6
2	35	45	35	25	10	v_1, v_5, v_6
3	35	45	35	25	10	v_1, v_2, v_5, v_6
4	35	45	35	25	10	v_1, v_2, v_4, v_5, v_6
5	35	45	35	25	10	$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$

路径的答案不止一种：

- $v_2: v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_2$
- v_3 :
 - $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_3$
 - $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3$
 - $v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_4 \rightarrow v_3$
- v_4 :
 - $v_1 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$
 - $v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_4$
- $v_5: v_1 \rightarrow v_5$
- $v_6: v_1 \rightarrow v_6$



二

1. 给定 $0.05, 0.05, 0.1, 0.1, 0.15, 0.15, 0.2, 0.2$, 请求出 *Huffman* 树
2. 举例说明存在权值分布, 使得 *Huffman* 树不唯一

提要:

考 *Huffman* 算法, 构造 *Huffman* 树

例子权值分布:1,1,2,2




图: 1.




图: 2.1




图: 2.2



三

1. 证明: 若 G 是 k 边连通图, E' 是 G 中 k 条边集合, 则有 $w(G - E') \leq 2$
2. 给出一个 k 连通图, 及 G 中 k 个顶点集合 V' , 使得 $w(G - V') > 2$


提要:

考顶连通和边连通。

1. 证明

反证法: 假设 $w(G - E') \geq 3$ 则 $G - E'$ 至少存在三个连通片 G_1, G_2, G_3 。由于 G 是 k 边连通的。所以子图 G_1 与 $G - G_1$ 之间至少有 k 条边。又因为 $|E'| = k$, 所以 E' 中的边必与 G_1 相邻, 才能使 G_1 是一个联通片。所以除 G_1 外其它连通片之间无边, 且 G_1 与其他联通片之间均有边。同理分析 G_2 , 除 G_2 外其它连通片之间无边, G_2 与其他联通片之间均有边。矛盾。

2. 示例





四

1. 偶圈可以 2-边正常着色。
2. 对于不是奇圈的欧拉图，存在 2-边着色方案，使得两种颜色，在所有顶点出都出现

提要：

考边着色

- ▶ k -边着色, 正常 k -边着色, 边色数, 最佳 k -边着色
- ▶ 定理 7.3: 若 G 是二分图, 则 $\chi'(G) = \Delta(G)$
- ▶ 定理 7.4: (vizing) 若 G 是简单图, 则 $\chi'(G) = \Delta(G)$ 或 $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$



1. 证明

设偶圈 C 有 $2n$ 条边，将偶圈上的边按顺时针从 $1 \sim 2n$ 编号。奇序号和偶序号的边各着一种颜色。由编号规则知，无相邻边同奇偶，即无相邻边同色。所以偶圈可以 2-边正常着色。

2. 证明

G 是欧拉图，则 G 可以表示成若干个无公共边的圈之并。

(1) 若 G 没有度数大于等于 4 的点，则 G 是一个圈，且是偶圈。由第一问的着色方法，可以证明。

(2) 若 G 有度数大于等于 4 的点 v_i 。则从该顶点开始，选择一个该顶点所在的圈 C_i ，使用两种颜色，交替边着色。若 C_i 是偶圈，则 C_i 上的顶点已满足条件。若 C_i 是奇圈，则 C_i 中只有 v_i 目前只有一种颜色。

(3) 对剩余的圈，从圈上一个度数大于 4 的顶点开始交替着色。若该顶点未被着色，起始色任选；若该顶点已满足条件，起始色任选；若该顶点临边只有一种颜色，则其实色使用另一种颜色。



五

若 G 是连通平面图, 没有奇圈, 且顶点数大于等于 3, 证明:
 $\epsilon \leq 2v - 4$

提要:

考平面图性质

- ▶ 定理 4.3: 任给平面图 G , $\sum_{f \in F(G)} \deg(f) = 2|E(G)|$
- ▶ 定理 4.4: 设 G 是连通平面图, $v - \epsilon + \phi = 2$
- ▶ 推论 4.2: 若 G 是 $v \geq 3$ 的连通简单平面图, 则 $\epsilon \leq 3v - 6$
- ▶ 推论 4.3: 若 G 是连通简单平面图, 则 $\delta \leq 5$
- ▶ 推论: $K_{3,3}, K_5$ 是非平面图



证明:(类比书上定理)

G 是平面图, 所以 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2\epsilon$, $v - \epsilon + \varphi = 2$


G 没有奇圈, 所以 $\forall f \in F, \deg(f) \geq 4$

所以 $2\epsilon \geq 4\varphi$, $\varphi = 2 + \epsilon - v$

得 $\epsilon \leq 2v - 4$

六

1. 求下网络的最大流；
2. 假定每条有向边的容量都大于 0，证明：网络中存在从源 s 到汇 t 的有向轨道，等价于最大流量大于 0



提要：

考网络流算法，2F 算法。



- ▶ 无向轨道 $P(s, t)$, 正向边, 反向边
- ▶ e 的可增载量


$$l(e) = \begin{cases} c(e) - f(e) & e \text{ 是正向边} \\ f(e) & e \text{ 是反向边} \end{cases}$$

- ▶ P 的可增载量


$$l(P) = \min_{e \in E(P)} l(e)$$

- ▶ 可增载轨道


1. 2F算法:



计算出一条可增载轨道 $P_0(S, T) = Sv_3v_4T$, 且 $l(P_0) = 3$



计算出一条可增载轨道 $P_1(S, T) = Sv_1v_3v_4v_2T$, 且 $l(P_1) = 2$



此时无可增载轨道。得 $Var(f^*) = Var(f_2) = 6$



2. 证明

网络中存在从源 s 到汇 t 的有向轨道 \implies 最大流量大于 0:

网络中存在从源 s 到汇 t 的有向轨道 $P(s, t)$, 设轨道上的边的容量的最小值为 b , 则 $b > 0$ 。

设 f_0 表示每条边载量为 0 的流函数, $Var(f_0) = 0, l(P) \geq b$, 所以将 $P(s, t)$ 上每条边增载 b 之后得流函数 f_1 , 有 $Var(f^*) \geq Var(f_1) = b > 0$ 。即最大流量大于 0。

最大流量大于 0 \implies 网络中存在从源 s 到汇 t 的有向轨道:


使用反证法: 假设网络中不存在存在从源 s 到汇 t 的有向轨道。

设 f_0 表示每条边载量为 0 的流函数, 对于任意一条无向轨道 $P(s, t)$, 存在反向边 e_0 , 且 $f_0(e_0) = 0$, 所以

$l(P) \leq l(e_0) = f(e_0) = 0$ 。所以无可增载轨道。所以 $Var(f^*) = Var(f_0) = 0$, 这与最大流量大于零矛盾。

七

1. 给出下图的邻接矩阵, 并通过邻接矩阵求出可达矩阵, 由此给出该图的强连通片
2. 假设有向图 D 是单向连通图。证明: 任给 $S \subseteq V(D)$, $S \neq \emptyset$ 都存在顶点 $v \in S$, 使得 v 可达 S 中的任意一个顶点.



提要:

考邻接矩阵的表示, 可达性算法, 可达性矩阵含义

1. 邻接矩阵:
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Warshall 算法计算可达性矩阵: $\nu = 4$

$$R^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 计算 } R^1 \text{ 得, } R^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 计算 } R^2 \text{ 得 } R^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 再计算 } R^3 \text{ 得}$$

$$R^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 再计算 } R^4 \text{ 得 } R^4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{即可达性矩阵为 } R(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

强连通片为 v_2, v_3, v_4 的顶点导出子图。



2. 证明

由于有向图 D 是单向连通图, 所以可达性矩阵满足 $r_{ij} \vee r_{ji} = 1$ 。
不妨设 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ 。下面只考虑可达性矩阵的前 s 行的前 s 列即可, 记为 A 。

证明存在顶点 $v \in S$, 使得 v 可达 S 中的任意一个顶点。即证, A 中存在一行, 除对角线位置外全为 1。

考虑第 i 行, 若除对角线位置外全为 1, 得证。否则不妨设 $a_{ij} = 0$, 则 v_i 可达的顶点, 均不可达 v_j , 即若 $a_{ix} = 1$ 则 $a_{xj} = 0$, 则 $a_{jx} = 1$ 。 $\because a_{ij} = 0, \therefore a_{ji} = 1$ 。至此得到第 j 行的 1 至少比第 i 行多一个。若第 j 行不是除对角线位置外全为 1, 则可重复上述分析, 找到比第 j 行还多的行, 依次类推, $s-1$ 步之内可得必有一行除对角线位置外全为 1, 得证。



八

若 M 与 M' 都是图 G 的完备匹配, 则边导出子图 $G[M \oplus M']$ 的每个连通片都是 M 与 M' 交替出现的偶圈.

提要:

考匹配, 完备匹配的含义



证明

考虑 G 的子图 $G' = M \cup M'$ 。在 G' 中对边着色, 属于 M 中的边着红色, M' 中的边着蓝色, 去掉染了两种颜色的边, 再去掉度数为 0 的点, 得到的图即是 $G[M \oplus M']$ 。

在 M 中每个点的度数均为 1, 即每个点只有一条邻边。在 M' 中同样。所以在 G' 中每个点的邻边最多为 2, 即 G' 中顶点度数最大为 2。

不妨设 $\deg_{G'}(u) = 1$, u 关联的边为 $e = uv$ 。则

$e \in M$ $e \in M'$, $\therefore \deg_{G'}(v) = 1$, e 被着两种颜色, 所以 u, v, e 被从 G' 中去掉。由 u 的任意性。所以 $G[M \oplus M']$ 中点的度数均为 2, 所以 $G[M \oplus M']$ 的每个连通片均是圈。

由于 $G[M \oplus M']$ 中每个顶点的两个邻边分别来自 M, M' , 所以被染了两种不同颜色。所以 $G[M \oplus M']$ 可以 2-边正常着色, 所以 $G[M \oplus M']$ 不含奇圈, 所以 $G[M \oplus M']$ 的每个连通片均是偶圈。又由染色结果可知, $G[M \oplus M']$ 的每个连通片都是 M 与 M' 交替出现的偶圈。



- ▶ 1.Dijkstra , 第一章
- ▶ 2.Haffman , 第二章
- ▶ 3. 连通性, 第三章
- ▶ 4. 边着色, 第七章
- ▶ 5. 平面图, 第四章
- ▶ 6. 网络流, 第九章
- ▶ 7. 可达矩阵, 第十章
- ▶ 8. 匹配, 第五章

1. 给了一个带权有向图，求最大流并找一个最小截；把有向边改成无向边，再求一棵最小生成树。

提要：

考最大流算法。最大流最小截相等。求最小生成树

► *Kruskal* 算法, *Prime* 算法




图 2.10: G



二

1. 已知一个图有 1 个 8 次顶、6 个 6 次顶、8 个 4 次顶，证明它不是平面图。2. 证明 $n \geq 5$ 时，圈 C_n 的补图是 Hamilton 图。

提要：

考平面图的性质，Hamilton 图的判定。

- ▶ 定理 6.5:(Dirac) 设 G 是简单图, 且 $\nu(G) \geq 3$, $\delta(G) \geq \nu(G)/2$, 则 G 是 Hamilton 图。
- ▶ 引理 6.1: 设 $G = (V, E)$ 是简单图, u, v 是 G 的两个不相邻的顶点且 $\deg(u) + \deg(v) \geq \nu(G)$, 则 G 是 Hamilton 图, 当且仅当 $G + uv$ 是 Hamilton 图
- ▶ 定理 6.6: 简单图 G 是 Hamilton 图, 当且仅当他的闭包 $c(G)$ 是 Hamilton 图。
- ▶ 定理 6.7: 设 $\nu(G) \geq 3$, 对 G 的任意一对顶点, 若 $\deg(u) + \deg(v) \geq \nu(G)$, 则 G 是 Hamilton 图,



三

1. 设树的 $2, 3, \dots, k$ 次顶的个数为 n_2, n_3, \dots, n_k , 求一次顶的个数。
2. n 个顶的树的最大度数 Δ 最小是多少? 最大是多少? 并求出最小和最大时对应什么树。
3. 证明树的最长轨的端点为叶。

提要:

考树的性质



四

已知有 8 种药品要用容器运输，给出它们的互斥关系（互斥的药品不能放在同一个容器内），问最少用几个容器？建立图论模型并使用图论知识解决问题。

提要：

点着色模型



五

1. 二分图 G 满足 $|X| = |Y| = n$, 且最小度数 $n/2$, 证明 G 有完备匹配。
2. 证明: G 中任意一条边都包含于 G 的一个完备匹配, 当且仅当对 X 的任一非空真子集 S , $|N(S)| \geq |S| + 1$ 。

提要:

考二分图的完备匹配, Hall 定理



1 证明

任取 $S \subseteq X$ 若 $|S| \leq n/2$ $|N(S)| \geq n/2 \geq |S|$, 若 $|S| > n/2$, 则 Y 中的点均与 S 相邻, 否则该点的度数小于 δ 。即 $|N(S)| = n \geq |S|$ 。由 Hall 定理, 得 G 有完备匹配。



2. 证明

“ \Leftarrow ”

任取 $e = uv \in G$ $G' = G - \{u, v\}$ 。只需证 G' 有完备匹配即可。
在 G' 中任取 $S \subset X'$, $N'(S)$ 表示 G' 中 S 的邻顶集合,
 $|N'(S)| \geq |N(S)| - 1 \geq |S|$, Hall 定理得 G' 有完备匹配。即 G 中任意一条边都包含于 G 的一个完备匹配。

“ \Rightarrow ”

G 中任意一条边都包含于 G 的一个完备匹配。即任取
 $e = uv \in G$ $G' = G - \{u, v\}$, G' 也有完备匹配。因为 G 有完备匹配, 在 G 中任取 $S \subset X$, $|N(S)| \geq |S|$, 在图中去掉 $\{u, v\}$ 后, S 变为 S' , $N(S)$ 变为 $N'(S')$, 有四种变化可能,
 $|S| = |S'|$, $|N(S)| = |N'(S')|$; 或 $|S'| = |S|$, $|N'(S')| = |N(S)| - 1$; 或
 $|S'| = |S| - 1$, $|N'(S')| = |N(S)|$; 或
 $|S'| = |S| - 1$, $|N'(S')| = |N(S)| - 1$ 。因为 G' 有完备匹配, 应有
 $|N'(S')| \geq |S'|$, 对上述四种情况均满足, 所以 $|N(S)| \geq |S| + 1$ 。