Toán tử trong Python — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: nhập điểm hoặc tính tiền bị sai vì nhầm phép gán, so sánh và thứ tự tính. `=` gán giá trị; `==` kiểm tra bằng nhau; `/` chia thực, `//` lấy thương làm tròn xuống và `%` lấy phần dư. Với số âm, không coi `//` là cắt phần thập phân về 0.

```
assert 7 / 2 == 3.5
assert 7 // 2 == 3
assert -7 // 2 == -4
assert 7 % 2 == 1
score = 7
assert 0 <= score <= 10
assert (2 + 3) * 4 == 20
```

Tự luyện: tính số hộp đủ 6 sản phẩm và số sản phẩm dư cho 20 sản phẩm. **Hướng giải:** `20 // 6` bằng 3 hộp, `20 % 6` bằng 2 sản phẩm. Đổi mẫu chia sang 0 phải phát hiện dữ liệu không hợp lệ trước phép chia. Khi so số thực đo đạc, cân nhắc sai số thay vì dùng đẳng thức tuyệt đối tùy tiện.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/tutorial/