

REFERTO n. 431599

**CITTASSISS DUECENTOSESANTATRE**

MARMELLATA n. 263

23900 LECCO LC

Data Nascita: 01/01/1963

**VISITA CARDIOLOGICA (PRIMA VISITA) CON INCLUSO ECG**

6 febbraio 2026

**Quesito diagnostico:** Testo quesito diagnostico

**Storia Clinica**

**Anamnesi Patologica e Fisiologica**

Dal 14/10/2019 ipertensione arteriosa. Stato di cronicità: Cronico. Stato clinico: Attivo.

**Anamnesi Familiare**

Padre naturale deceduto alla età di 73 anni: alla età di 73 anni Leucemia non specificata..

**Allergie**

Agente non noto. bruciori di stomaco

**Terapia farmacologica in atto**

PROCORALAN 5 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM USO ORALE BLISTER ALL/PVC 56 COMPRESSE

**Precedenti esami eseguiti**

10/03/2025 00:00 ELETTROCARDIOGRAMMA. Esito: VSx ipertrofico, non dilatato, normocinetico, con gradiente dinamico all'efflusso

16/04/2025 00:00 VISITA CARDIOLOGICA (CONTROLLO). Esito: introdotta terapia con Ivabradina 5 mg x 2

**Esame Obiettivo:** Toni cardiaci validi, ritmici, pause libere. Compenso emodinamico

**Confronto con Precedenti esami eseguiti**

testo confronto con esami precedenti

**Referto**

**Cardiopatía ipertensiva con gradiente all'efflusso e insufficienza valvolare mitralica da SAM. Paziente asintomatico in ambito cardiologico. Dal punto di vista strumentale (vedi ecocardiogrammi allegati) scarsa risposta a terapia con Ivabradina. Consiglio di sospendere Procoralan e introdurre terapia con Metoprololo 100 mg 1/2 cp al mattino e 1/2 cp alla sera, monitorando a domicilio i valori di pressione arteriosa e frequenza cardiaca: la terapia andrà modulata allo scopo di ottenere valori di FC << 70 bpm (idealmente intorno a 60 bpm) e valori pressori entro 130/80 mmHg (eventuale revisione della terapia antipertensiva).**

**Diagnosi**

Cardiopatía ipertensiva maligna senza insufficienza cardiaca

**Conclusioni**

Necessario netto calo ponderale

**Suggerimenti per il medico prescrittore**

Testo suggerimenti per il medico prescrittore

**Accertamenti e controlli consigliati**

ECOCARDIOGRAFIA COLOR DOPPLER A RIPOSO

**Terapia farmacologica consigliata**

IVABRADINA TEVA ITALIA 7,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM- 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA-AL-PE/AL-PE

**dott. SDSINFOUNO VOTP**

Medico Chirurgo

Direttore Sanitario: Dott.

**Info Recapiti Struttura**