Servizio Riabilitazione AISM FSE

# Cartella foniatrica controllo

AISM_F015

**COGNOME**: TESTPZC **NOME**: TESTPZ

**INDIRIZZO:** VIA DI TEST 100/1 123

**CAP**: 16000 **CITTA'**: GENOVA

**DATA DI NASCITA**: 23/06/1954 **LUOGO DI NASCITA**: GENOVA **SESSO**: M

**CODICE FISCALE**: AAAAAA00A00A999A **ASL**: ASL 3 GENOVESE

**Diagnosi principale:** 340 - 046 - Sclerosi multipla

Aggiornamento anamnestico: * **accreditamento FSE**

Terapia in atto e modalità di somministrazione: * **accreditamento FSE**

Valutazione morfologico e funzionale delle strutture oro-faringo-laringee : * **accreditamento FSE**

**PRESCRIZIONI:**

Modalità di alimentazione consigliata: * **accreditamento FSE**

PROGETTO RIABILITATIVO:* **DOM**

PROBLEMI IDENTIFICATI:* **accreditamento FSE**

OBIETTIVI:* **accreditamento FSE**

Esempi di: DOPPIE CONSISTENZE (es. Minestrina in brodo, frutta molto matura, zuppe di pane o fette biscottate…), CIBI SECCHI (es. pan biscotto), STOPPOSI (es. petto di pollo ai ferri, allo spiedo), FIBROSI (es. verdure filacciose, prosciutto crudo, bresaola…), FRUTTA SECCA, LEGUMI, RISO AL DENTE, ALCOLICI

***Si raccomanda di:***

- mangiare in posizione seduta, con avambracci comodamente appoggiati e, salvo diversa indicazione con capo in asse;
- durante l'alimentazione lo stato di attenzione del paziente deve essere adeguato; interrompere l'alimentazione ai primi segni di stanchezza;
- procedere lentamente, con piccole quantità alla volta e solo se il boccone precedente è stato deglutito;
- non far parlare il paziente durante il pasto, se non dopo aver fatto detergere la gola con qualche colpo di tosse e aver fatto deglutire a vuoto;
- ogni 2-3 deglutizioni eseguire qualche colpo di tosse e deglutire a vuoto;
- se il paziente può assumere liquidi prima di farlo bere accertarsi che in bocca non siano presenti residui di cibo e far eliminare i residui in faringe secondo la modalità sopra descritta;
- non far distrarre il paziente durante il pasto (per esempio evitare di far guardare la televisione, leggere ecc);
- per almeno quindici minuti dopo il pasto, il paziente deve rimanere seduto ed in seguito è indispensabile provvedere all'igiene orale, per prevenire tra l'altro l'aspirazione di particelle di cibo che possono rimanere in bocca.

** Gli esempi sono stati integrati dal Gruppo di Lavoro del PDTA Disfagia Piemonte Simonelli M. et al. Gruppo Italiano di Studio Della Disfagia GISD. Proposta della Commissione Nazionale GISD sulla Terminologia per le consistenze.*

**Confermo che il PRI è stato con me condiviso, compreso e accettato**

Firma paziente o suo delegato

Data: 03/02/2026

Firma Medico