

AI개론

numpy
matplotlib

강사 : 김 남 범 교수

▶ 수업 목차

- numpy
 - 1) 행렬의 구조
 - 2) numpy 행렬 인덱스
 - 3) 행렬 연산
- matplotlib
 - 1) matplotlib 구조

▶ 1. 행렬의 구조





$$\mathbf{A} = [a_{ij}] \quad \text{or} \quad [a_{ij}]_{m \times n} \quad \text{or} \quad (a_{ij})_{m \times n} \quad \text{or} \quad (A)_{ij}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

← 제 1 행
← 제 2 행
← 제 m 행

↑ 제 1 열
↑ 제 n 열

▶ 2. numpy 행렬 인덱스

	Expression	Shape
	<code>arr[:2, 1:]</code>	<code>(2, 2)</code>
	<code>arr[2]</code> <code>arr[2, :]</code> <code>arr[2:, :]</code>	<code>(3,)</code> <code>(3,)</code> <code>(1, 3)</code>
	<code>arr[:, :2]</code>	<code>(3, 2)</code>
	<code>arr[1, :2]</code> <code>arr[1:2, :2]</code>	<code>(2,)</code> <code>(1, 2)</code>

▶ 3. 행렬의 덧셈, 뺄셈

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix}$$

▶ 4. 행렬의 곱셈

Matrix Multiplication

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{bmatrix}$$

"Dot Product"

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & \end{bmatrix}$$

▶ 5. 행렬의 전치

Transposing a 2x3 matrix to create a 3x2 matrix

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 24 \\ 1 & -9 & 8 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 4 & -9 \\ 24 & 8 \end{bmatrix}$$

▶ 6. 행렬 연산

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$A \qquad x \qquad b$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

▶ 1. matplotlib 구조

