

BME REHABILITATION SESSION REPORT

Bệnh nhân: Benh_Nhan | Phiên số: 1 | Ngày: 2026-06-26

>> TỔNG QUAN PHIÊN TẬP

Thời gian phiên 0:14 phút:giây	Tay yếu đóng góp 0.0% bilateral ratio	Lực bóp đỉnh 0.000 kg (tay yếu)	Chỉ số mỏi cơ 86.0% hiệu suất cuối/đầu Ổn
--	---	---	--

1 & 2 Biên độ vận động (aROM)

3 Độ run (Tremor Index)


ROM Pitch (Gập/Ngửa) 57.4° [-24.5° → 32.9°]	ROM Roll (Nghiêng) 60.0° [-34.7° → 25.3°]	Tremor Pitch 10.64 std (°) Thấp — tốt	Tremor Roll 6.73 std (°) Thấp — tốt
---	---	--	--

4 & 5 Lực bóp yếu nhất: 0.000 kg


6 & 7 Bilateral + Fatigue: 86.0%

ĐỒ THỊ KINEMATIC — Pitch / Roll / Grip / Joystick

1 · Góc Pitch — Gập/Ngửa cổ tay (Tay Phải)




2 · Góc Roll — Nghiêng cổ tay (Tay Phải)




4 · Grip (Bóp tay phải)



Joystick (Tay Trái)



Nút Bấm (Tay Trái)




PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU — Lực bóp tay yếu / Bilateral / Mọi cơ


4 & 5 · Lực bóp tay yếu — TB: 0.000 kg Đỉnh: 0.000 kg (× Rất yếu)



6 · Phân bổ hai tay (Bilateral)



7 · Fatigue: 86% (✓ Ổn)



Ngưỡng lâm sàng tham khảo (Mathiowetz et al., Bohannon 2006, Desrosiers 1995):

aROM Pitch $\geq 30^\circ$ = Tốt | Tremor $< 3^\circ$ std = Kiểm soát tốt | FSR_L mean ≥ 0.10 kg = Tốt | FSR_L peak ≥ 0.20 kg = Tốt

Bilateral: Tay yếu đóng góp $\geq 40\%$ = Tốt | Fatigue $\geq 75\%$ = Trong ngưỡng an toàn | $< 50\%$ = Cần nghỉ ngơi

Báo cáo này chỉ mang tính hỗ trợ — Kết luận lâm sàng cần bác sĩ phụ trách xác nhận.