





#### Bollettino N. 4 del 29 agosto 2019 RISULTATI NAZIONALI

- 1 In Evidenza
- 2 Sorveglianza umana
- 3 Sorveglianza equidi
- 4 Sorveglianza uccelli bersaglio
- 5 Sorveglianza uccelli selvatici
- 6 Sorveglianza entomologica
- Sorveglianza avicoli e altre specie animali
- 8 Sorveglianza Usutu virus
- Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019







## In Evidenza

Questo numero del bollettino riassume i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile e del virus Usutu in Italia, aggiornate al **28 agosto 2019**.

- Dall'inizio di giugno 2019 sono stati segnalati 16 casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV), di questi 6 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 in Veneto, 3 in Emilia-Romagna, 1 in Piemonte), 7 casi come febbre confermata tutti segnalati in Veneto, 2 casi identificati in donatore di sangue (1 in Piemonte, 1 inEmilia-Romagna) e 1 caso asintomatico in Piemonte. Non sono stati segnalati casi di Usutu virus.
- La sorveglianza veterinaria in cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV in pool di zanzare, equidi ed uccelli in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. Le analisi molecolari eseguite nell'ambito della sorveglianza ornitologica ed identificato entomologica hanno la circolazione del Lineage 2 del WNV. Sono in corso ulteriori accertamenti nelle province Ascoli Piceno, Brescia, Cremona, Sondrio, Cuneo, Sassari, Piacenza, Pordenone e Ravenna.
- Al 22 agosto 2019 nell'Unione Europea sono stati segnalati 117 casi umani di infezione da WNV, 88 in Grecia, 11 in Romania, 9 a Cipro, 3 in Italia, 3 in Ungheria, 1 in Austria, 1 in Bulgaria e 1 in Francia. 10 casi sono stati segnalati nei paesi limitrofi (7 in Turchia e 3 in Serbia). Dieci decessi (6 in Grecia, 2 in Romania, 1 Cipro e 1 in Serbia) sono stati riportati (Fonte: ECDC 2018).

**Figura 1.** Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori, animali e uomo (donatori asintomatici, febbri e casi neuroinvasivi confermati)





Figura 2. Distribuzione dei casi umani di malattia da WNV nell'Unione Europea









## Sorveglianza umana

Da giugno 2019, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 16 casi confermati da West Nile Virus (WNV), 6 dei quali ha manifestato sintomi neuro-invasivi (Tabella 1) tutti casi autoctoni e 1 deceduto, 2 è donatore di sangue (1 Cuneo, 1 Parma), 7 casi di febbre confermata (3 Padova, 2 Treviso, 1 Venezia, 1 Vicenza) e 1 caso asintomatico. Di seguito è riportata la descrizione delle sole forme neuro-invasive.

Tabella 1. Distribuzione dei casi confermati di WNND per provincia di residenza e fascia di età, 2019

Regione/Provincia		Totale				
Regione/Flovincia	<=14	15-44	45-64	65-74	>=75	Totale
Emilia-Romagna						
Modena			2		1	3
Veneto						
Padova					1	1
Vicenza					1	1
Piemonte						
Torino				1		1
Totale	0	0	2	1	3	6




Figura 1. Andamento dei casi confermati di WNND per mese insorgenza sintomi, 2012 – 2019.







## Sorveglianza equidi

Il CESME ha confermato **3** focolai clinici di WND negli equidi in **provincia di Parma** e **Torino.** 





**Figura 2** Distribuzione geografica dei focolai di WND negli equidi- **2019** 

	_		con	Equidi nei focolai			т. —	za ci		
Regione	Provincia	N. Focolai	N. Focolai c sintomi clin	Presenti	Casi totali	Con segni clinici	Morti/abb attuti	Prevalenz casi total	Prevalenza casi clinic	Letalità
PIEMONTE	Torino	2	2	34	2	2	1	6%	100%	50%
EMILIA ROMAGNA	Parma	1	1	2	1	1	0	50%	100%	0%
Totale		3	3	36	3	3	1	8%	100%	33%

Tabella 2 Focolai e casi di WND negli equidi - 2019







## Sorveglianza uccelli bersaglio


Il CESME ha confermato 12 positività per WND su organi prelevati da altrettanti uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio catturati in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del Lineage 2.

Appartengono alle specie bersaglio:


- Gazza (Pica pica)
- Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
- Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Regione/provincia	CORNACCHIA	GAZZA	Totale
EMILIA ROMAGNA	4	6	10
Ferrara		1	1
Parma	2	4	6
Reggio Emilia	2	1	3
LOMBARDIA	1		1
Mantova	1		1
PIEMONTE	1		1
Asti	1		1
Totale	6	6	12

**Tabella 3** Casi di WND negli uccelli appartenenti alle specie bersaglio - **2019** 



**Figura 3** Distribuzione geografica dei focolai di WND negli uccelli appartenenti alle specie bersaglio - **2019** 



**Figura 4** Andamento spazio-temporale dell'infezione da WNV negli uccelli appartenenti alle specie bersaglio - **2019** 








#### Sorveglianza uccelli selvatici

La presenza del WNV è stata rilevata in **1 tortora** catturata in **Veneto** in provincia di **Padova.** Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 2**.



Regione/Provincia	n.uccelli positivi	Specie
VENETO	1	
Padova	1	Tortora

Tabella 4 Casi di WND negli uccelli selvatici - 2019






Figura 6 Andamento spazio-temporale dell'infezione da WNV negli uccelli selvatici - 2019







## Sorveglianza entomologica

La presenza del WNV è stata confermata in **19 pool di zanzare** catturate in **Emilia Romagna, Veneto** e **Lombardia.** Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 2.** 

Regione/Provincia	n.pool
EMILIA ROMAGNA	14
Ferrara	3
Parma	2
Reggio Emilia	4
Bologna	2
Modena	3
LOMBARDIA	1
Mantova	1
VENETO	4
Rovigo	1
Venezia	1
Verona	1
Vicenza	1
Totale	19

**Figura 7** Distribuzione geografica dei pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - **2019** 



**Tabella 5** Pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - **2019** 




Figura 8 Andamento spazio-temporale della presenza del WNV nelle zanzare catturate - 2019







## Sorveglianza avicoli e altre specie animali

Le attività di sorveglianza sugli **avicoli** e il monitoraggio sierologico su sieri di **bovini** e **ovi-caprini** o su **altre specie animali** non hanno rilevato positività nei confronti del WNV.









## **Sorveglianza USUTU virus**

Il virus Usutu è stato identificato in 28 pool di zanzare e negli organi di 11 uccelli selvatici in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.



**Figura 9** Distribuzione geografica dei pool di zanzare ed uccelli risultati positivi nei confronti dell'USUV - **2019** 

Regione/Provincia	n.pool
EMILIA ROMAGNA	27
Bologna	10
Ferrara	3
Modena	12
Piacenza	1
Rimini	1
VENETO	1
Verona	1
Totale	28

**Tabella 6** Dettaglio relativo ai pool di zanzare risultate positive nei confronti dell'USUV - **2019** 

Regione/Provincia	n.uccelli positivi
EMILIA ROMAGNA	10
Bologna	5
Ferrara	2
Rimini	3
LOMBARDIA	1
Sondrio	1
Totale	11

**Tabella 7** Dettaglio relativo agli uccelli risultati positivi nei confronti dell'USUV - **2019** 







# Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019

Il documento da una parte integra in un unico Piano la sorveglianza veterinaria (animale ed entomologica) del West Nile virus – essenziale per la stima del rischio – e quella dei casi umani; dall'altra, in considerazione delle analogie esistenti tra i rispettivi cicli biologici, integra le attività di sorveglianza previste per il WNV con quelle utili all'individuazione precoce della circolazione del virus Usutu in quelle aree dove il virus è stato rilevato in passato e che spesso coincidono con le aree endemiche per il WNV.

Per maggiori dettagli sulla sorveglianza integrata, sul flusso delle segnalazioni, sulle definizioni di caso di malattia neuroinvasiva da West Nile nell'uomo e negli equidi e sulle modalità di prevenzione e controllo della malattia è possibile consultare il documento completo relativo all'anno 2019 «Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019».

La sorveglianza umana è coordinata al livello nazionale dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità con il supporto del Ministero della Salute che trasmette i dati alla Commissione Europea ed all'ECDC. Le Regioni, in piena autonomia definiscono i documenti normativo-programmatici per la Sorveglianza epidemiologica e di laboratorio sul loro territorio e trasmettono i dati all'Istituto Superiore di Sanità ed al Ministero della Salute secondo il flusso riportato nel Piano.

Le attività di sorveglianza in ambito veterinario sono coordinate a livello nazionale dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche (CESME) istituito dal Ministero della Salute presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" cui afferiscono le attività di conferma diagnostica e la gestione dei dati trasmessi al Ministero della Salute secondo il flusso riportato nel Piano.





#### Consulta inoltre ...

- La pagina web dell'Istituto Superiore di Sanità dedicata al West Nile virus
- La pagina web dell'<u>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise</u> "G. Caporale" dedicata a West Nile Disease
- La pagina web dell'ECDC dedicata a West Nile fever.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Sangue</u> relative alle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell'infezione da West Nile Virus.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Trapianti</u> in merito alla trasmissione del Virus West Nile mediante trapianto d'organo, tessuti e cellule nella stagione estivo-autunnale 2017.
- La pagina Web del Ministero della Salute dedicata al West Nile virus

La realizzazione di questo rapporto è a cura di:

A. Bella, G. Venturi, F. Riccardo – Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

F. Iapaolo, F. Monaco, P. Calistri – CESME, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Si ringraziano, inoltre, tutti gli operatori sanitari delle Regioni che hanno contribuito alla sorveglianza, il Centro Nazionale Sangue, il Centro Nazionale Trapianti , la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e il Ministero della Salute.