





#### Bollettino N. 10 del 6 settembre 2018 RISULTATI NAZIONALI

- 1 In Evidenza
- 2 Sorveglianza umana
- 3 Sorveglianza equidi
- 4 Sorveglianza uccelli bersaglio
- 5 Sorveglianza uccelli selvatici
- 6 Sorveglianza entomologica
- Sorveglianza avicoli e altre specie animali
- 8 Sorveglianza Usutu virus
- Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018







# In Evidenza

Questo numero del bollettino riassume i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile e del virus Usutu in Italia, aggiornate al **5 settembre 2018**.

- Da giugno sono stati segnalati 365 casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV), di questi 148 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (42 in Veneto, 81 Emilia-Romagna, 11 Lombardia, 12 Piemonte, 2 Sardegna) di cui 19 deceduti (1 Lombardia, 6 in Veneto, 12 in Emilia-Romagna), 169 casi febbre confermata (58 Romagna, 102 Veneto, 4 Lombardia, 2 Piemonte, 3 Venezia Giulia) e 48 casi identificati in donatore di sangue (27 Emilia-9 Veneto, 6 Piemonte. Romagna, Lombardia, 2 Friuli Venezia Giulia). Sono stati segnalati 3 casi di Usutu virus (1 Veneto, 2 Emilia-Romagna).
- La sorveglianza veterinaria in cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del WNV in pool di zanzare ed uccelli in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Sono in corso di conferma positività in Provincia di Trento, Lodi, Bergamo, Varese, Sud Sardegna. Le analisi molecolari eseguite nell'ambito della sorveglianza ornitologica ed entomologica hanno identificato la circolazione del Lineage 2 del WNV.
- Al 30 agosto nell'Unione Europea sono stati segnalati 710 casi umani di infezione da WNV, 327 in Italia, 147 in Grecia, 117 in Romania, 96 in Ungheria, 11 in Francia, 8 in Austria, 3 in Croazia e 1 in Slovenia. Sono stati inoltre segnalati 265 casi umani nei paesi limitrofi (Fonte: <u>ECDC 2018</u>).

**Figura 1.** Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori, animali e uomo (donatori asintomatici, febbri e casi neuroinvasivi confermati)




Figura 2. Distribuzione dei casi umani di malattia da WNV nell'Unione Europea









### Sorveglianza umana

Da giugno 2018, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 365 casi confermati da West Nile Virus (WNV), 148 dei quali ha manifestato sintomi neuro-invasivi (Tabella 1) di cui 19 deceduti, 48 sono donatori di sangue (1 Asti, 6 Bologna, 1 Cremona, 8 Ferrara, 2 Forlì-Cesena, 1 Lodi, 2 Milano, 7 Modena, 2 Novara, 4 Padova, 1 Pordenone, 3 Ravenna, 1 Reggio nell'Emilia, 1 Torino, 1 Udine, 1 Venezia, 2 Vercelli, 4 Verona) e 169 casi di febbre confermata (1 Asti, 1 Bergamo, 14 Bologna, 3 Ferrara, 1 Forlì-Cesena, 32 Modena, 47 Padova, 1 Parma, 3 Pavia, 1 Piacenza, 2 Pordenone, 4 Ravenna, 2 Reggio nell'Emilia, 13 Rovigo, 1 Torino, 5 Treviso, 1 Udine, 12 Venezia, 20 Verona, 5 Vicenza). Di seguito è riportata la descrizione delle sole forme neuro-invasive.

Tabella 1. Distribuzione dei casi confermati di WNND per provincia di residenza e fascia di età, 2018

	Fascia di età					
Regione/Provincia	<=14	15-44	45-64	65-74	>=75	Totale
Emilia-Romagna						
Bologna		3	4	12	17	36
Ferrara				2	8	10
Forlì-Cesena		1	1			2
Modena		1	4	2	13	20
Piacenza					1	1
Ravenna				3	7	10
Reggio nell'Emilia		1		1		2
Sardegna						
Oristano				1	1	2
Veneto						
Padova		1	1	1	5	8
Rovigo			3	6	3	12
Venezia			3	1	6	10
Verona			1	1	7	9
Vicenza		1	1	1		3
Piemonte						
Alessandria		1		2	1	4
Cuneo			1	1		2
Novara			1			1
Torino				1	4	5
Lombardia						
Como				1		1
Cremona				1	1	2
Lodi					1	1
Mantova			1		2	3
Milano				2	1	3
Pavia					1	1
Totale	0	9	21	39	79	148




Figura 3. Andamento dei casi confermati di WNND per mese insorgenza sintomi, 2012 – 2018.








### Sorveglianza equidi

Il CESME ha confermato **69** focolai di WND negli equidi in **Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte , Friuli Venezia Giulia e Veneto**. Casi con sintomi clinici riferibili ad infezione da WNV sono stati confermati nelle province di Asti , Bologna, Modena, Mantova, Biella , Reggio Emilia ,Gorizia ,Torino.











			ē: 3	Equidi nei focolai			casi	casi		
Regione	Provincia	N. Focolai	N. Focolai N. Focolai con sintomi clinici	Presenti	Casi totali	Con segni clinici	Morti/abbat tuti	Prevalenza c totali	Prevalenza c	Letalità
	PADOVA	13	0	22	20	0	0	91%	0%	0%
	ROVIGO	13	0	46	21	0	0	46%	0%	0%
VENETO	TREVISO	5	0	7	6	0	0	86%	0%	0%
VENETO	VENEZIA	14	0	40	15	0	0	38%	0%	0%
	VICENZA	2	0	3	2	0	0	67%	0%	0%
	VERONA	8	0	11	9	0	0	82%	0%	0%
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	1	1	5	1	1	0	20%	100%	0%
LOMBADIA	CREMONA	1	1	3	1	1	0	33%	100%	0%
LOWIDADIA	MANTOVA	1	1	4	1	1	0	25%	100%	0%
	ASTI	1	1	53	1	1	0	2%	100%	0%
PIEMONTE	TORINO	2	2	9	2	2	1	22%	100%	50%
	BIELLA	1	1	100	1	1	0	1%	100%	0%
	BOLOGNA	5	3	66	7	3	1	11%	43%	14%
EMILIA ROMAGNA	MODENA	1	1	18	7	1	0	39%	14%	0%
	REGGIO EMILIA	1	1	106	1	1	0	1%	100%	0%
Totale		69	12	493	95	12	0	19%	13%	0%

Tabella 2. Focolai e casi di WND confermati negli equidi - 2018










### Sorveglianza uccelli bersaglio

Il CESME ha confermato **65 positività** per WND su organi prelevati da **65 uccelli stanziali** appartenenti a **specie bersaglio** catturati in **Emilia Romagna, Lombardia , Piemonte e Sardegna.** Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 2.** 

Appartengono alle specie bersaglio:

- Gazza (Pica pica)
- Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
- Ghiandaia (Garrulus glandarius)



Regione	Provincia	ia Cornacchia		Ghiandaia
	BOLOGNA		24	
	FERRARA	2	12	
	MODENA			1
EMILIA ROMAGNA	PARMA		4	
	RAVENNA		6	
	REGGIO EMILIA		3	
LOMBARDIA	CREMONA	1	1	
LOWIDARDIA	MANTOVA	1	3	
PIEMONTE	TORINO	4		
PIEWONTE	VERCELLI	1		
SARDEGNA	NUORO	1		
	ORISTANO		1	
Totale		10	54	1

**Tabella 3.** Casi di WND negli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio - 2018

**Figura 5.** Distribuzione geografica dei focolai di WND negli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio - 2018










### Sorveglianza uccelli bersaglio



**Figura 6.** Andamento spazio-temporale degli uccelli appartenenti alle specie bersaglio positivi al WNV-2018









### Sorveglianza uccelli selvatici

La presenza del WNV è stata rilevata in **50 uccelli selvatici** appartenenti a diverse specie **in Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna**. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 2**.



Regione	Provincia	N.uccelli positivi			
		BALESTRUCCIO	1		
		CARDELLINO	1		
		CINCIALLEGRA	1		
		CINCIARELLA	1		
		CIVETTA			
		COLOMBACCIO	4		
		GABBIANO REALE	1		
		GHEPPIO	4		
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	GUFO	1		
EIVIILIA KOIVIAGNA		MERLO	12		
		PASSERA D'ITALIA	2		
		RONDINE	3		
		RONDONE	6		
		STERNA COMUNE	1		
		STORNO	6 1 1		
		UPUPA	1		
		VERDONE	1		
	RAVENNA	CIVETTA	1		
LOMBARDIA	BRESCIA	GHEPPIO	1		
SARDEGNA	ORISTANO	ASTORE	2		
JANDEGNA	ONSTANO	CORVO	2		
	50				

**Tabella 4.** Casi di WND negli uccelli stanziali appartenenti alle specie selvatiche - 2018

**Figura 7.** Distribuzione geografica dei focolai di WND negli uccelli selvatici - 2018










Figura 8. Andamento spazio-temporale dell'infezione da WND negli uccelli selvatici -2018









### Sorveglianza entomologica

Il CESME ha confermato la presenza del WNV in **309 pool di zanzare** catturate in **Emilia Romagna**, **Veneto**, **Lombardia**, **Piemonte**, **Friuli Venezia Giulia e Sardegna**. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 2**.



**Figura 9**. Distribuzione geografica dei pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - 2018


p · /p · ·	
Regione/Provincia	Somma di n.pool
EMILIA ROMAGNA	
BOLOGNA	35
FERRARA	60
FORLI-CESENA	2
MODENA	29
PARMA	9
PIACENZA	2
RAVENNA	3
REGGIO EMILIA	17
RIMINI	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	
PORDENONE	1
UDINE	1
LOMBARDIA	
BRESCIA	2
MANTOVA	10
PAVIA	5
PIEMONTE	
ALESSANDRIA	1
CUNEO	1
NOVARA	2
VERCELLI	2
SARDEGNA	
SASSARI	1
VENETO	
PADOVA	5
ROVIGO	42
TREVISO	6
VENEZIA	37
VERONA	31
VICENZA	4
Totale	309
Totale	303

**Tabella 5**. Pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - 2018









 $\textbf{Figura 10}. \ \, \textbf{Andamento} \ \, \textbf{spazio-temporale delle catture di pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV -2018}$ 







# 7

### Sorveglianza avicoli e altre specie animali

Le attività di sorveglianza sugli **avicoli** e il monitoraggio sierologico su sieri di **bovini** e **ovi-caprini** o su **altre specie animali** non hanno rilevato alcuna positività nei confronti del WNV.









### **Sorveglianza USUTU virus**

Nell'ambito delle attività di sorveglianza nei confronti del **virus Usutu** la presenza del virus è stata riscontrata in **29 uccelli** ed in **122 pool di zanzare** (Tab.6).



**Figura 11**. Distribuzione geografica dei pool di zanzare ed uccelli risultati positivi nei confronti di USUTUV-2018

Regione/Provincia	n.pool
EMILIA ROMAGNA	87
BOLOGNA	23
FERRARA	19
FORLI-CESENA	6
MODENA	15
PARMA	5
PIACENZA	4
RAVENNA	7
REGGIO EMILIA	6
RIMINI	2
LOMBARDIA	13
BRESCIA	3
CREMONA	2
LODI	1
MANTOVA	4
PAVIA	3
VENETO	22
PADOVA	2
ROVIGO	5
TREVISO	1
VENEZIA	3
VERONA	10
VICENZA	1
Totale	122

**Tabella 6.** Dettaglio relativo ai pool di zanzare risultate positive nei confronti di USUTUV- 2018









# Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018

Il documento da una parte integra in un unico Piano la sorveglianza veterinaria (animale ed entomologica) del West Nile virus – essenziale per la stima del rischio – e quella dei casi umani; dall'altra, in considerazione delle analogie esistenti tra i rispettivi cicli biologici, integra le attività di sorveglianza previste per il WNV con quelle utili all'individuazione precoce della circolazione del virus Usutu in quelle aree dove il virus è stato rilevato in passato e che spesso coincidono con le aree endemiche per il WNV.

Per maggiori dettagli sulla sorveglianza integrata, sul flusso delle segnalazioni, sulle definizioni di caso di malattia neuroinvasiva da West Nile nell'uomo e negli equidi e sulle modalità di prevenzione e controllo della malattia è possibile consultare il documento completo relativo all'anno 2018 "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018" (pdf 1,7 Mb).

La sorveglianza umana è coordinata al livello nazionale dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità con il supporto del Ministero della Salute che trasmette i dati alla Commissione Europea ed all'ECDC. Le Regioni, in piena autonomia definiscono i documenti normativo-programmatici per la Sorveglianza epidemiologica e di laboratorio sul loro territorio e trasmettono i dati all'Istituto Superiore di Sanità ed al Ministero della Salute secondo il flusso riportato nel Piano.

Le attività di sorveglianza in ambito veterinario sono coordinate a livello nazionale dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche (CESME) istituito dal Ministero della Salute presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" cui afferiscono le attività di conferma diagnostica e la gestione dei dati trasmessi al Ministero della Salute secondo il flusso riportato nel Piano.





#### Consulta inoltre ...

- La pagina web dell'Istituto Superiore di Sanità dedicata al West Nile virus
- La pagina web dell'<u>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise</u> "G. Caporale" dedicata a West Nile Disease
- La pagina web dell'ECDC dedicata a West Nile fever.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Sangue</u> relative alle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell'infezione da West Nile Virus.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Trapianti</u> in merito alla trasmissione del Virus West Nile mediante trapianto d'organo, tessuti e cellule nella stagione estivo-autunnale 2017.
- La pagina Web del Ministero della Salute dedicata al West Nile virus

La realizzazione di questo rapporto è a cura di:

A. Bella, G. Venturi, F. Riccardo – Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

F. Iapaolo, F. Monaco, P. Calistri – CESME, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Si ringraziano, inoltre, tutti gli operatori sanitari delle Regioni che hanno contribuito alla sorveglianza, il Centro Nazionale Sangue, il Centro Nazionale Trapianti e il Ministero della Salute.