

## 部分分数分解と級数の極限

高校数学，発展的話題まで，

### 一つの例

まず，はじめに次の級数（数列の和のこと）を求める．

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

これは，以下のように式変形を行えば，求めることが出来る．

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \left( = \frac{n}{n+1} \right)\end{aligned}$$

このことから，次の極限值がわかる．

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

この極限值は以下のオイラーによって求められたバーゼル問題を考えると不思議なことに思われる．

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(1735 年, Leonhard Euler)

### 一つの拡張

上の問題を受けて，次の級数を求める．

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

まずは素直に求めてみよう.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left( \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} \\
&= \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\
&= \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{2} \left\{ \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\
&\quad \left. + \cdots + \left( \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n} \right) + \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right\} \\
&= \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\
&= \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) - \left( \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)} \right) \\
&= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}
\end{aligned}$$

よって、この級数の極限值は、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4}$$

である.

## もう一つの計算

次のように部分分数分解されとしよう. ただし  $A, B, C, D$  は定数とする.

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{Ak+B}{k(k+1)} + \frac{Ck+D}{(k+1)(k+2)}$$

これを  $A, B, C, D$  について上手く解けば,

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right)$$

一般の場合はこのようにすれば良いが、これは少し計算が煩雑である。工夫して計算しよう。

$$\begin{aligned}\frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{k+1} \left( \frac{1}{k(k+2)} \right) \\ &= \frac{1}{k+1} \left\{ \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right)\end{aligned}$$

このように式変形すれば、直ちに導出できる。級数についても、

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{12} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}\end{aligned}$$

よって、同様に、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4}$$

### 練習問題

次の極限值を求めよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+3)}$$

### 研究

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1) \cdots (k+m-1)(k+m)}$$

### 一つの一般化

$k$  と  $k+1$  の差は 1 であった。ここでは、一般化して、差を  $\alpha (> 0)$  としよう。

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+\alpha)} \quad (\alpha \neq -1)$$

この級数と極限值を求めたい、その前に準備が必要である。

## ガンマ関数

実部が正となる複素数  $z \in \mathbb{C}$  について、次の積分で定義される関数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \quad (\Re z > 0)$$

をガンマ関数と呼ぶ。次の式は階乗の一つの一般化として見ることができる。この等式の証明は部分積分を用いれば証明できる。

$$\begin{aligned}\Gamma(z+1) &= z\Gamma(z) \\ \Gamma(1) &= 1\end{aligned}$$

階乗と関連付けると、

$$\Gamma(n+1) = n!$$

一般の複素数  $z$  に対しては、次の解析接続が知られている。

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z n!}{\prod_{k=0}^n (z+k)}$$

## ディガンマ関数

ガンマ関数を用いて、次のディガンマ関数を定義する。

$$\psi(z) = \frac{d}{dz} \log \Gamma(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

今求めたい極限值を導出するには以下の関係式を用いる。

$$\psi(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \log n - \frac{1}{z} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{z+k} \right\}$$

続く...