

### Lista 1 – Solução de Equações Univariadas Não-Lineares via Métodos Fechados

- As questões são sorteadas.
- O código deve ser modularizado. No mínimo, devem existir: 1) função principal que define os parâmetros e chama as funções auxiliares; 2) função onde é implementado **apenas** o método numérico; 3) funções para plotagem de cada gráfico.
- Código semelhante ou copiado resulta em zero para todos em que isso for detectado.
- Ainda, o código deve imprimir o resultado via gráfico animado, via gráfico de convergência e via terminal até a sexta casa decimal e o número de iterações.
- O código completo deve ser entregue em um único arquivo .M via Moodle no prazo determinado.

1. Encontre a raiz de  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2$  no intervalo  $0,0 \leq x \leq 1,0$  utilizando o Método da Bissecção com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 0,839 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

2. Encontre a raiz de  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2$  no intervalo  $0,0 \leq x \leq 1,0$  utilizando o Método da Falsa Posição com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 0,8393 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

3. Encontre a raiz de  $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 0,275$  no intervalo  $1,0 \leq x \leq 1,5$  utilizando o Método da Bissecção com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 1,437 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

4. Encontre a raiz de  $f(x) = x^3 - x^2 + x - 0,275$  no intervalo  $0,0 \leq x \leq 1,0$  utilizando o Método da Falsa Posição com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 0,3569 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

5. Encontre a raiz de  $f(x) = x^4 - 8x^3 + 23x^2 + 16x - 50$  no intervalo  $1,0 \leq x \leq 2,0$  utilizando o Método da Bissecção com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 1,4142 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

6. Encontre a raiz de  $f(x) = x^4 - 8x^3 + 23x^2 + 16x - 50$  no intervalo  $1,0 \leq x \leq 2,0$  utilizando o Método da Falsa Posição com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 1,4142 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

7. Encontre a raiz de  $f(x) = 16x \sin\left(\frac{x}{10}\right) - \frac{37}{2}$  no intervalo  $0,0 \leq x \leq 5,0$  utilizando o Método da Bissecção com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 3,4341 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

8. Encontre a raiz de  $f(x) = 16x \sin\left(\frac{x}{10}\right) - \frac{37}{2}$  no intervalo  $0,0 \leq x \leq 5,0$  utilizando o Método da Falsa Posição com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 3,4341 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

9. Encontre a raiz de  $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)\left(x - \frac{9}{2}\right)(x + 29)$  no intervalo  $2,5 \leq x \leq 5,5$  utilizando o Método da Falsa Posição com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 4,5000 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .

10. Encontre a raiz de  $f(x) = \tan(x)\left(\frac{35}{2}x^3 - 44x^2 + 887x + 229\right)$  no intervalo  $3 \leq x \leq 4$  utilizando o Método da Bissecção com, no máximo, 1000 iterações. Quantas iterações foram necessárias até a convergência?

Resposta: 3,1416 para uma tolerância de  $10^{-5}$ .