

物部 慶幸 様



AI 疾病発症予測システムで、あなたがどの程度の確率で生活習慣病や心臓や脳などの循環器疾患、がんやうつ病になる可能性があるのかを調べました。AI の技術を使ってあなたの健康診断・問診のデータと、過去 460 万人の医療データを解析した結果とを照らしあわせて計算した結果がこのレポートです。

将来どのような病気になる可能性があるのかを知ることによって不安を解消し、健康づくりに取り組みましょう。



AI はあなたにこんなことを教えてくれています。



AI が示す 来富 太郎 様の各病気の起こりやすさ


生活習慣病	5 年発症率	10 年発症率	相対リスク比	昨年の相対リスク比
糖尿病	21.5 %	38.4 %	1.2	
高血圧	13.5 %	25.2 %	1.3	
脂質異常症	7.3 %	14.0 %	1.1	
痛風	2.5 %	4.9 %	1.1	
鉄欠乏性貧血	4.0 %	7.9 %	0.6	
循環器疾患	5 年発症率	10 年発症率	相対リスク比	昨年の相対リスク比
労作性狭心症	4.3 %	8.5 %	0.7	

「発症率」が高くても「相対リスク比」が低いこともありますし、逆に「発症率」が低くても「相対リスク比」が高いこともあります。一番いいのは両方とも低いことです！



● 5 年発症率・10 年発症率

これから 5 年以内にその病気にかかる確率を示します。5 年以内の発症確率が 100% なら、5 年以内に確実にその病気にかかりますし、0 %ならその病気にはまらずからないということです。



AI からのアドバイス

「発症率」「相対リスク比」を低くするにはどうすればいいのか、3 ページ以降に書かれています。あなた個人のリスクを上げているものを AI が調べた結果、何を改善すればいいかということが示されています。ここに示されている内容に今から 1 年注意して生活してみてください。

● 相対リスク比

あなたがほかの方と比べてどの程度病気にかかりやすいか、そのリスク度を数字で示したものです。これが 1 だとあなたがその病気にかかる確率は平均的な日本人と同じということです、3 だと平均的な日本人と比べて 3 倍その病気にかかりやすいことになります。逆に 0.5 なら平均的な日本人と比べてその病気にかかるリスクは半分となります。

さあ、今日から行動変容です！



AI が示す

物部 慶幸 様

の各病気の起こりやすさ

生活習慣病	5 年発症率	10 年発症率	相対リスク比	昨年の相対リスク比
糖尿病	21.5 %	38.4 %	1.2	
高血圧	17.5 %	31.9 %	1.7	
脂質異常症	7.3 %	14.0 %	1.1	
痛風	2.5 %	4.9 %	1.1	
鉄欠乏性貧血	3.4 %	6.8 %	0.5	
循環器疾患	5 年発症率	10 年発症率	相対リスク比	昨年の相対リスク比
労作性狭心症	4.3 %	8.5 %	0.7	
急性心筋梗塞	1.0 %	2.0 %	0.9	
心不全	4.1 %	8.0 %	1.4	
閉塞性動脈硬化症	1.0 %	2.1 %	0.6	
脳梗塞	2.6 %	5.1 %	0.7	
悪性腫瘍	5 年発症率	10 年発症率	相対リスク比	昨年の相対リスク比
肺がん	2.8 %	5.5 %	0.8	
大腸がん	6.0 %	11.6 %	0.8	
胃がん	9.9 %	18.9 %	1.6	
すい臓がん	4.1 %	8.0 %	1.4	
子宮頸がん				
乳がん				
前立腺がん	1.0 %	2.0 %	0.2	
神経疾患	5 年発症率	10 年発症率	相対リスク比	昨年の相対リスク比
うつ病	12.5 %	23.4 %	3.3	



AI が示す 物部 慶幸 様 のリスク因子と予防策

AIのアドバイス

あなたの病気へのかかりやすさには次のことが強く関わっていると、AI が示しました。

※同じ疾患でも原因は人によって異なります。

● 生活習慣病

糖尿病

適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。
糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。
塩分を抑えたバランスのとれた食事や適度な運動を心がけましょう。

高血圧

塩分を抑えたバランスのとれた食事や適度な運動を心がけましょう。
適度な運動の励行と、アルコールや脂肪の多い食品を抑えてください。
適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。

脂質異常症

適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。
適度な運動の励行と、アルコールや脂肪の多い食品を抑えてください。
糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。

痛風

適度な運動の励行と、アルコールや脂肪の多い食品を抑えてください。
お酒は控えめにしましょう。お酒がこの病気の原因になることがあります。
糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。

鉄欠乏性貧血

適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。
肝臓に負担がかかっている可能性があります。食生活をお気を付けください。
塩分を抑えたバランスのとれた食事や適度な運動を心がけましょう。

● 循環器疾患

労作性狭心症

AI解析からわかる狭心症への関与因子は、ありません。素晴らしいです。

急性心筋梗塞

定期的な健康チェックを受け、体重管理に努めましょう。
朝食をお取りいただけるとこの病気の発症リスクを抑えることができます。
肝臓に負担がかかっている可能性があります。食生活をお気を付けください。



AI が示す 物部 慶幸 様 のリスク因子と予防策

AIのアドバイス

あなたの病気へのかかりやすさには次のことが強く関わっていると、AI が示しました。

※同じ疾患でも原因は人によって異なります。

● 循環器疾患（続き）

心不全

塩分を控えたバランスのとれた食事や適度な運動を心がけましょう。
糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。
肝臓に負担がかかっている可能性があります。食生活をお気を付けください。

閉塞性動脈硬化症

AI解析からわかる閉塞性動脈硬化症への関与因子は、ありません。素晴らしいです。

脳梗塞

AI解析からわかる脳梗塞への関与因子は、ありません。素晴らしいです。

● 悪性腫瘍

肺がん

運動がこの病気の発症リスクを減らします。運動習慣を身につけましょう。
肝臓に負担がかかっている可能性があります。食生活をお気を付けください。
適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。

大腸がん

AI解析からわかる大腸癌への関与因子は、ありません。素晴らしいです。

胃がん

糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。
適切な食事と運動を取り入れて健康的な体重を維持することが重要です。
肝臓に負担がかかっている可能性があります。食生活をお気を付けください。

すい臓がん

糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。
適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。
肝臓に負担がかかっている可能性があります。食生活をお気を付けください。



AI が示す 物部 慶幸 様 のリスク因子と予防策

AIのアドバイス

あなたの病気へのかかりやすさには次のことが強く関わっていると、AI が示しました。

※同じ疾患でも原因は人によって異なります。

● 悪性腫瘍（続き）

子宮頸がん

乳がん

前立腺がん

AI解析からわかる前立腺癌への関与因子は、ありません。素晴らしいです。

● 神経疾患

うつ病

対応としては適切な食事と運動を心がけて尿酸値をコントロールしましょう。
適度な運動や健康的な食生活（野菜や果物、魚など）を心がけましょう。
糖尿病に気をつけてください。運動習慣・食生活などの見直しをお願いします。

各疾患の治療法や予防については、下記リンクで解説をご覧ください。



<https://laif-osaka.com>



AIによる 物部 慶幸 様の健康予報

天気予報のように、あなたの健康の現状と今後の予測について顔マークでお知らせいたします。病気の発症を防ぐためには、リスク因子と予防策をご参考ください。

● 生活習慣病

糖尿病

いま ▶▶▶ みらい



糖尿病とは、血液中の糖分が高くなる病気です。適切な治療をしないままでは、網膜症・神経障害・腎障害が生じ、失明や腎不全（人工透析）に至ります。1回の食事を減らす、体重をコントロールする、適度な運動することで改善が期待されます。それでも難しい場合には、経口血糖降下薬やインスリン製剤などを使用します。

高血圧

いま ▶▶▶ みらい



高血圧の診断基準は、病院での血圧が140/90mmHg（収縮期血圧 / 拡張期血圧）以上、または自宅での血圧が135/85mmHg以上です。高血圧の最大の原因は、塩分のとりすぎです。また、肥満・過度な飲酒・喫煙・運動不足も原因と考えられています。血圧高値が続く場合は、降圧薬の内服が必要になります。

脂質異常症

いま ▶▶▶ みらい



脂質異常症は、血液中に中性脂肪またはLDL（悪玉）コレステロールが基準値より高い、あるいはHDL（善玉）コレステロールが基準値より低い状態を指します。脂質異常で動脈硬化が起こると血管が詰まりやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクとなります。脂質異常症の発症には、食べすぎ・運動不足・肥満・喫煙・飲酒・ストレス、また遺伝的要因などが関係していると言われています。

痛風

いま ▶▶▶ みらい



痛風は、血液中の尿酸値が高くなって起こる病気です。尿酸とは、食べ物の中のプリン体が分解されることによりできる物質のことです。痛風は、レバー・ウニ・ビールなどプリン体を多く含む食べ物を取りすぎることによって起こります。関節内に尿酸の結晶がたまってくると、急性関節炎を起こします（痛風発作）。痛風を予防するには生活習慣の改善を心がけ、必要に応じて尿酸降下薬を服用します。

鉄欠乏性貧血

いま ▶▶▶ みらい



鉄欠乏性貧血は、体内の鉄が不足して起こる貧血です。鉄分が不足すると赤血球が全身に十分な量の酸素を運搬できず、倦怠感や動悸、めまいなどの症状が現れます。鉄の摂取不足、過多月経や消化管出血などの出血、腸からの吸収不全などが原因です。鉄分の多い食物を取り入れることに加えて鉄剤の内服が基本ですが、出血が原因の場合は、そちらの治療も必要です。



AIによる 物部 慶幸 様の健康予報

● 循環器疾患

労作性狭心症

いま ▶▶▶ みらい



労作性狭心症は、心臓自体に血液を届けている冠血管が、動脈硬化などにより細くなったり詰まったりする病気です。胸が痛い、重苦しいなどの症状が出現します。高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙・肥満などが危険性を高める原因として知られています。治療は、硝酸薬やCa拮抗薬などの薬物療法、カテーテルによる治療、バイパス手術などの外科的治療があります。

急性心筋梗塞

いま ▶▶▶ みらい



急性心筋梗塞は心臓に血液を送り込んでいる冠血管が詰まってしまい、心臓の筋肉が死んだ結果、心臓のポンプ機能が破綻する病気です。冠動脈の動脈硬化と粥腫(冠動脈のニキビのようなもの)の破裂が、主な原因と考えられています。高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙・肥満などが危険性を高める原因として知られています。治療方法は、薬物による血栓溶解療法、カテーテルによる再疎通治療、冠血管バイパス手術などです。

心不全

いま ▶▶▶ みらい



心不全とは、心臓のポンプ機能が低下する病気です。ポンプ機能が低下するため、筋肉や各臓器に十分に血液がいきわたらず「疲れやすい」、「だるい」といった症状が出たり、血液が肺や各臓器にうっ滞することで息苦しさを感じたり、脚にむくみが出たりします。治療は、薬物、ペースメーカー治療、心臓外科的治療、左室補助循環装置、心臓移植などいろいろあります。肥満、加齢、甲状腺機能の異常などが発症の危険性を高める原因として知られています。

閉塞性動脈硬化症

いま ▶▶▶ みらい



閉塞性動脈硬化症は、全身の血管の動脈硬化が原因となって発症する病気で、下肢の血管において発症することが多いです。糖尿病・高血圧・高脂血症・肥満・喫煙などが危険性を高める原因です。筋肉に血液が十行きわたらないため、しばらく歩くと痛みが現れます。これを間欠性跛行と言いますが、運動療法や薬物療法が行われます。さらに血管狭窄の程度が強くなると、カテーテル・外科的治療が必要となります。

脳梗塞

いま ▶▶▶ みらい



脳梗塞は、脳の血管が突然詰まって、脳細胞の一部が死んでしまう病気です。このため上半身・下半身・左右半身麻痺などの重大な後遺症を残したり、生命に関わってしまったりすることもあります。高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙などが危険性を高める原因として知られています。CTやMRIなどの画像検査で診断されることが多く、治療は薬物治療を基本として、急性期であればカテーテルを用いた血管内治療が行われることもあります。



AIによる 物部 慶幸 様の健康予報

● 悪性腫瘍

肺がん

いま ▶▶▶ みらい



肺がん発症率はすべてのがんのうち、男性では第2位、女性では第4位であり、男女合計すると第3位です。咳や血痰などの症状が出ることもあります。肺がんには特徴的なものはありません。治療には、外科手術、薬物療法、放射線治療などがあります。喫煙が最も危険性を高める原因となり、受動喫煙も危険性は同様であることが知られています。

大腸がん

いま ▶▶▶ みらい



大腸がん発症率はすべてのがんのうち、男性では第3位、女性では第2位であり、男女合計すると第2位です。多くは無症状で、進行するにつれて、血便や便秘、体重減少などさまざまな症状が現れます。治療には、内視鏡治療、外科手術、薬物療法、放射線治療などがあります。発生を高める危険な原因として、食生活（動物性脂肪やたんぱく質の過剰摂取）、肥満、飲酒、喫煙などが挙げられます。

胃がん

いま ▶▶▶ みらい



胃がん発症率はすべてのがんのうち、男性では第1位、女性では第3位であり、男女合計すると第1位です。早期胃がんの多くは無症状であり、進行すると腹痛や体重の減少、消化管からの出血による吐血や下血などが見られます。主な治療法は手術（内視鏡手術と外科手術）であり、抗がん剤治療や免疫治療、放射線治療などを組み合わせます。発生の危険性を高める原因としてヘリコバクター・ピロリ菌感染や喫煙があり、また高塩分食の摂取も危険性を高めます。

すい臓がん

いま ▶▶▶ みらい



すい臓がんの発症率はすべてのがんの中で、男性では第4位、女性では第3位であり男女合計すると第4位です。初期の段階では多くは無症状で、進行が非常に早いと、気づいたときには手遅れになることが多い生命に関わる疾患です。治療には、外科手術・薬物療法・放射線治療などがあります。発症の危険性を高める原因として、糖尿病・大量飲酒・喫煙・肥満・慢性膵炎などが挙げられます。通常の検査のみでは、早期発見が大変難しい疾患です。

子宮頸がん

いま ▶▶▶ みらい

子宮頸がんは、子宮の入り口の子宮頸部と呼ばれる部分から発生し、進行すると不正性器出血や腹痛・腰痛・血尿・血便などの症状が現れます。早期に治療をすれば比較的に見通しが良いがんですので、早期発見が極めて重要です。主な原因は、ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染で、日本では子宮頸がんワクチンの接種率が低いこともあり、罹患率・死亡率ともに増加傾向にあります。喫煙により、子宮頸がんが発生する危険性は高まります。



AIによる 物部 慶幸 様の健康予報

● 悪性腫瘍 続き

乳がん

いま >>> みらい

乳がんは 40 歳代後半から 50 歳代前半の女性に起きやすいのが特徴です。乳房のしこりで発見されることが多いので、40～50 歳代の女性は乳がん検診を定期的に受けることが重要です。発症には、女性ホルモンが深く関わっています。妊娠や出産の経験がない人、経口避妊薬を使用をしている人は、乳がんを発生するリスクが高くなります。その他、飲酒・肥満・運動不足といった生活習慣や、遺伝的要因もリスクを高めます。

前立腺がん

いま >>> みらい



前立腺がんは一般的に 50 歳以上の男性に発生し、特に 60 歳以降に増加していきます。早期の前立腺がんには自覚症状がないことが多く、がんが進行すると、尿が出にくい、排尿時に痛みを伴う、尿や精液に血が混じる、などの症状がみられることがあります。前立腺がんの腫瘍マーカーとして、血中 PSA（前立腺特異抗原）の測定は最も有用な方法です。

● 神経疾患

うつ病

いま >>> みらい



うつ病は、ストレスが加わることで脳内の神経伝達のバランスが悪くなり発症すると考えられています。「気分が落ち込む、興味や意欲が低下する」などの精神的な症状と、「睡眠が障害される、食欲が低下する、疲れやすくなる」などの身体的な症状が現れます。症状を早期に発見し、休養・ストレス緩和・環境調整・薬物治療を行います。

顔マークの意味



心配なし



少し心配です



心配です

各疾患の治療法や予防については、下記リンクで解説をご覧ください。



<https://laif-inc.com/>