

Mỗi tuần một bài toán


Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Dây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Đề bài

Cho tam giác ABC có P và Q là hai điểm đẳng giác trong tam giác. K là trung điểm PQ . Các điểm D, E, F lần lượt thuộc BC, CA, AB sao cho $KD \parallel QA, KE \parallel QB, KF \parallel QC$. Gọi N_a, N_b, N_c lần lượt là tâm đường tròn Euler của tam giác PBC, PCA, PAB . Chứng minh rằng KN_a, KN_b, KN_c lần lượt cắt EF, FD, DE theo ba điểm thẳng hàng.

Lời giải



Gọi U, V, W là hình chiếu của P lên BC, CA, AB . Theo định lý Poncelet thì các đường tròn Euler $(N_a), (N_b), (N_c)$ và đường tròn (UVW) có một điểm chung R . Ta chú ý QA, QB, QC lần lượt vuông góc với VW, WU, UV . Lấy X_1 thuộc EF sao cho $KX_1 \perp KD$. Tương tự có Y_1, Z_1 thì X_1, Y_1, Z_1 thẳng hàng theo định lý về cát tuyến trực giao. Gọi L là trực tâm tam giác UVW . Sử dụng tính chất tỷ số kép của chùm vuông góc, ta có biến đổi tỷ số kép $\frac{XE}{XF} / \frac{X_1E}{X_1F} = (EF, XX_1) = K(EF, XX_1) = U(WV, RL)$. Từ đó $\frac{XE}{XF} = \frac{X_1E}{X_1F} \cdot U(WV, RL)$. Tương tự với các tỷ số $\frac{YF}{YD}$ và $\frac{ZD}{ZE}$ ta thu được $\frac{XE}{XF} \cdot \frac{YF}{YD} \cdot \frac{ZD}{ZE} = \frac{X_1E}{X_1F} \cdot \frac{Y_1F}{Y_1D} \cdot \frac{Z_1D}{Z_1E} \cdot U(WV, RL)$.


$V(UW, RL) \cdot W(VU, RL) = 1$. Từ đó X, Y, Z thẳng hàng theo định lý Menelaus.

Nhận xét

Ý tưởng trong lời giải cũng là cách tác giả tạo ra bài toán này. Điểm mấu chốt của lời giải này là dùng định lý Poncelet và tính chất chùm vuông góc. Có bạn **Trương Mạnh Tuấn** lớp 12 Toán, THPT chuyên KHTN cho lời giải tương tự đáp án.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) với trung tuyến AM . Lấy P thuộc trung trực AB sao cho $AP \perp AC$. Lấy Q sao cho $PQ \perp AO$ và $QO \perp AM$. Trung trực CA cắt AB tại E . QE cắt AC tại F . Chứng minh rằng tâm ngoại tiếp tam giác AEF nằm trên AM .



Mọi trao đổi xin gửi về email anageomantica@gmail.com.


Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochohsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ **box riêng của chuyên mục** trên <http://dientoantoanhoc.net>.

Bài toán từ bạn đọc

Cho tam giác ABC , (O) , (I) theo thứ tự là đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp. E, F theo thứ tự là tiếp điểm của (I) và AC, AB . M, N là các giao điểm của EF và (O) . P, Q theo thứ tự là giao điểm thứ hai của BI, CI và (O) . S là giao điểm của các tiếp tuyến với (O) tại P và Q . Chứng minh rằng S là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN .

Tác giả: Thầy Nguyễn Minh Hà

Lời giải



Gọi IM, IN cắt lại (O) tại K, L . Tiếp tuyến qua B, C của (O) cắt nhau tại T . Theo bài toán tuần 4 tháng 10 năm 2017 thì $IT \perp KL$. Tứ giác $MNKL$ nội tiếp dẫn tới IT đi qua tâm ngoại tiếp tam giác IMN do đó giao điểm của IT và trung trực MN sẽ là tâm ngoại tiếp tam giác IMN . Theo định lý Pascal thì IT đi qua S , mặt khác $PQ \parallel MN$ do đó S nằm trên trung trực MN . Vậy S là giao của IT và trung trực MN , nói cách khác S là tâm ngoại tiếp tam giác IMN .


Biên tập: **Trần Quang Hùng**.

Nhận xét

Đây là một bài toán là phát triển tiếp tục bài toán chọn đội tuyển SP năm 2017, đây là các kết quả đẹp và có ý nghĩa.

Bài toán đề nghị

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Điểm S thuộc đoạn CD sao cho $\angle DSA = \angle CSB$. M, N theo thứ tự là giao điểm thứ hai của AS, BS và (O) . P, Q theo thứ tự là điểm đối xứng của M, N qua CD . T là giao điểm của AP và BQ . U, V theo thứ tự là giao điểm của CT, DT và AB . Chứng minh rằng $AU = BV$.



Tác giả: Thầy Nguyễn Minh Hà, THPT chuyên SP, Hà Nội.

Mỗi tuần một bài toán

Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN


Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Đề bài

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) với trung tuyến AM . Lấy P thuộc trung trực AB sao cho $AP \perp AC$. Lấy Q sao cho $PQ \perp AO$ và $QO \perp AM$. Trung trực CA cắt AB tại E . QE cắt AC tại F . Chứng minh rằng tâm ngoại tiếp tam giác AEF nằm trên AM .

Lời giải

Dựa theo lời giải của bạn **Nguyễn Quang Trung** lớp 12 Toán, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình.



Gọi T là giao các tiếp tuyến qua B, C của (O) . AT cắt (O) tại S khác A . BS cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác OBT tại L khác B .


B . PQ cắt AB tại R . Ta thấy góc có cạnh tương ứng vuông góc bằng nhau $\angle PBR = \angle BAO = \angle OBA$ do đó tứ giác $PBOR$ nội tiếp. Từ đó $\angle BRO = \angle BPO = 90^\circ - \angle PAB = \angle BAC$ do đó $OR \parallel AC$. Lại có $AC \perp OE$ nên tam giác ROE vuông tại O . Vậy $\angle ORE = \angle BAC = \angle BOT$ nên hai tam giác vuông ORE và BOT đồng dạng. Lại có $\angle TOL = \angle TSL = \angle ACB = \angle POB = \angle PRB$ và $\angle TBL = \angle BAS = \angle MAC = \angle QOE$, ta suy ra $\triangle ORE \cup Q \sim \triangle BOT \cup L$. Chú ý $OA^2 = OS^2 = OM \cdot OT$ nên $OASM$ nội tiếp. Từ đây suy ra $\angle SAM = \angle SOM = \angle SLT = \angle OQE$ mà $OQ \perp AM$ nên $AS \perp QE$. Lại có AM, AS đẳng giác trong $\angle EAF$ nên tâm ngoại tiếp tam giác AEF nằm trên AM .

Nhận xét

Bài toán được tác giả tạo ra nhờ sử dụng phép nghịch đảo. Có bạn **Phan Quang Trí** khoa toán đại học Sài Gòn cũng cho lời giải nghịch đảo tương tự.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) cố định với B, C cố định và A di chuyển trên (O) . E, F lần lượt đối xứng B, C qua CA, AB . M là trung điểm EF . Chứng minh rằng đường thẳng AM luôn đi qua một điểm cố định khi A di chuyển.



Mọi trao đổi xin gửi về email analgeomatica@gmail.com.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ **box riêng của chuyên mục** trên <http://dientoantoanhoc.net>.


Bài toán từ bạn đọc

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Điểm S thuộc đoạn CD sao cho $\angle DSA = \angle CSB$. P, Q theo thứ tự là giao điểm thứ hai của AS, BS và (O) . M, N theo thứ tự là điểm đối xứng của P, Q qua CD . T là giao điểm của AM và BN . U, V theo thứ tự là giao điểm của CT, DT và AB . Chứng minh rằng $AU = BV$.

Tác giả: Thầy Nguyễn Minh Hà

Lời giải

Dựa theo lời giải của bạn **Nguyễn Quang Trung** lớp 12 Toán, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình.



Do tính đối xứng và tứ giác nội tiếp $ABPQ$, nên $SN \cdot SB = SQ \cdot SB = SP \cdot SA = SM \cdot SA$ hay $\frac{SN}{SA} = \frac{SM}{SB}$, suy ra MN song song BA . Vì vậy nên ST đi qua trung điểm G của AB . Gọi PQ, PB cắt AB, AQ tương ứng tại E, F . DC cắt PQ, AB, EF lần lượt tại X, Y, Z . Đặt ST cắt MN tại J . Từ đó ta có $(SZ, XY) = E(SF, PB) = -1 = (ST, JG)$ suy ra $TZ \parallel JX \parallel AB$. Mặt khác, ta lại có EF là đối cực của S qua (O) nên $(DC, SZ) = -1$. Do đó, $T(UV, SZ) = (CD, SZ) = -1$. Như vậy, TS cũng đi qua trung điểm VU . Điều này dẫn tới hai đoạn thẳng AB và UV có trung điểm trùng nhau. Do đó, $AU = BV$.


Biên tập: Trịnh Huy Vũ sinh viên khoa toán ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Nhận xét

Đây là lời giải rất hay và thú vị. Bài toán có nhiều phát triển hay khác.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . O là tâm ngoại tiếp của tam giác ABC . K là trực tâm tam giác ABC . Q, L lần lượt đối xứng với D, I qua EF . DI cắt KL tại P . QL cắt OI tại R . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR đi qua I .



Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung sinh viên ĐH Bách Khoa TPHCM.

Mỗi tuần một bài toán

Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN


Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Đề bài

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) cố định với B, C cố định và A di chuyển trên (O) . E, F lần lượt đối xứng B, C qua CA, AB . M là trung điểm của EF . Chứng minh rằng đường thẳng AM luôn đi qua một điểm cố định khi A di chuyển.

Lời giải

Dựa theo lời giải của bạn **Huỳnh Bách Khoa** lớp 12 Toán, THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận.



Gọi BK, CL là đường cao của tam giác ABC . N là trung điểm BC . Dễ thấy tứ giác $NKML$ có các cạnh bằng $\frac{BC}{2}$ nên $NKML$ là hình thoi. Mặt khác $\angle KNL = 180^\circ - 2\angle BAC$ không đổi và cạnh hình thoi không đổi nên MN có độ dài cố định. Cũng từ $NKML$ là hình thoi thì $MN \parallel OA$. Gọi AM cắt trung trực BC tại X thì $\frac{XO}{XN} = \frac{AO}{MN}$ không đổi do đó X cố định.

Nhận xét

Bài toán được tác giả tạo ra nhờ sử dụng bài toán tương tự viết cho tam nội tiếp. Các bạn có thể kiểm chứng bài toán đó như sau

Bài toán. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có tâm nội tiếp I . E, F lần lượt đối xứng với B, C theo thứ tự qua IC, IB . M là trung điểm của EF . Chứng minh rằng IM đi qua giao điểm của hai tiếp tuyến qua B, C của (O) .


Bài toán trên cũng được bạn **Đỗ Trung Phương** lớp 12 Toán, THPT chuyên Vĩnh Phúc tổng quát trên diễn đàn AoPS bằng cách thay I bởi điểm bất kỳ trên phân giác. Ngoài ra cũng xuất hiện một tổng quát hơn nữa khi thay I bởi điểm bất kỳ trong mặt phẳng như sau

Bài toán. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và P là điểm bất kỳ trong mặt phẳng. Tiếp tuyến qua B, C của (O) cắt nhau tại T . PA cắt (O) tại D khác A . Các đường tròn $(PAB), (PAC)$ cắt lại CA, AB tại E, F . PT cắt EF tại S . TD cắt BC tại M . Chứng minh rằng $\frac{SE}{SF} = \frac{MC}{MB}$.

Có bạn **Trương Mạnh Tuấn** lớp 12 Toán, THPT chuyên KHTN cũng cho một lời giải khác.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC và P bất kỳ. D đối xứng P qua BC . O_a là tâm ngoại tiếp tam giác PBC . K_a là tâm ngoại tiếp tam giác O_aBC . DO_a cắt PK_a tại X . L_a thuộc PA sao cho $XL_a \perp XK_a$. Tương tự có L_b, L_c . Chứng minh rằng L_a, L_b và L_c thẳng hàng.



Mọi trao đổi xin gửi về email analgeomatica@gmail.com.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ **box riêng của chuyên mục** trên <http://dientoantoanhoc.net>.

Bài toán từ bạn đọc

Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . O là tâm ngoại tiếp của tam giác ABC . K là trực tâm của tam giác ABC . Q, L lần lượt đối xứng với D, I qua EF . DI cắt KL tại P . QL cắt OI tại R . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR đi qua I .

Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung


Lời giải

Dựa theo lời giải của bạn **Trương Mạnh Tuấn**, lớp 12 Toán trường THPT chuyên KHTN.

Ta phát biểu không chứng minh một số bổ đề quen thuộc:

Bổ đề 1. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) . Đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Khi đó, OI là đường thẳng Euler của tam giác DEF .

Bổ đề 2. Cho tam giác ABC có trực tâm H . Đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . X là hình chiếu của D lên EF . Khi đó, XD là phân giác của góc $\angle HXI$.



Giải bài toán. Đặt X là hình chiếu của D lên EF . Theo bổ đề 2 thì XD là phân giác của $\angle KXI$. Từ đó suy ra K, X, L thẳng hàng. Gọi H là trực tâm DEF và DH cắt (I) lần thứ hai tại H' . Theo bổ đề 1 ta được H, I, R, O thẳng hàng. Hơn nữa, ta lại có $\frac{PL}{PX} = \frac{LI}{DX} = \frac{DH}{DX} = \frac{QH'}{QX}$, suy ra $QP \parallel LH'$. Do đó, $\angle RQP = \angle QLH' = 180^\circ - \angle RLH' = 180^\circ - \angle PIH = \angle RIP$. Từ đó suy ra bốn điểm Q, R, P, I cùng nằm trên một đường tròn.


Biên tập. **Trịnh Huy Vũ** sinh viên khoa toán ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Nhận xét

Đây là bài toán hay có nhiều ứng dụng và phát triển trong các mô hình khác nhau.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC có B, C cố định và A thay đổi. Dựng ra ngoài các tam giác vuông tại A là AEC và AFB đồng dạng và có góc không đổi. M, N là trung điểm CE, BF . P, Q đối xứng với M, N qua CA, AB . FP cắt EQ tại R . Chứng minh rằng đường thẳng AR đi qua điểm cố định khi A thay đổi.



Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Trần Quang Hùng, Hà Nội

Các bài toán hình học hàng tuần

Trần Quang Hùng


Dây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên những lời giải hay cho ít nhất một bài toán được đề nghị ở trong các tuần trước và đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một số bài toán cho tuần sau. Các bài toán hình học được đề nghị có thể do tôi sáng tác, từ các bạn đọc sáng tác gửi tới hoặc được chọn lọc từ các cuộc thi Olympic trên toàn thế giới, tất cả đề bài và lời giải sẽ đều được ghi rõ nguồn gốc. Lời giải cho bài toán đề nghị, các phát triển cũng như mọi thảo luận và trao đổi xin gửi về địa chỉ email analgeomatrica@gmail.com.

Các bài toán tuần trước

Bài toán: Trần Quang Hùng

Cho tam giác ABC và P bất kỳ. D đối xứng P qua BC . O_a là tâm ngoại tiếp tam giác PBC . K_a là tâm ngoại tiếp tam giác O_aBC . DO_a cắt PK_a tại X . L_a thuộc PA sao cho $XL_a \perp XK_a$. Tương tự có L_b, L_c . Chứng minh rằng L_a, L_b và L_c thẳng hàng.

Lời giải sau của tác giả bài toán và được biên tập bởi tác giả.



Lời giải. Ta xét đường tròn (L'_a) đi qua P, X có tâm thuộc PA dễ thấy L'_a là trung điểm PL_a . Khi đó tương tự có các đường tròn (L'_b) và (L'_c) . Ta sẽ chứng minh các đường tròn $(L'_a), (L'_b)$ và (L'_c) đồng trục để suy ra L'_a, L'_b, L'_c thẳng hàng, vì từ tâm P tỷ số 2 suy ra L_a, L_b, L_c thẳng hàng, thật vậy. Nghịch đảo cực P phương tích bất kỳ thì X biến thành tâm đường tròn Euler


của tam giác PBC . Khi đó ta thu được bài toán chứng minh các đường thẳng đi qua tâm Euler của tam giác PBC, PCA và PAB lần lượt vuông góc với PA, PB và PC đồng quy là bài toán quen thuộc. \square

Nhận xét. Đây là bài toán hay được tạo ra nhờ phép nghịch đảo, bản thân bài toán gốc cũng là bài toán mà tác giả tạo ra trong quá trình đi dạy và được dùng làm đề kiểm tra đội tuyển toán ở trường THPT chuyên KHTN năm 2015.

Bài toán: Nguyễn Tiến Dũng, Trần Quang Hùng

Cho tam giác ABC có B, C cố định và A thay đổi. Dựng ra ngoài các tam giác vuông tại A là AEC và AFB đồng dạng và có góc không đổi. M, N là trung điểm CE, BF . P, Q đối xứng với M, N qua CA, AB . FP cắt EQ tại R . Chứng minh rằng đường thẳng AR đi qua điểm cố định khi A thay đổi.

Lời giải sau của **Telv Cohl** trên diễn đàn AoPS được biên tập bởi **Trần Quang Hùng**.



Lời giải. Dựng hình chữ nhật $BCUV$ ra ngoài tam giác ABC sao cho $\angle UBC = \angle ACE$ không đổi khi đó $BCUV$ cố định. Theo


bài toán quen thuộc về các tam giác vuông đồng dạng dựng ra ngoài tam giác thì FP đi qua U và EQ đi qua V . Dễ thấy hình chiếu K, L của B, C lần lượt trên FU, EV nằm trên đường tròn (O) ngoại tiếp hình chữ nhật. AK, AL cắt (O) tại U, V khác K, L theo định lý Pascal dễ thấy AR đi qua X . Ta dễ thấy $\angle YVU = \angle YKU = \angle AKF = \angle ABF$ không đổi. Tương tự $\angle XUV$ không đổi nên X cố định. \square

Nhận xét. Đây là bài toán đi qua điểm cố định hay với điểm cố định không dễ đoán nhận và có sử dụng một kết quả về các tam giác cân đồng dạng dựng ra ngoài một tam giác bất kỳ.

Các bài toán tuần này


Bài toán: Trần Quang Hùng

Cho $ABCDEF$ là lục giác lồi thỏa mãn $AB = CD = EF$ và $BC = DE = FA$ đồng thời $\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = \angle E + \angle F$. Chứng minh rằng $\angle B = \angle D = \angle F$.




Bài toán: Ngô Quang Dương

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . D là một điểm nằm trên cạnh BC . Một đường tròn tiếp xúc các đoạn thẳng DA, DB và tiếp xúc trong (O) tại F . Một đường tròn tiếp xúc các đoạn thẳng DA, DC và tiếp xúc trong (O) tại E . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác IEF luôn trực giao với (O) và đi qua một điểm cố định khác I .




Bài toán: Nguyễn Minh Hà, trường xuân 2015

Cho tam giác ABC , trực tâm H , tâm đường tròn Euler N , điểm Lemoine L . AH, BH, CH theo thứ tự cắt BC, CA, AB tại D, E, F . X, Y, Z theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác HBC, HCA, HAB . Chứng minh rằng DX, EY, FZ đồng quy tại một điểm thuộc NL .



Bài toán: I.Frolov, Sharygin Olympiad 2017 Final Round

Cho tam giác ABC có đường cao BE, CF và đường tròn bàng tiếp góc A là (J) . Hai tiếp tuyến chung trong của các đường tròn (AEF) và (J) cắt BC tại M, N . Chứng minh rằng $BM = CN$.



Copyright (c) 2015 <http://anageomantica.blogspot.com/>

Lấy điểm Q trên IP sao cho $\overline{PI} \cdot \overline{PQ} = \overline{PB} \cdot \overline{PE} = \overline{PC} \cdot \overline{PF}$, ta được (IBB') , (ICC') , (IEF) đi qua Q .

Mà BI đi qua điểm chính giữa cung CA không chứa B , còn $B'I$ đi qua điểm chính giữa cung CA chứa B nên qua phép nghịch đảo cực I , ta được (IBB') trực giao với (O) . Hoàn toàn tương tự, (ICC') trực giao với (O) .

Từ những điều trên, ta suy ra (IEF) trực giao với (O) và luôn đi qua điểm Q cố định. \square


Nhận xét. Đây là bài toán thú vị từ cấu hình các đường tròn Thebault. Cấu hình này đã trở thành rất kinh điển cho các đường tròn tiếp xúc nhưng trên đó vẫn còn nhiều bài toán mới có thể khai thác. Như bài toán trên là một ví dụ cho thấy điều này.

Bài toán: (Nguyễn Minh Hà, trường xuân 2015)


Cho tam giác ABC , trực tâm H , tâm đường tròn Euler N , điểm Lemoine L . AH, BH, CH theo thứ tự cắt BC, CA, AB tại D, E, F . X, Y, Z theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác HBC, HCA, HAB . Chứng minh rằng DX, EY, FZ đồng quy tại một điểm thuộc NL .

Chúng tôi xin giới thiệu lời giải của thầy **Nguyễn Minh Hà** được biên tập bởi bạn **Trần Quang Huy**.

Bổ đề. Nếu đường tròn nội tiếp (I) của $\triangle ABC$ theo thứ tự tiếp xúc với AB, AC tại E, F và K là giao điểm của BI và EF thì $\angle BKC = 90^\circ$.




Lời giải. Gọi N là tâm đường tròn Euler của $\triangle ABC$; D', E', F' theo thứ tự là giao điểm của OX, OY, OZ và YZ, ZX, XY .



Để thấy, O, X, Y, Z theo thứ tự là ảnh của H, A, B, C qua phép đối xứng S_N .

Từ đó, chú ý rằng BC, CA, AB, YZ, ZX, XY theo thứ tự là trung trực của OX, OY, OZ, HA, HB, HC , suy ra:

$S_N(D) = S_N(AH \cap BC) = S_N(AH) \cap S_N(BC) = XO \cap YZ = D'$
 $S_N(E) = S_N(BH \cap CA) = S_N(BH) \cap S_N(CA) = YO \cap ZX = E'$
 $S_N(F) = S_N(CH \cap AB) = S_N(CH) \cap S_N(AB) = ZO \cap XY = F'$
 Vậy AD', BE', CF' theo thứ tự là ảnh của DX, EY, FZ qua S_N . (1)



Dựng $\triangle UVW$ ngoại tiếp (O) sao cho VW, WU, UV theo thứ tự tiếp xúc với (O) tại A, B, C ; $S = BE' \cap CF'$; $P = YO \cap BC$; $Q = ZO \cap CB$; $K = OU \cap BC$.

Để thấy $N = AX \cap BY \cap CZ$; $L = AU \cap BV \cap CW$.

Để thấy $\overline{OP} \cdot \overline{OE'} = \overline{OK} \cdot \overline{OX} = \overline{OQ} \cdot \overline{OF'}$.

Do đó, P, Q, E', F' cùng thuộc một đường tròn. (2)

Để thấy: $(WZ, WV) \equiv (AB, AO) \equiv (AH, AC) \equiv (BC, OV) \equiv (YZ, YV) \pmod{\pi}$.

Do đó, Y, Z, V, W cùng thuộc một đường tròn. (3)

Từ (2), (3), chú ý rằng $E'P \equiv YV$, $PQ \parallel YZ$, suy ra:

$(E'F', WV) \equiv (E'F', E'P) + (YV, WV) \equiv (QF', QP) + (YZ, WZ) \equiv 0 \pmod{\pi}$

Điều này có nghĩa là $E'F' \parallel VW$.

Theo bổ đề trên, $WP \perp VO$, $VQ \perp WO$. Kết hợp với $ZE' \perp VO$, $YF' \perp WO$, suy ra: $WP \parallel ZE'$, $VQ \parallel YF'$. Vậy các điều kiện sau là tương đương:

$$\begin{aligned} & N, L, S \text{ thẳng hàng} \\ \Leftrightarrow & B(CNLS) = C(BNLS) \\ \Leftrightarrow & B(PYVE') = C(QZWF') \\ \Leftrightarrow & B(VPE'Y) = C(WQF'Z) \\ \Leftrightarrow & \frac{\overline{E'V}}{\overline{E'P}} : \frac{\overline{YV}}{\overline{YP}} = \frac{\overline{F'W}}{\overline{F'Q}} : \frac{\overline{ZW}}{\overline{ZQ}} \\ \Leftrightarrow & \frac{\overline{E'V}}{\overline{F'W}} \cdot \frac{\overline{ZW}}{\overline{YV}} = \frac{\overline{E'P}}{\overline{F'Q}} \cdot \frac{\overline{ZQ}}{\overline{YP}} \\ \Leftrightarrow & \frac{\overline{E'O}}{\overline{F'O}} \cdot \frac{\overline{ZW}}{\overline{YV}} = \frac{\overline{E'P}}{\overline{F'Q}} \cdot \frac{\overline{ZO}}{\overline{YO}} \quad (\text{vì } E'F' \parallel VW, PQ \parallel YZ) \\ \Leftrightarrow & \frac{\overline{E'O}}{\overline{F'O}} \cdot \frac{\overline{YO}}{\overline{ZO}} \cdot \frac{\overline{ZW}}{\overline{YV}} = \frac{\overline{E'P}}{\overline{F'Q}} \\ \Leftrightarrow & \frac{\overline{ZW}}{\overline{E'P}} = \frac{\overline{YV}}{\overline{F'Q}} \quad (\text{vì } Y, Z, E', F' \text{ cùng thuộc một đường tròn}) \\ \Leftrightarrow & \frac{\overline{ZO}}{\overline{E'O}} = \frac{\overline{YO}}{\overline{F'O}} \quad (\text{vì } ZE' \parallel WP) \\ \Leftrightarrow & \overline{ZO} \cdot \overline{F'O} = \overline{YO} \cdot \overline{E'O} \quad (\text{đúng vì } Y, Z, E', F' \text{ cùng thuộc một đường}) \end{aligned}$$

Vậy, BE', CF' và NL đồng quy.


Tương tự, BE', AD' và NL đồng quy.

Tóm lại, AD', BE', CF' đồng quy tại một điểm thuộc NL . (4)

Từ (1), (4) suy ra điều phải chứng minh. \square

Bài toán: (I.Frolov, Sharygin Olympiad 2017 Final Round)

Cho tam giác ABC có đường cao BE , CF và đường tròn bàng tiếp góc A là (J) . Hai tiếp tuyến chung trong của các đường tròn (AEF) và (J) cắt BC tại M , N . Chứng minh rằng $BM = CN$.



Chúng tôi xin giới thiệu lời giải của tác giả bài toán được biên tập bởi bạn **Trịnh Huy Vũ**.

Lời giải. P là tâm vị tự trong của hai đường tròn (AEF) và (J) . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và G là trung điểm của AH . Ta có G đồng thời cũng là tâm của đường tròn (AEF) . Đặt T là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC với BC , T' là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác MNP với MN , D là tiếp điểm của đường tròn (J) với BC . Dựng đường kính DD' của đường tròn (J) .


Do $AG \parallel DD'$ và P là tâm vị tự trong của (AEF) và (J) nên A, P, D' thẳng hàng. Hơn nữa ta cũng có A là tâm vị tự ngoài của đường tròn (I) và (J) , vì vậy A, T, D' thẳng hàng. Như vậy, bốn điểm A, P, T, D' cùng nằm trên một đường thẳng. Mặt khác, (J) cũng là đường tròn bàng tiếp góc P của tam giác MNP , do đó đường thẳng PD' đi qua tiếp điểm T' của đường tròn nội tiếp tam giác MNP với BC . Từ đó suy ra $T \equiv T'$.

Như vậy, T, D tương ứng là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp và bàng tiếp của các tam giác ABC, MNP với đường thẳng BC . Do đó, ba đoạn thẳng BC, DT, MN có trung điểm trùng nhau. Vì vậy, $BM = CN$. \square

Các bài toán tuần này


Bài toán: (IMO Shortlist 2016 G6)

Cho tứ giác $ABCD$ lồi với $\angle ABC = \angle ADC < 90^\circ$. Phân giác các góc $\angle ABC$ và $\angle ADC$ lần lượt cắt AC tại E và F đồng thời cắt nhau tại P . M là trung điểm AC và ω là đường tròn ngoại tiếp tam giác BPD . BM và DM cắt lại ω tại X và Y . Gọi Q là giao điểm của XE và YF . Chứng minh rằng $PQ \perp AC$.



Bài toán: (Từ AoPS)


Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) , trực tâm H và tâm nội tiếp I . Đường thẳng qua I vuông góc OA cắt cung nhỏ AB tại D . M là trung điểm BC . MI cắt AH tại N . Đường tròn (DNH) cắt AD lần nữa tại G . Đường thẳng qua D song song GH cắt AH tại J . AI cắt OJ tại K . MK cắt AJ tại P . Chứng minh rằng $PA = HB + HC$.



Bài toán: (IMO Shortlist 2016 G7)


Gọi I là tâm nội tiếp tam giác ABC và I_A là tâm bàng tiếp góc A của tam giác. I'_A đối xứng với I_A qua BC và l_A là đối xứng của đường thẳng AI'_A qua AI . Định nghĩa tương tự các điểm I_B, I'_B và đường thẳng l_B, l_A cắt l_B tại P .

- Chứng minh rằng P nằm trên OI với O là tâm ngoại tiếp tam giác ABC .
- Gọi một tiếp tuyến qua P của đường tròn nội tiếp (I) cắt (O) tại X và Y . Chứng minh rằng $\angle XIY = 120^\circ$.




Bài toán: (Trịnh Huy Vũ)

Cho tam giác ABC nhọn, không cân và $\angle A \neq 60^\circ$. G, N lần lượt là trọng tâm và tâm đường tròn chín điểm của tam giác ABC . Dựng một tam giác EBC cân tại E thỏa mãn A, E cùng phía với BC và $\angle BEC = 120^\circ$. Trung trực của AE cắt BC tại X . Chứng minh rằng $GX \perp AN$.




Bài toán: (Nguyễn Minh Hà, trường Xuân năm 2015)

Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC , đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC tại D . X là điểm đối xứng của D qua AI . MX lại cắt (I) tại Y . Z là điểm đối xứng của I qua Y . T là điểm đối xứng của Z qua BC . Chứng minh rằng bốn điểm I, B, C và T cùng thuộc một đường tròn.




Bài toán: (Trần Quang Hùng, mở rộng Iran TST 2017)

Cho tam giác ABC và P, Q nằm trong tam giác sao cho $PQ \parallel BC$. BQ cắt CP tại R . AR cắt PQ tại S . Đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ cắt CA, AB tại E, F khác A . FP cắt EQ tại T . Các đường thẳng qua S lần lượt song song với AB, AC theo thứ tự cắt FP, EQ tại X, Y . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác TXY tiếp xúc (O).



Bài toán: (Lev Emelyanov, từ Forum Geometricorum năm 2001)


Cho các điểm A_1, B_1 và C_1 lần lượt nằm trên các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC . Dựng các đường tròn $(O_1), (O_2)$ và (O_3) ở ngoài tam giác và tiếp xúc với các cạnh của tam giác ABC theo thứ tự tại A_1, B_1 và C_1 và cũng tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng nếu AA_1, BB_1 và CC_1 đồng quy thì đường tròn tiếp xúc ngoài với ba đường tròn $(O_1), (O_2)$ và (O_3) cũng sẽ tiếp xúc với đường tròn nội tiếp tam giác ABC .



Bài toán: (Đỗ Thanh Sơn, bài giảng cho đội tuyển chuyên KHTN)


Cho tam giác ABC . Giả sử có điểm P nằm trong tam giác và nhìn ba cạnh của tam giác dưới ba góc bằng nhau. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{PD} + \frac{1}{PE} + \frac{1}{PF} = 2\left(\frac{1}{PA} + \frac{1}{PB} + \frac{1}{PC}\right).$$




Bài toán: (Nguyễn Đăng Phát, tập huấn đội tuyển Việt Nam thi IMO năm 2009)

Cho hàng điểm điều hòa $(AB, CD) = -1$. Chứng minh rằng tồn tại một đường tròn tiếp xúc với các đường tròn đường kính AC, CB, BD và DA .



Bài toán: (Đào Thanh Oai, từ Advance Geometry Yahoo Group)

Cho $A_i, i = 1, 2, \dots, 6$ là sáu điểm trên một đường tròn. Sử dụng chỉ số lấy theo module 6, ký hiệu giao điểm của các đường $A_i A_{i+1}$ và $A_{i+2} A_{i+3}$ lần lượt là B_{i+3} và tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác $A_i A_{i+1} B_{i+2}$ là C_{i+3} . Chứng minh rằng các đường thẳng $C_1 C_4, C_2 C_5$ và $C_3 C_6$ đồng quy.



Một số bài toán cho đội tuyển

Dành cho đội tuyển THPT chuyên KHTN năm 2017

Bài toán 1

Cho tam giác ABC . Đường thẳng qua B vuông góc CA cắt đường tròn đường kính CA tại K, L sao cho K nằm giữa B, L . Đường thẳng qua C vuông góc AB cắt đường tròn đường kính AB tại M, N sao cho M nằm giữa C, N . Chứng minh rằng MK, NL và BC đồng quy.

Bài toán 2

Cho tam giác ABC trực tâm H . Đường tròn đường kính AB cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AHC tại E khác A . Đường tròn đường kính AC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AHB tại F khác A . Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác AEF . Chứng minh rằng AK đi qua tâm đường tròn Euler của tam giác ABC .

Bài toán 3

Cho tam giác ABC tâm nội tiếp I . AI cắt BC tại D . E đối xứng D qua IC . DE cắt IB tại F . EI cắt AB tại G . Chứng minh rằng AF, DG và IC đồng quy.

Bài toán 4

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) cố định, B, C cố định, A di chuyển trên (O) . Đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC tiếp xúc CA, AB tại E, F . M, N là điểm đối xứng của I qua CA, AB . Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn tiếp xúc một đường tròn cố định khi A di chuyển.

Bài toán 5

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , đường cao AD . AE là đường kính của (O) . ED cắt đường tròn (A, AD) tại F khác D . Chứng minh rằng FD là phân giác $\angle BFC$.

Bài toán 6

Cho tam giác ABC tâm ngoại tiếp O , phân giác AD . P di chuyển trên AD . PB, PC cắt CA, AB tại E, F . M là hình chiếu của P lên BC . PM cắt EF tại K . AK cắt OP tại L . Chứng minh rằng ML luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển.

Bài toán 7

Cho tam giác ABC đường cao AD . M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng đường thẳng qua M vuông góc với phân giác góc A và trung trực MD cắt nhau trên đường tròn Euler của tam giác ABC .

Bài toán 8

Cho hình thang $ABCD$ với $\angle A = \angle D = 90^\circ$. M là trung điểm AD . N là giao của đường thẳng qua D vuông góc CM và đường thẳng qua A vuông góc BM . Chứng minh rằng MN vuông góc với BC .

Bài toán 9

Cho hình chữ nhật $ABCD$. Đường tròn (O) tiếp xúc ngoài đường tròn (K) ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ tại T . Lấy P, Q thuộc (O) sao cho $PQ \parallel AD$ và $PQ = AD$. AP giao DQ tại N . BP cắt CQ tại H . Chứng minh rằng K, H, T, N thuộc một đường tròn.

Bài toán 10

Cho tam giác ABC với P là một điểm trên BC . Gọi K, L là tâm nội tiếp của tam giác PAB, PAC . Gọi M, N là tâm bàng tiếp góc B, C của tam giác PAB, PAC . PA cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác PKL, PMN lần lượt tại R, Q . Chứng minh rằng A là trung điểm của R, Q .

Bài toán 11

Cho hình bình hành $ABCD$ và P là một điểm trên đoạn BD . Đường tròn tâm (P) đi qua A cắt AD tại Y khác A và cắt AB tại X khác A . AP cắt BC tại Q và cắt CD tại R . Chứng minh rằng $\angle XPY = \angle XQY + \angle XRY$.

Bài toán 12

Cho tam giác ABC , trực tâm H , trung tuyến AM . Y thuộc CA sao cho $YH \perp MH$. Q thuộc BH sao cho $QA \perp MA$. Chứng minh rằng đường tròn đường kính MY và MQ cắt nhau trên AH .

Bài toán 13

Cho tam giác ABC , đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Đường thẳng song song với EF qua B, C lần lượt cắt DE, DF, DE, DE tại P, Q, R, S . Chứng minh rằng PR, QS, EF đồng quy.

Bài toán 14

Cho tam giác ABC tâm ngoại tiếp O . J là một điểm nằm trên phân giác trong góc A . X, Y, Z là hình chiếu của J trên BC, CA, AB . JO cắt BC tại D . E thuộc AD sao cho $AJ \parallel EX$. EX cắt YZ tại V . Chứng minh rằng V là trung điểm EX .

Bài toán 15

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp AD giao BC tại P . AC cắt BD tại R . X, Y, Z là hình chiếu của D lên AC, BC, PR . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác XYZ đi qua trung điểm CD .

Bài toán 16

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và đường tròn bàng tiếp góc A là (I_a) . Tiếp tuyến chung ngoài của (O) và (I_a) tiếp xúc (O) tại M, N . Gọi I_b, I_c là tâm bàng tiếp góc B, C của tam giác ABC . Chứng minh rằng M, N, I_b, I_c cùng thuộc một đường tròn.

Bài toán 17

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) tâm nội tiếp I . K đối xứng I qua O . D, E, F là hình chiếu của K lên BC, CA, AB . Phân giác ngoài tại các đỉnh A, B, C cắt (O) tại X, Y, Z khác A, B, C . Gọi L là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF . Chứng minh rằng các đường thẳng qua A, B, C lần lượt song song với XL, YL, ZL đồng quy.

Bài toán 18

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tâm nội tiếp I . Trên tia AB, AC lấy các điểm D, E sao cho $AD = AE = BC$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt (O) tại K khác A . AI cắt (O) tại P khác A . Chứng minh rằng các tam giác KBD, KCE, POI đồng dạng với nhau.

Mỗi tuần một bài toán


Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Dây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Đề bài

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có tâm nội tiếp I . P là một điểm nằm trong tam giác sao cho $\angle PBA = \angle PCA$. D, E, F là hình chiếu của P lên BC, CA, AB . Trên CA, AB lấy M, N sao cho $IM \parallel PB, IN \parallel PC$. MN cắt (O) tại Q, R . QI, RI cắt lại (O) tại K, L . Các đường thẳng qua B, C lần lượt song song với DF, DE cắt nhau tại J . Chứng minh rằng $IJ \perp KL$.

Lời giải



Gọi IM, IN lần lượt cắt các đường tròn $(IAC), (IAB)$ tại T, S khác I . Ta thấy $MI \cdot MT = MA \cdot MC = MR \cdot MQ$ nên T nằm trên đường tròn (IQR) . Tương tự S nằm trên đường tròn (IQR) . Gọi IM, IN lần lượt cắt KL tại U, V . Ta có $\angle UKI = \angle IRQ = \angle ITQ$ nên tứ giác $KUQT$ nội tiếp. Gọi BI cắt (O) tại X khác B . Ta suy ra $IU \cdot IT = IK \cdot IQ = IB \cdot IX$ do đó tứ giác $BUXT$ nội tiếp mà tam giác XIT cân tại X do đó tam giác UBI cân tại U . Gọi G đẳng giác P trong tam giác ABC . Do $IU \parallel PB$


nên U nằm trên BG . Cũng dễ thấy $GB \perp DE \parallel BJ \parallel BJ$. Tương tự $GC \perp CJ$. Từ đó JB tiếp xúc đường tròn (U, UB) . Vậy $\mathcal{P}_{U/(J)} = UB^2 = UI^2 = \mathcal{P}_{U/(I,0)}$ do đó U nằm trên trục đẳng phương của đường tròn (J) và đường tròn điểm I . Tương tự với V nên UV hay KL là trục đẳng phương của đường tròn (J) và đường tròn điểm I do đó $IJ \perp KL$.

Nhận xét

Bài toán này được tác giả phát triển từ bài toán chọn đội tuyển THPT chuyên ĐHSPT năm 2017. Bạn **Nguyễn Minh Hiếu** gửi tới tác giả lời giải tương tự đáp án, bạn **Trương Mạnh Tuấn** lớp 12 Toán THPT chuyên KHTN cho lời giải dùng định lý Pascal rất thú vị.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) . P di chuyển trên phân giác trong góc $\angle BAC$. E, F là hình chiếu của P lên CA, AB . EF cắt (O) tại M, N . MP, NP cắt lại (O) tại Q, R . Chứng minh rằng đường thẳng qua P vuông góc QR luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển.



Mọi trao đổi xin gửi về email analgeomatica@gmail.com.

Cúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ **box riêng của chuyên mục** trên <http://dientoantoanhoc.net>.

Biên tập: **Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.**


Bài toán từ bạn đọc

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD . E, F thuộc (O) sao cho $EF \parallel BC$. AE cắt DB, DC tại M, N . AF cắt DB, DC tại P, Q . Gọi H, K lần lượt là trực tâm các tam giác DMN và DPQ . AH, AK cắt BC tại U, V . Chứng minh rằng $BU = CV$.

Tác giả: Trần Minh Ngọc

Lời giải

Lời giải sau kết hợp ý tưởng của bạn **Nguyễn Minh Hiếu** lớp 12 Toán THPT chuyên SP và **Nguyễn Tiến Dũng**, Hà Nội




Gọi NH cắt DM tại I . PK cắt DQ tại J . MH cắt BA, BC lần lượt tại X, Y . QK cắt CA, CB lần lượt tại Z, T . Hai tam giác DMN và DPQ đồng dạng g.g nên $\frac{DH}{DE} = \frac{DK}{DF}$ và $\frac{NH}{NI} = \frac{PK}{PJ}$. Từ đó, dễ thấy $HK \parallel EF$. Do $TH \parallel NH \parallel AB$ và $XY \parallel PK \parallel AC$ nên $\frac{CY}{CB} = \frac{AX}{AB} = \frac{NH}{NI} = \frac{PK}{PJ} = \frac{AZ}{AC} = \frac{BT}{BC}$. Vì thế $XZ \parallel BC$ và $BT = -CY$. Chú ý rằng các tứ giác $BXZT$ và $CZXY$ là các hình bình hành và $XZ \parallel YT \parallel HK$, ta có $\frac{UC}{UY} = \frac{CA}{YH} = \frac{CA}{CZ} \cdot \frac{YX}{YH} = \frac{BA}{BX} \cdot \frac{TZ}{TK} = \frac{BA}{TK} = \frac{VB}{VT}$. Kết hợp $\overline{BT} = -\overline{CY}$, ta thấy $\overline{BU} = -\overline{CV}$, đó là điều phải chứng minh.

Nhận xét

Đây là một bài toán chứng minh từ đẳng giác tới đẳng cự rất thú vị. Bạn **Nguyễn Tiến Dũng** đã cho một lời giải khác nữa tại [đây](#).

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC có trực tâm H và tâm ngoại tiếp O . K là tâm của đường tròn (BOC) . Đối xứng của AK qua BH, CH cắt nhau tại L . Chứng minh rằng $AH = AL$.



Tác giả: **Trịnh Huy Vũ** sinh viên khoa Toán, ĐHKTN, ĐHQGHN.

Mỗi tuần một bài toán

Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Dây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.


Đề bài

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) . P di chuyển trên phân giác trong góc $\angle BAC$. E, F là hình chiếu của P lên CA, AB . EF cắt (O) tại M, N . MP, NP cắt lại (O) tại Q, R . Chứng minh rằng đường thẳng qua P vuông góc QR luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển.


Lời giải

Lời giải kết hợp ý tưởng lời giải gốc của tác giả và của bạn **Trương Tuấn Nghĩa** lớp 9 Toán trường Hà Nội Amsterdam.

Bổ đề. Cho tam giác ABC có B, C cố định và A di chuyển. Dựng ra ngoài các tam giác cân CAQ, ABR cân tại Q, R có các góc $\angle Q = \angle R = \alpha$ không đổi. Dựng ra ngoài tứ giác $BCRQ$ tam giác PQR cân tại P có $\angle P = \alpha$. Khi đó đường thẳng AP luôn đi qua một điểm cố định khi A di chuyển.



Chứng minh. Gọi PA cắt trung trực BC tại X . Gọi giao điểm khác P của AP và (PQR) là M . Khi đó $\angle QMP = \angle QRP = \angle QBA$ suy ra tứ giác $BAMQ$ nội tiếp. Tương tự $CAMR$ nội tiếp. Ta suy ra $\angle AMB = \angle AQB = \angle ARC = \angle AMC$ do đó MX là phân giác $\angle BMC$ vậy tứ giác $MBXC$ nội tiếp. Từ đó $\angle XBC = \angle XMC = \angle ARC = \alpha$ không đổi do đó X cố định.



Giải bài toán. Gọi $(K), (L)$ là đường tròn ngoại tiếp các tam giác PCA, PAB . PE, PF lần lượt cắt $(K), (L)$ tại Y, Z khác P . Ta thấy $EM \cdot EN = EA \cdot EC = EP \cdot EY$ suy ra Y nằm trên đường tròn (PMN) . Tương tự Z nằm trên (PMN) . Gọi G là tâm đường tròn (PMN) ta suy ra $GK \perp GY \perp AC$ suy ra $GK \parallel AC$. Tương tự $GL \parallel AB$. Từ đó ta dễ suy ra $\angle KGL = \angle BAC = 2\angle PAB = \angle PLB = \angle PKC$. Từ đó ta có các tam giác cân GKL, LPB và KPC lần lượt cân tại G, L và K đồng thời các góc ở đỉnh bằng $\angle BAC$ không đổi. Từ đó theo bổ đề PG đi qua điểm cố định. Do $MNRQ$ nội tiếp nên $PG \perp QR$. Ta có điều phải chứng minh.

Nhận xét

Bài toán này được tác giả phát triển từ bài toán chọn đội tuyển SP năm 2017. Ban đầu tác giả có ý tưởng dựng ra các điểm Y, Z và dùng trục đẳng phương nhưng bạn **Nghĩa** đưa ra bổ đề làm lời giải gọn hơn. Bạn **Trương Mạnh Tuấn** lớp 12 Toán THPT chuyên KHTN cho lời giải tại [đây](#). Bạn **Nguyễn Việt Dũng** lớp 12 Toán, THPT chuyên Hạ Long gửi lời giải qua email.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với trực tâm H . AH cắt (O) tại P khác A . PB, PC lần lượt cắt OC, OB tại Q, R . K đối xứng với trực tâm tam giác PQR qua BC . LA cắt HB, HC tại S, T . Chứng minh rằng CS và BT cắt nhau trên đường tròn (BHC) . Mọi trao đổi xin gửi về email analgeomatica@gmail.com.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochohsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ **box riêng của chuyên mục** trên <http://dientoantoanhoc.net>.

Biên tập: **Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.**


Bài toán từ bạn đọc

Cho tam giác ABC có trực tâm H và tâm ngoại tiếp O . K là tâm của đường tròn (BOC) . Đối xứng của AK qua BH, CH cắt nhau tại L . Chứng minh rằng $AH = AL$.

Tác giả: Trịnh Huy Vũ

Lời giải

Gọi M, N lần lượt đối xứng của A qua BH, CH . Khi đó, ta được ML, NL lần lượt là đối xứng của đường thẳng AK qua BH, CH . Gọi O_1 đối xứng của O qua đường thẳng BC .



Do $\angle HMA = \angle HAM = \angle HBC$ nên điểm M nằm trên đường tròn (HBC) . Chứng minh tương tự ta được N cũng nằm trên đường tròn (HBC) . Hơn nữa, vì ML, NL lần lượt là đối xứng của đường thẳng AK qua BH, CH nên $\angle LMA = \angle KAC$ và $\angle LNA = \angle KAB$. Từ đó ta được

$$\begin{aligned}\angle MLN &= \angle BAC + \angle LMA + \angle LNA \\ &= \angle BAC + \angle KAC + \angle KAB \\ &= 2\angle BAC\end{aligned}$$

Mặt khác, ta cũng có H là tâm ngoại tiếp của tam giác AMN , vì vậy $\angle MHN = 2\angle BAC$. Vậy $\angle MLN = \angle MHN$. Do đó, L nằm trên đường tròn $(HMN) \equiv (HBC)$. Suy ra $O_1H = O_1L$.

Trong khi đó, ta cũng có một kết quả nổi tiếng: AK và AO_1 là hai đường đẳng giác trong góc $\angle BAC$. Từ đó ta có $\angle EHL = \angle BML = \angle BMA - \angle LMA = \angle BAC - \angle KAC = \angle KAB = \angle O_1AC$. Suy ra

$$\begin{aligned}\angle O_1AH + \angle AHL &= \angle O_1AH + \angle EHL + \angle AHE \\ &= \angle O_1AH + \angle O_1AC + \angle AHE \\ &= \angle HAC + \angle AHE \\ &= 90^\circ\end{aligned}$$


Do đó, $AO_1 \perp HL$. Mà $O_1H = O_1L$ nên AO_1 là trung trực của HL . Từ đó suy ra $AH = AL$.

Nhận xét

Bài toán là một mở rộng của bài toán số 5 trong đề thi ITOT mùa xuân 2017 (Senior A level). Bạn **Trương Mạnh Tuấn** lớp 12 Toán THPT chuyên KHTN cho lời giải tại [đây](#), bạn **Trương Tuấn Nghĩa** lớp 9 Toán trường Hà Nội Amsterdam gửi lời giải qua email.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC có phân giác AD . P, Q là các điểm nằm trong tam giác sao cho $PA = PI$, $\angle PBA = \angle PCA = \angle QBC$ và $DQ \parallel CP$. (K) là đường tròn có tâm thuộc AD và tiếp xúc với đường tròn (BDQ) tại Q . Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Chứng minh rằng đường tròn (K) tiếp xúc với đường tròn (BHC) .



Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Hà Nội.

Mỗi tuần một bài toán


Trần Quang Hùng, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Đề bài

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với trực tâm H . AH cắt (O) tại P khác A . PB , PC lần lượt cắt OC , OB tại Q , R . L đối xứng với trực tâm tam giác PQR qua BC . LA cắt HB , HC tại S , T . Chứng minh rằng CS và BT cắt nhau trên đường tròn (BHC) .

Lời giải



Gọi K là trực tâm tam giác PQR thì K , L đối xứng qua BC . Gọi D là đối xứng của A qua BC . Gọi DK cắt PB , PC lần lượt


tại E , F . Như vậy sử dụng đối xứng trục BC thì T và F đối xứng nhau qua BC , tương tự S và E đối xứng qua BC . Ta sẽ chứng minh FB , EC cắt nhau tại Y thuộc (O) , khi đó sử dụng đối xứng trục BC thì TB và SC cùng đi qua X là đối xứng của Y qua BC , hiển nhiên X nằm trên (HBC) . Do K là trực tâm tam giác PQR và D là trực tâm tam giác PBC nên D , K đều nằm trên trục đẳng phương của đường tròn đường kính BQ và CR . Khi đó tiếp tuyến qua B , C của (O) cắt nhau tại Z thì dễ thấy Z cũng nằm trên trục đẳng phương của đường tròn đường kính BQ và CR , do đó DK đi qua Z . Áp dụng định lý Pascal đảo để suy ra FB , EC cắt nhau tại Y thuộc (O) .

Nhận xét

Bài toán này tác giả tạo ra nó nhờ định lý Pascal và đối xứng trục như trong đáp án trên nhưng có một bạn gửi tới lời giải thuần túy hình học rất thú vị cho tác giả và yêu cầu không ghi tên.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC có P và Q là hai điểm đẳng giác trong tam giác. K là trung điểm PQ . Các điểm D , E , F lần lượt thuộc BC , CA , AB sao cho $KD \parallel QA$, $KE \parallel QB$, $KF \parallel QC$. Gọi N_a , N_b , N_c lần lượt là tâm đường tròn Euler của tam giác PBC , PCA , PAB . Chứng minh rằng KN_a , KN_b , KN_c lần lượt cắt EF , FD , DE theo ba điểm thẳng hàng.



Mọi trao đổi xin gửi về email analgeomatica@gmail.com.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochohsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ **box riêng của chuyên mục** trên <http://dientoantoanhoc.net>.

Biên tập: **Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.**

Bài toán từ bạn đọc


Cho tam giác ABC có phân giác AD có tâm nội tiếp I và trực tâm H . P, Q là các điểm nằm trong tam giác sao cho $PA = PI$, $\angle PBA = \angle PCA = \angle QBC$ và $DQ \parallel CP$. (K) là đường tròn có tâm thuộc AD và tiếp xúc với đường tròn (BDQ) tại Q . Chứng minh rằng đường tròn (K) tiếp xúc với đường tròn (BHC) .

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

Lời giải


Chúng tôi giới thiệu lời giải của tác giả bài toán. Ta phát biểu không chứng minh một bổ đề đơn giản và hệ quả của nó.

Bổ đề. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có tâm nội tiếp I và phân giác AD . Trung trực AI cắt CA, AB lần lượt tại E, F . AD lại cắt (O) tại K . Các đường tròn $(KCE), (KBF)$ lại cắt AI lần lượt tại M, N . Khi đó, EF, BN, CM đồng quy tại một điểm P .



Chứng minh. Nếu gọi (KBD) cắt KF tại Q khác K thì $DQ \parallel CP$. Từ đó, ta có hệ quả sau

Hệ quả. Cho tam giác nội tiếp đường tròn (O) có tâm nội tiếp I và phân giác AD . Trung trực AI cắt AB tại F . AD lại cắt (O) tại K . P, Q là các điểm nằm trong tam giác ABC sao cho $PA = PI$, $\angle PBA = \angle PCA = \angle QBC$, $DQ \parallel CP$. Khi đó, K, Q, F thẳng hàng, tứ giác $BKDQ$ nội tiếp và $KB^2 = KC^2 = KQ \cdot KF$.



Giải bài toán. Gọi trung trực AI cắt AI, AB lần lượt tại M, N và AD lại cắt (O) tại L . Theo hệ quả của bổ đề trên, L, Q, N thẳng hàng, tứ giác $BLDQ$ nội tiếp và $LB^2 = LC^2 = LQ \cdot LN$. Gọi trung trực BC cắt $BC, (O)$ lần lượt tại X, Y (Y khác L), Z đối xứng với L qua BC . Khi đó, Z thuộc (BHC) và $LA \cdot LD = LB^2 = LC^2 = LX \cdot LY = LO \cdot LZ$. Gọi U, V lần lượt là trung điểm CA, AB ; AH cắt BC tại T ; đường tròn (J) bàng tiếp góc A của tam giác ABC tiếp xúc với CA, AB lần lượt tại W, S . Ta có $AN \cdot AW = AN \cdot AS = AM \cdot AJ = \frac{1}{2}AI \cdot AJ = \frac{1}{2}AB \cdot AC = AB \cdot AU = AC \cdot AV = AO \cdot AT$. Qua phép biến hình $f = \mathcal{R}_{AL} \circ I_A^{\frac{1}{2}AB \cdot AC} \circ I_L^{LB^2} : (BDQ) \mapsto AC, (K) \mapsto (J), (BHC) \mapsto (UVT)$. Theo định lý Feuerbach áp dụng cho tam giác ABC , đường tròn Euler (UVT) tiếp xúc với đường tròn (J) bàng tiếp góc A . Do đó, tạo ảnh của của chúng qua f cũng tiếp xúc với nhau hay (K) tiếp xúc với (BHC) . Ta có điều phải chứng minh.

Nhận xét

Đây là một bài toán chứng minh tiếp xúc thú vị ứng dụng của định lý Feuerbach và phép nghịch đảo. Chúng tôi không nhận được lời giải nào từ độc giả.

Bài toán đề nghị

Cho tam giác ABC , (O) , (I) theo thứ tự là đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp. E, F theo thứ tự là tiếp điểm của (I) và AC, AB . M, N là các giao điểm của EF và (O) . P, Q theo thứ tự là giao điểm thứ hai của BI, CI và (O) . S là giao điểm của các tiếp tuyến với (O) tại P và Q . Chứng minh rằng S là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN .

Tác giả: Thầy Nguyễn Minh Hà, THPT chuyên SP, Hà Nội.

Một số bài toán cho đội tuyển

Dành cho đội tuyển THPT chuyên KHTN năm 2017

Bài toán 1

Cho hai đường tròn $(K), (L)$ bán kính bằng nhau. P là điểm bất kỳ. Q, R đối xứng P qua K, L . QA, QB tiếp xúc (K) . RC, RD tiếp xúc (L) . AB giao CD tại E . Chứng minh rằng $EQ = ER$.

Bài toán 2

Cho tam giác ABC , đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F . K là hình chiếu của D lên EF . L là hình chiếu của I lên đường cao từ A . Chứng minh rằng IK và DL cắt nhau trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC .

Bài toán 3

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . AC giao BD tại E . AB giao CD tại F , AD giao BC tại G . OE cắt FG tại K . Tiếp tuyến tại C và D của (O) cắt nhau tại L . Tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau tại M . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác KLM và KFO tiếp xúc nhau.

Bài toán 4

Cho tam giác ABC , đường cao BE, CF cắt nhau tại H . S là trung điểm BC . Đường thẳng qua H vuông góc SH cắt AB, AC tại M, N . Đường thẳng qua A vuông góc SA cắt BE, CF tại P, Q . Chứng minh rằng $MQ = NP$.

Bài toán 5

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . AC giao BD tại E . AD giao BC tại F . Đường tròn đường kính EF cắt (O) tại X, Y . M, N là trung điểm của AB, CD . Chứng minh rằng phân giác của các góc $\angle MXN, \angle MYN$ và MN đồng quy.

Bài toán 6

Cho đường tròn (K) và (L) cắt nhau tại A, B . Đường tròn (N) đi qua B cắt $(K), (L)$ tại C, D khác B sao cho AC, AD tiếp xúc (N) . AC, AD lần lượt cắt $(L), (K)$ tại E, F . Gọi P, Q là tâm ngoại tiếp tam giác BEC, BFD . PQ cắt BC, BD tại M, N . Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN nằm trên AB .

Bài toán 7

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , tâm nội tiếp I . IA, IB, IC lần lượt cắt (O) tại D, E, F khác A, B, C . X, Y, Z thuộc BC, CA, AB sao cho $IX \perp IA, IY \perp IB, IZ \perp IC$. Chứng minh rằng các đường thẳng qua D, E, F lần lượt vuông góc với DX, EY, FZ đồng quy.

Bài toán 8

Cho tam giác ABC , tâm ngoại tiếp O , đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F . AD, BE, CF đồng quy tại G . Gọi X, Y, Z là đối xứng của G qua EF, FD, DE . Chứng minh rằng AX, BY, CZ đồng quy tại một điểm thuộc OI .

Bài toán 9

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . AB giao CD tại E . AD giao BC tại F . Đường tròn đường kính EF cắt (O) tại X, Y . M, N là trung điểm của AC, BD . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác XMN, YMN tiếp xúc với (O) .

Bài toán 10

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . AC giao BD tại E . F nằm trong tứ giác sao cho $\angle FAB + \angle FCB = \angle FBA + \angle FDA = 90^\circ$. Chứng minh rằng E, F, O thẳng hàng.

Bài toán 11

Cho tứ giác $ABCD$ có $AC = BD$ và AC cắt BD tại P . $(K), (L)$ là đường tròn ngoại tiếp tam giác PAB, PCD . BC cắt $(K), (L)$ tại S, T khác B, C . M là trung điểm \widehat{PS} không chứa A của (K) . N là trung điểm \widehat{PT} không chứa D của (L) . Chứng minh rằng $MN \parallel KL$.

Bài toán 12

Cho tam giác ABC với M là trung điểm của AB . AP, BQ là đường cao. Chứng minh rằng AC tiếp xúc đường tròn ngoại tiếp tam giác BMP khi và chỉ khi BC tiếp xúc đường tròn ngoại tiếp tam giác AMQ .

Bài toán 13

Cho đường tròn (O) đường kính AB . Một đường thẳng song song với AB cắt (O) tại C, D sao cho B, C khác phía AD . Đường thẳng song song với AD qua C cắt (O) tại E khác C . BE giao CD tại F . Đường thẳng qua F song song AD cắt AB tại P . Chứng minh rằng PC tiếp xúc (O) .

Bài toán 14

Cho tam giác ABC các điểm D, E thuộc đoạn BC , F, G thuộc đoạn CA , H, I thuộc đoạn AB sao cho $BD = CE, CF = AG, AH = BI$. Gọi M, N, P là trung điểm của GH, DI, EF . Chứng minh rằng AM, BN, CP đồng quy.

Bài toán 15

Cho tam giác ABC trực tâm H và M là trung điểm BC . K là hình chiếu của H lên AM . L là điểm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sao cho AL là đường đối trung của tam giác ABC . Chứng minh rằng $MK = ML$.

Bài toán 16

Cho tam giác ABC , trực tâm H , trung tuyến AM . K là hình chiếu của H lên AM . Chứng minh rằng phân giác $\angle BKC$ và $\angle BAC$ cắt nhau trên BC .

Bài toán 17

Cho $(K), (L)$ cắt nhau tại P, Q . B thuộc (K) và C thuộc (L) sao cho PQ là phân giác $\angle BPC$. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác PBC luôn đi qua một điểm cố định khác P khi B, C di chuyển.

Bài toán 18

Cho tứ giác $ABCD$ có AC giao BD tại E . EX, EY, EZ, ET lần lượt là phân giác của các tam giác EAB, EBC, ECD, EDA . Gọi M, N, P, Q là trung điểm của TX, XY, YZ, ZT . Chứng minh rằng AM, BN, CP, DQ đồng quy.