

Documents autorisés : polycopié du cours, notes de cours et PC, calculatrice. Les corrigés des exercices du polycopié, ainsi que les corrigés des examens antérieurs, ne sont pas autorisés.

**Problème 1.** On pose  $\alpha = \frac{1+\sqrt{-155}}{2}$  et  $A = \mathbb{Z}[\alpha]$ .

- (i) Déterminer des représentants de  $\text{Cl}(-155)$  et ses classes ambiguës.
- (ii) En déduire la structure du groupe  $\text{P}(-155)$ .
- (iii) En utilisant le théorème de Dedekind, déterminer la structure du groupe  $\text{Pic}(A)$ .

On se propose de redémontrer le (iii) sans utiliser le théorème de Dedekind.

- (iv) Montrer que tout idéal non nul de  $A$  est équivalent à un idéal contenant un entier  $N$  avec  $1 \leq N \leq 7$ .
- (v) Montrer que  $\text{Cl}(A)$  est un groupe, et qu'il est engendré par les classes des idéaux premiers de  $A$  contenant 2, 3, 5 ou 7.
- (vi) Montrer qu'il existe exactement deux idéaux premiers de  $A$  contenant 3, à savoir  $T = (3, \alpha)$  et  $T' = (3, \alpha - 1)$ , et que l'on a  $(3) = TT'$ .
- (vii) Montrer que les idéaux  $(2)$  et  $(7)$  sont premiers, et que l'on a  $(5) = C^2$  avec  $C$  l'unique idéal premier de  $A$  contenant 5.
- (viii) Montrer  $(\alpha - 3) = CT^2$  et que  $C$  n'est pas principal.
- (ix) En déduire que  $\text{Cl}(A)$  est engendré par la classe de  $T$ , et conclure.

Si  $K$  est un corps de nombres, on rappelle que  $\Sigma(K)$  désigne l'ensemble de ses plongements. On dira que  $K$  est *totalelement réel* si pour tout  $\sigma$  dans  $\Sigma(K)$  on a  $\sigma(K) \subset \mathbb{R}$ .

**Problème 2.** (Un théorème de Hermite) On fixe un entier  $n \geq 1$ . On se propose de démontrer que pour tout entier  $d$  il n'existe qu'un nombre fini de corps de nombres totalelement réels, de degré  $n$ , et de discriminant  $d$ .

- (i) (Question préliminaire) Soient  $K$  un corps de nombres et  $x \in K$  avec  $\mathbb{Q}(x) \neq K$ . Montrer que pour tout  $\sigma$  dans  $\Sigma(K)$ , il existe  $\tau$  dans  $\Sigma(K) - \{\sigma\}$  vérifiant  $\tau(x) = \sigma(x)$ .

Dans les questions suivantes,  $K$  est un corps de nombres totalelement réel fixé de degré  $n$ , et on pose  $\Sigma(K) = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$  (justifier) et  $d = |\text{disc } K|$ .

- (ii) Montrer qu'il existe un élément  $x \in \mathcal{O}_K$  non nul vérifiant  $|\sigma_1(x)| \leq 2^{n-1}\sqrt{d}$  et  $|\sigma_i(x)| \leq 1/2$  pour tout  $i \neq 1$ .
- (iii) Montrer  $|\sigma_1(x)| \geq 2^{n-1}$ .
- (iv) En déduire  $K = \mathbb{Q}(x)$ .
- (v) Conclure en examinant le polynôme caractéristique de  $x$  dans l'extension  $K/\mathbb{Q}$ .

**Problème 3.** (Un anneau d'entiers non monogène)

Partie I. Soit  $p$  un nombre premier. Pour tout anneau  $A$  on note  $\text{Hom}(A, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$  l'ensemble des morphismes d'anneaux de  $A$  dans  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .

- (i) Montrer que si  $x$  est dans  $\overline{\mathbb{Z}}$ , et si  $R$  est le polynôme minimal de  $x$  sur  $\mathbb{Q}$ , alors  $\text{Hom}(\mathbb{Z}[x], \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$  est en bijection avec l'ensemble des racines dans  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  de la réduction modulo  $p$  de  $R$ .
- (ii) Montrer que si  $K$  est un corps de nombres, et si  $P_1, \dots, P_r$  désignent les idéaux premiers distincts de  $\mathcal{O}_K$  de norme  $p$ , alors  $\text{Hom}(\mathcal{O}_K, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$  a au moins  $r$  éléments.
- (iii) (suite) En déduire que si  $\mathcal{O}_K$  est de la forme  $\mathbb{Z}[x]$  avec  $x$  dans  $\mathcal{O}_K$ , on a  $r \leq p$ .

Partie II. Soient  $\alpha$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}$ ,  $K = \mathbb{Q}(\alpha)$  et  $R$  le polynôme minimal de  $\alpha$  sur  $\mathbb{Q}$ .

- (iv) Montrer que pour tout  $t \in \mathbb{Q}$  on a  $N_{K/\mathbb{Q}}(t - \alpha) = R(t)$ .
- (v) On suppose  $\alpha \neq 1$ . Montrer  $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}} \frac{1}{1-\alpha} = \frac{R'(1)}{R(1)}$ .

Partie III. Soient  $\alpha \in \mathbb{C}$  vérifiant  $\alpha^3 - \alpha - 8 = 0$  et  $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ . On se propose de démontrer que  $\mathcal{O}_K$  n'est pas de la forme  $\mathbb{Z}[x]$  avec  $x \in \mathcal{O}_K$ .

- (vi) Montrer que  $t^3 - t - 8$  est irréductible dans  $\mathbb{Q}[t]$ . En déduire  $[K : \mathbb{Q}]$ .
- (vii) En contemplant l'égalité  $8 = \alpha(\alpha - 1)(\alpha + 1)$ , montrer que tout idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  contenant 2 contient soit  $\alpha$ , soit  $\alpha + 1$  (exclusivement).
- (viii) Montrer que l'idéal principal  $P = (\alpha - 2)\mathcal{O}_K$  est de norme 2.
- (ix) En déduire que  $P$  est l'unique idéal premier de  $\mathcal{O}_K$  contenant 2 et  $\alpha$ .
- (x) On suppose qu'il existe un unique idéal premier  $Q$  de  $\mathcal{O}_K$  contenant 2 et  $\alpha + 1$ . Montrer qu'il existe un entier  $m \geq 1$  vérifiant  $(\alpha - 1)\mathcal{O}_K = Q^m = (\alpha + 1)\mathcal{O}_K$ .  
Indication : on pourra observer  $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha \pm 1) = 8$ .
- (xi) (suite) En déduire que l'élément  $\beta = \frac{1+\alpha}{1-\alpha}$  est dans  $\mathcal{O}_K$ .
- (xii) Montrer  $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}} \beta = -7/2$ .
- (xiii) En déduire qu'il existe au moins 2 idéaux premiers de  $\mathcal{O}_K$  contenant 2 et  $\alpha + 1$ , disons  $Q_1$  et  $Q_2$ .
- (xiv) Montrer  $2\mathcal{O}_K = PQ_1Q_2$  et  $N(Q_1) = N(Q_2) = 2$ .
- (xv) Conclure.

Partie IV. (Bonus)

- (xvi) Montrer  $(\alpha) = P^3$ .
- (xvii) Quitte à échanger les rôles de  $Q_1$  et  $Q_2$ , montrer  $(\alpha + 1)\mathcal{O}_K = Q_1^2Q_2$  et  $(\alpha - 1)\mathcal{O}_K = Q_1Q_2^2$ .
- (xviii) En déduire  $\frac{\alpha(\alpha+1)}{2} \in \mathcal{O}_K$ .
- (xix) Montrer  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}\frac{\alpha(\alpha+1)}{2}$ . (Observer que le discriminant de  $t^3 - t - 8$  est  $-4 \cdot 431$ .)
- (xx) Retrouver que l'anneau  $\mathcal{O}_K/2\mathcal{O}_K$  est isomorphe à l'anneau produit  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ .