

数值代数 2023 秋期末试题

2022 年 12 月 21 日

1. (10 分)

设 B 是 A 的任意子矩阵, 且是方阵, 证明 $\|B\|_p \leq \|A\|_p$. $\|\cdot\|_p$ 表示相应矩阵由对应尺寸向量的 p 范数诱导出的矩阵算子范数, $1 \leq p \leq \infty$.

2. (15 分)

(1) 对于给定的单位向量 x , 构造两个不同的正交矩阵 Q_1, Q_2 使得 $Q_i e_1 = x, i = 1, 2$

(2) 设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 并假定 $\lambda \in \mathbf{C}, u \in \mathbf{C}^n (u \neq 0)$, 且 λ 不是 A 的特征值。

证明: 可选择 $E \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 满足 $\|E\|_F = \frac{\|u\|_2}{\|v\|_2}$ 使得向量 $v = (\lambda I - A)^{-1}u$ 是 $A + E$ 的一个特征向量。

3. (20 分)

(1) 证明矩阵单特征值的左右特征向量不垂直。

(2) 证明对称矩阵不同特征值对应的特征向量互相垂直。

(3) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

考察对 $u_0 = (1, 1, 1, 1)^T$ 应用幂法所得序列的特性, 并给出得到精确到三位有效数字所需的迭代次数。

4. (15 分)

$$T_n = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_2 & \alpha_2 & \beta_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \beta_3 & \alpha_3 & \beta_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{n-1} & \alpha_{n-1} & \beta_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta_n & \alpha_n \end{pmatrix}$$

为实对称不可约三对角阵, 设 $p_i(\lambda)$ 为 $T_n - \lambda I$ 的各阶顺序主子式, $i = 1, 2, \dots, n$.

(a) 证明 $p_i(\lambda), p_{i+1}(\lambda)$ 没有公共根;

(b) 证明 $p_n(\lambda)$ 只有单根。

5. (25 分)

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_2 & \alpha_2 & \beta_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \beta_3 & \alpha_3 & \beta_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{n-1} & \alpha_{n-1} & \beta_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta_n & \alpha_n \end{pmatrix}$$

为非奇异三对角阵, 令 $A=D+L+U$, D 为 A 的对角部分, L 为 A 的下三角部分, U 为 A 的上三角部分。

(1) $B_J = I_n - D^{-1}A$, $B_{GS} = -(L+D)^{-1}U$, $p_{B_J}(\lambda)$, $p_{B_{GS}}(\lambda)$ 分别为 B_J , $B_{GS}B_J$, B_{GS} 的特征多项式证明

$$p_{B_J}(\lambda) = \det(-D^{-1})\det(L + \lambda D + U)$$

$$p_{B_{GS}}(\lambda) = \det(-(L+D)^{-1})\det(\lambda L + \lambda D + U)$$

(2) 证明

$$\det(\lambda^2 L + \lambda^2 D + U) = \lambda^n \det(L + \lambda D + U)$$

(3) 证明

$$\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$$

其中 $\rho(B_{GS})$, $\rho(B_J)$ 分别为 B_{GS} 和 B_J 的谱半径。当两种算法均收敛时, Jacobi 迭代和 G-S 迭代哪种收敛速度更快。并解释原因。

6. (15 分)

给定对称正定矩阵 A , 如果 A 至多有 l 个互不相同的特征值, 则共轭梯度法至多 l 步就可以得到方程组 $Ax = b$ 的精确解。