

Отчёт по лабораторной работе №4

Математическое моделирование

Модель гармонических колебаний. Вариант №27

Выполнил студент: Самсонова Мария Ильинична ,
НФИбд-02-21, 1032216526

Содержание

Цель лабораторной работы №4	4
Теоретическое введение	5
Задачи лабораторной работы №4	7
Задание	8
Выполнение лабораторной работы №4	9
Построение математической модели. Решение с помощью программ	9
Julia	9
Результаты работы кода на Julia	12
OpenModelica	18
Результаты работы кода на OpenModelica	21
Анализ полученных результатов. Сравнение языков.	25
Вывод	26
Список литературы. Библиография	27

Список иллюстраций

1	“Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia”	13
2	“Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia”	14
3	“Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia”	15
4	“Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia”	16
5	“Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia”	17
6	“Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia”	18
7	“Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica”	21
8	“Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica”	22
9	“Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica”	22
10	“Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica”	23
11	“Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica”	23
12	“Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica”	24

Цель лабораторной работы №4

Изучение понятия гармонического осциллятора, построение фазового портрета и нахождение решения уравнения гармонического осциллятора.

Теоретическое введение

- Гармонический осциллятор [1] — система, которая при смещении из положения равновесия испытывает действие возвращающей силы F , пропорциональной смещению x .
- Гармоническое колебание [2] - колебание, в процессе которого величины, характеризующие движение (смещение, скорость, ускорение и др.), изменяются по закону синуса или косинуса (гармоническому закону).

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 = 0$$

где x - переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.), γ - параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), ω_0 - собственная частота колебаний. Это уравнение есть линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка и оно является примером линейной динамической системы.

При отсутствии потерь в системе ($\gamma = 0$) получаем уравнение консервативного

осциллятора энергия колебания которого сохраняется во времени.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Для однозначной разрешимости уравнения второго порядка необходимо задать два начальных условия вида

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \dot{x}(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Уравнение второго порядка можно представить в виде системы двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

Начальные условия для системы примут вид:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Независимые переменные x, y определяют пространство, в котором «движется» решение. Это фазовое пространство системы, поскольку оно двумерно будем называть его фазовой плоскостью.

Значение фазовых координат x, y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

Задачи лабораторной работы №4

1. Изучить понятие гармонического осциллятора
2. Ознакомиться с уравнением свободных колебаний гармонического осциллятора
3. Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнений гармонического осциллятора на языках Julia и OpenModelica для следующих случаев:
 - Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Задание

Вариант 27:

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 9x = 0$;
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 5.5\dot{x} + 4.4x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + \dot{x} + 6x = 2\cos(0.5t)$

На интервале $t \in [0; 37]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = -0.7, y_0 = 0.7$.

Выполнение лабораторной работы

№4

Построение математической модели. Решение с помощью программ

Julia

Код программы для первого случая:

```
#case 1
#  $x'' + 9x = 0$ 
using DifferentialEquations

function lorenz!(du, u, p, t)
    a = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -a*u[1]
end

const x = -0.7
const y = 0.7
u0 = [x, y]
```

```

p = (9)
tspan = (0.0, 37.0)
prob = ODEProblem(lorenz!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)

using Plots; gr()

#решение системы уравнений
plt1 = plot(sol, dpi = 1200, legend= true, bg =:white)
plot!(plt1, title="Решение системы уравнений - 1 случай", titlefont = font(9, "Arial"), legend=:none)
savefig("lab4_julia_1.png")

#фазовый портрет
plt2 = plot(sol, vars=(2,1), dpi = 1200, legend= true, bg =:white)
plot!(plt2, title="Фазовый портрет - 1 случай", titlefont = font(9, "Arial"), legend=:none)
savefig("lab4_julia_1_phase.png")

```

Код программы для второго случая:

```

#case 2
#  $x'' + 5.5x' + 4.4x = 0$ 
using DifferentialEquations

function lorenz!(du, u, p, t)
    a, b = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -a*du[1] - b*u[1]
end

const x = -0.7

```

```

const y = 0.7
u0 = [x, y]

p = (sqrt(5.5), 4.4)
tspan = (0.0, 37.0)
prob = ODEProblem(lorenz!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)

using Plots; gr()

#решение системы уравнений
plt1 = plot(sol, dpi = 1200, legend= true, bg =:white)
plot!(plt1, title="Решение системы уравнений - 1 случай", titlefont = font(9, "Arial"), legend=:none)
savefig("lab4_julia_2.png")

#фазовый портрет
plt2 = plot(sol, vars=(2,1), dpi = 1200, legend= true, bg =:white)
plot!(plt2, title="Фазовый портрет - 1 случай", titlefont = font(9, "Arial"), legend=:none)
savefig("lab4_julia_2_ph.png")

```

Код программы для третьего случая:

```

#case 3
#  $x'' + x' + 6x = 2\cos(0.5t)$ 
using DifferentialEquations

function lorenz!(du, u, p, t)
    a, b = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -a*du[1] - b*u[1] + 2*cos(0.5*t)
end

```

```
end
```

```
const x = -0.7
```

```
const y = 0.7
```

```
u0 = [x, y]
```

```
p = (sqrt(1), 6)
```

```
tspan = (0.0, 37.0)
```

```
prob = ODEProblem(lorenz!, u0, tspan, p)
```

```
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)
```

```
using Plots; gr()
```

```
#решение системы уравнений
```

```
plt1 = plot(sol, dpi = 1200, legend= true, bg =:white)
```

```
plot!(plt1, title="Решение системы уравнений - 1 случай", titlefont = font(9, "Arial"), legend=:none)
```

```
savefig("lab4_julia_3.png")
```

```
#фазовый портрет
```

```
plt2 = plot(sol, vars=(2,1), dpi = 1200, legend= true, bg =:white)
```

```
plot!(plt2, title="Фазовый портрет - 1 случай", titlefont = font(9, "Arial"), legend=:none)
```

```
savefig("lab4_julia_3_phase.png")
```

Результаты работы кода на Julia

Первый случай:

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы




Рис. 1: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia”




Рис. 2: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia”

Второй случай:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы




Рис. 3: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia”




Рис. 4: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia”

Третий случай:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы




Рис. 5: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia”




Рис. 6: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia”

OpenModelica

Код программы для первого случая:

```
//case1:  $x'' + 9x = 0$ 
model lab4_1
// $x'' + g \cdot x' + w^2 \cdot x = f(t)$ 
//w - частота
//g - затухание
parameter Real w = sqrt(9);
parameter Real g = 0;
```

```

parameter Real x0 = -0.7;
parameter Real y0 = 0.7;

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

// f(t)
function f
input Real t ;
output Real res;
algorithm
res := 0;
end f;

equation
der(x) = y;
der(y) = -w*w*x - g*y + f(time);
end lab4_1;

```

Код программы для второго случая:

```

//case2:  $x'' + 5.5x' + 4.4x = 0$ 
model lab4_2

parameter Real w = sqrt(4.4);
parameter Real g = 5.5;

parameter Real x0 = -0.7;
parameter Real y0 = 0.7;

```

```

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

// f(t)
function f
input Real t ;
output Real res;
algorithm
res := 0;
end f;

equation
der(x) = y;
der(y) = -w*w*x - g*y + f(time);

end lab4_2;

```

Код программы для третьего случая:

```

//case3:  $x'' + x' + 6x = 2\cos(0.5t)$ 
model lab4_3

parameter Real w = sqrt(6.0);
parameter Real g = 1;

parameter Real x0 = -0.7;
parameter Real y0 = 0.7;

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

```

```
// f(t)
function f
input Real t ;
output Real res;
algorithm
res := 2*cos(0.5*t); // 3 случай
end f;

equation
der(x) = y;
der(y) = -w*w*x - g*y - f(time);
end lab4_3;
```

Результаты работы кода на OpenModelica

Первый случай:

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы




Рис. 7: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica”




Рис. 8: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica”

Второй случай:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы




Рис. 9: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica”




Рис. 10: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica”

Третий случай:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы




Рис. 11: “Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica”




Рис. 12: “Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica”

Анализ полученных результатов.

Сравнение языков.

В итоге проделанной лабораторной работе №4 мы построили по три модели (включающих в себя два графика) на языках Julia и OpenModelica. Построение моделей колебания на языке OpenModelica занимает меньше строк, чем аналогичное построение на Julia.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №4 мы построили решения уравнения гармонического осциллятора и фазовые портреты гармонических колебаний без затухания, с затуханием и при действиях внешней силы на языках Julia и OpenModelica.

Список литературы. Библиография

- [1] Документация по Julia: <https://docs.julialang.org/en/v1/>
- [2] Документация по OpenModelica: <https://openmodelica.org/>
- [3] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>
- [4] Бутиков И. Е. Собственные колебания линейного осциллятора. 2011.