RENOVATIO21





Epidemie Sanità Vaccini 30 Aprile 2021

Vaccinazioni COVID, il governo britannico segnala 847 morti, 12 lesioni cerebrali, 112 ciechi a seguito delle iniezioni

In Gran Bretagna, secondo i dati ufficiali, le iniezioni di COVID-19 sono state seguite da 847 morti e oltre 626.000 effetti avversi, inclusi oltre 11.000 disturbi psichiatrici, 771 convulsioni e 12 lesioni cerebrali. Lo riporta *Lifesitenews*.

Il governo del Regno Unito ha rilasciato il suo <u>ultimo aggiornamento settimanale</u> sugli effetti avversi e sui decessi in seguito alla somministrazione dei vaccini per il di COVID-19 sviluppati in fretta. Tra l'8 dicembre e il 5 aprile, sono state somministrate 31,6 milioni di prime dosi e 5,4 milioni di seconde dosi.

Nonostante le insistenti affermazioni dei ministri del governo e dei media mainstream sulla sicurezza delle iniezioni, i dati ufficiali presentano un quadro alquanto diverso

Nonostante le insistenti affermazioni dei ministri del governo e dei media mainstream sulla sicurezza delle iniezioni, i dati ufficiali presentano un quadro alguanto diverso.

Entro il 5 aprile, ci sono stati 314 decessi a seguito delle inoculazioni con il vaccino Pfizer, 521 a seguito di AstraZeneca e altri 12 decessi dopo un'iniezione che non è stata identificata come nessuna delle due, per un totale di 847 decessi dopo l'iniezione.

Si sono verificati un totale di 626.087 effetti collaterali avversi, con 132.528 segnalati per Pfizer e 492.105 per AstraZeneca. Questo totale è aumentato di guasi 70.000 dal rapporto della settimana precedente di 556.609 effetti collaterali negativi.

Entro il 5 aprile, ci sono stati 314 decessi a seguito delle inoculazioni con il vaccino Pfizer, 521 a seguito di AstraZeneca e altri 12 decessi dopo un'iniezione che non è stata identificata come nessuna delle due, per un totale di 847 decessi dopo l'iniezione

Dopo la vaccinazione con Pfizer si sono verificati 42 aborti spontanei, mentre dopo la vaccinazione con AstraZeneca si sono verificati 19 aborti spontanei, con altri due nati morti.

La vaccinazione con Pfizer è stata seguita da 38 attacchi di panico, 5 casi di autolesionismo o tentato suicidio e un totale di 2.115 disturbi psichiatrici.

Tuttavia, queste cifre sono minori di quelle a seguito di vaccinazione con AstraZeneca: 152 attacchi di panico, 8 casi di autolesionismo e tentato suicidio, 50 occasioni di "ideazione suicidaria", 2 suicidi e un totale di 9.124 disturbi psichiatrici. Insieme, a seguito delle due iniezioni si sono verificati 11.239 disturbi psichiatrici, un aumento di 1.200 in più rispetto al conteggio della settimana precedente.

626.087 effetti collaterali avversi, con 132.528 segnalati per Pfizer e 492.105 per AstraZeneca. Questo totale è aumentato di quasi 70.000 dal rapporto della settimana precedente di 556.609 effetti collaterali negativi

I disturbi vascolari che si sono verificati dopo le iniezioni sono stati 6.877, con 360 casi di trombosi venosa profonda. Sono state inoltre registrate oltre 7.900 malattie del sangue.

Sono stati 6.552 i disturbi cardiaci registrati a seguito delle iniezioni, con 125 arresti cardiaci, 166 infarti miocardici e 36 casi di insufficienza cardiaca e insufficienza cardiaca congestizia.

Inoltre si sono avuti 8.432 casi di disturbi agli occhi, con 112 persone diventate cieche e 10 persone che soffrivano di cecità temporanea.

Finora si sono verificati 119 casi di sindrome di Guillain-Barré (GBS), 472 ictus e 559 casi di "paralisi facciale". Sono stati segnalati altri 13 casi di malattia di Parkinson, 771 convulsioni e 12 lesioni cerebrali. Si sono verificati oltre 131.000 disturbi del sistema nervoso, di cui 99 fatali.

Dopo le vaccinazioni sono state segnalate 12.892 infezioni, di cui 2 del virus Epstein-Barr, e oltre 600 casi di COVID-19.

Dopo la vaccinazione con Pfizer si sono verificati 42 aborti spontanei, mentre dopo la vaccinazione con AstraZeneca si sono verificati 19 aborti spontanei, con altri due nati morti

Oltre 4.100 "lesioni" si sono verificate dopo le iniezioni e 2.224 disturbi del sistema immunitario, con 84 casi di shock anafilattico e 646 reazioni anafilattiche.


L'iniezione con AstraZeneca è stata seguita anche da 4 casi di fibrosi cistica e 4 di paralisi cerebrale.

Le statistiche arrivano mentre il Regno Unito continua a utilizzare il siero prodotto da AstraZeneca, nonostante numerosi paesi ne sospendano l'uso a causa delle preoccupazioni su una connessione tra l'iniezione sperimentale e coaguli di sangue.

Sono stati registrati più di 2.200 disturbi riproduttivi e mammari, insieme a guasi 20.000 disturbi respiratori, inclusi 15 casi di edema polmonare e 456 casi di embolia polmonare. Sono stati necessari oltre 450 interventi chirurgici dopo la vaccinazione.

Sono stati infine segnalati altri 20 decessi in seguito all'inoculazione con Johnson & Johnson, che hanno portato ad un totale di 7.212 decessi segnalati alle autorità europee dopo le vaccinazioni per COVID-19.

Articoli correlati



Epidemie Vaccini 20 Dicembre 2020

In Europa arriva la mutazione di SARS-CoV-2. I vaccini la copriranno?



Spirito Vaccini 24 Febbraio 2021

Il papa richiede ai giornalisti nel suo viaggio in Iraq di fare il vaccino



Epidemie Scienza Vaccini 23 Luglio 2020

Vaccino mRNA contro il COVID: un ricercatore reagisce