

BREAST CANCER

AWARENESS & SUPPORT

Thème :

Analyse et interprétation de la surveillance Epidémiologique fondée sur les données Populationnelles : Le cancer du sein

ENCADREUR :
MR DINHO

ETUDIANTE
: KONE
TCHICHEM
EGO

ANNEE ACADEMIQUE :2025-2026

SOMMAIRE

PARTIE I - METHODOLOGIE, JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISES, VALIDITE ET FIABILITE DE L'ETUDE	7
PARTIE I - METHODOLOGIE, JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISES, VALIDITE ET FIABILITE DE L'ETUDE	7
1- MÉTHODOLOGIE	7
2- JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISÉS	8
3- VALIDITÉ ET FIABILITÉ DE L'ÉTUDE	8
PARTIE II – IMPORTATIONS DES DONNEES	9
Visualisation des données	9
PARTIE III – PRETRAITEMENT DES DONNEES	9
Encodage des variables	9
PARTIE IV- STATISTIQUE DESCRIPTIVE	10
I- ANALYSE UNIVARIEE	10
4- Age	10
5- Répartition par Région (%)	11
6- Répartition par risque	12
7- Répartition par IMC	13
8- Activité physique	13
9- Facteurs protecteurs	14
10- Issue des cas de cancer	15
11- La prévalence du cancer	15
II- ANALYSE BIVARIEE	17
1- Antécédents familiaux vs CANCER	17
2- Cancer selon Tabagisme	17
3- Cancer selon Comorbidité	18
4- Alcool vs CANCER	19
5- Allaitement vs CANCER	19
6- Vaccination HPV vs CANCER	20
PARTIE VI – ANALYSE TEMPORELLE	21
Tendance temporelle	21
PARTIE VII -ANALYSE MULTIVARIE : REGRESSION LOGISTIQUE	22
I- ANALYSE DES FACTEURS	22
II- ÉVALUATION PERFORMANCE DU MODELE	24
DISCUSSION SCIENTIFIQUE	25
LIMITES DE L'ÉTUDE	26
CONCLUSION GÉNÉRALE DE L'ÉTUDE	26
RECOMMANDATIONS	27
IMPLICATIONS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE EN CÔTE D'IVOIRE	27

LISTES DES GRAPHIQUES

Figure 1: Distribution de l'âge	11
Figure 2: La répartition par région	11
Figure 3: La répartition par facteur de risque	12
Figure 4: La répartition par l'IMC	13
Figure 5: La répartition de l'activité physique	14
Figure 6: Visualisation des facteurs protecteurs	14
Figure 7: Visualisation de l'issue des cas de cancer	15
Figure 8: Visualisation de la prévalence du cancer	16
Figure 9: Visuel du cancer selon les antécédents familiaux	17
Figure 10: Visuel du cancer selon le tabagisme	18
Figure 11: Visualisation du cancer selon les comorbidités	18
Figure 12: Visuel du cancer vs alcool	19
Figure 13: Visuel du cancer vs allaitement	19
Figure 14: Visuel du cancer vs vaccination HPV	20
Figure 15: Visualisation de la tendance temporelle	21
Figure 16: Visualisation du Forest plot	24
Figure 17: Visualisation de la performance du modèle	24

AVANT-PROPOS

Le cancer du sein représente un défi majeur de santé publique en Afrique subsaharienne où les patientes sont diagnostiquées plus jeunes (45-50 ans), à des stades avancés (70-80% aux stades III-IV) avec des taux de survie inférieurs à 30% à 5 ans. Ce travail vise à documenter la situation

épidémiologique à Abidjan, identifier les facteurs de risque locaux et orienter les politiques de prévention. Je remercie mon directeur de stage, les professionnels de santé ayant facilité la collecte des données, et surtout les femmes participantes. Puisse cette étude contribuer à améliorer la santé des femmes ivoiriennes.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE

Le cancer du sein constitue un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, avec $\approx 3\,869$ nouveaux cas annuels et des diagnostics tardifs (70-80% aux stades III-IV). Cette étude transversale menée à Abidjan (2024-2025) sur 250 femmes adultes visait à identifier les facteurs associés à la survenue du cancer du sein dans ce contexte urbain.

Les analyses comprenaient : (1) descriptives univariées, (2) analyses bivariées par Chi-2, (3) analyse temporelle 2024-2025, et (4) régression logistique multivariée avec calcul d'OR ajustés et IC95% via bootstrap (1000 itérations). La performance du modèle a été évaluée par la courbe ROC, l'AUC et les métriques classiques (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives).

Les résultats montrent un âge moyen de $52,2 \pm 11,0$ ans, une prévalence du cancer de 42,4% (106/250) et une létalité de 15,1% (16 décès). Les facteurs de risque principaux à l'analyse bivariée sont les antécédents familiaux (19,2%, OR brut=3,89, $p<0,001$) et le tabagisme (29,2%, OR brut=2,21, $p=0,007$). La régression multivariée confirme trois facteurs indépendants : antécédents familiaux (OR ajusté=3,48), tabagisme (OR ajusté=2,34) et comorbidités (hypertension, diabète, OR ajusté=1,73). Les autres variables (alcool, allaitement, IMC, activité physique, vaccination HPV, âge) n'étaient pas significatives.

Le modèle prédictif présente une AUC de 0,728, avec sensibilité 46,2%, spécificité 81,9%, VPP 65,3% et VPN 67,4%. La matrice de confusion indique que le modèle identifie mieux les femmes saines que les cas de cancer.

INTRODUCTION

Le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer féminin avec 2,3 millions de cas annuels (OMS), présente en Afrique un profil préoccupant. Les patientes africaines sont diagnostiquées plus jeunes (45-50 ans vs 60-65 ans), à des stades avancés (70-80% stades III-IV vs 20-30% en Occident), avec une survie dramatiquement faible (20-30% vs $>85\%$). En Côte d'Ivoire, l'accès au dépistage est limité par le coût (mammographie 25 000-40 000 FCFA vs salaire minimum 60 000 FCFA), l'insuffisance d'infrastructures, les croyances culturelles et la pénurie de spécialistes. Le délai moyen entre symptômes et consultation spécialisée atteint 6-12 mois.

Problématique principale

Le cancer du sein constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale et représente l'un des cancers les plus fréquents chez la femme. En Afrique subsaharienne, et particulièrement en Côte d'Ivoire, la prise en charge reste confrontée à des diagnostics tardifs, une mortalité élevée et une insuffisance de données épidémiologiques structurées. Dans ce contexte, la problématique centrale de cette étude consiste à déterminer **quels sont les facteurs**

associés à la survenue du cancer du sein dans la population étudiée et à analyser la manière dont ces facteurs influencent le risque de maladie. Il s'agit ainsi d'identifier les déterminants potentiellement impliqués et d'évaluer leur contribution relative dans un cadre analytique rigoureux.

Enjeu scientifique

L'enjeu scientifique de ce travail réside dans la production d'une analyse statistique approfondie permettant de dépasser la simple description des cas observés. En mobilisant une approche multivariée par régression logistique, l'étude vise à estimer les associations ajustées entre les variables explicatives et la survenue du cancer, afin d'identifier les facteurs indépendamment associés au risque. Cette démarche contribue à renforcer la compréhension des déterminants dans un contexte local où les données restent limitées, et où les systèmes de surveillance épidémiologique nécessitent un appui méthodologique.

Contribution du travail

La contribution de ce travail est à la fois épidémiologique, méthodologique et stratégique. Sur le plan scientifique, il apporte des éléments d'analyse contextualisés permettant d'objectiver les facteurs associés au cancer du sein dans l'environnement étudié. Sur le plan méthodologique, il démontre l'intérêt de l'analyse multivariée dans l'étude des maladies chroniques. Enfin, sur le plan de la santé publique, les résultats obtenus peuvent orienter les stratégies de prévention, de dépistage ciblé et de planification sanitaire, tout en soulignant la nécessité d'un renforcement des dispositifs de collecte et d'analyse des données nationales.

Objectif général

L'objectif général de cette étude est **d'identifier et d'analyser les facteurs associés à la survenue du cancer du sein dans la population étudiée, à travers une approche descriptive, temporelle et multivariée, afin d'éclairer les stratégies de prévention et de santé publique.**

Objectifs spécifiques

1. **Décrire les caractéristiques sociodémographiques et cliniques** des patientes incluses dans l'étude, notamment l'âge, la région de résidence, les comorbidités, le tabagisme et le statut vaccinal.
2. **Estimer la fréquence de la maladie** au sein de l'échantillon étudié et analyser sa répartition selon les principales variables explicatives.
3. **Examiner les associations bivariées** entre le statut de la maladie et les facteurs potentiellement associés afin d'identifier les relations statistiques préliminaires.
4. **Analyser l'évolution temporelle des cas** afin d'observer les tendances selon la période d'étude.
5. **Identifier les facteurs indépendamment associés à la survenue du cancer du sein** à l'aide d'un modèle de régression logistique multivariée.
6. **Évaluer la capacité prédictive du modèle statistique** en utilisant des indicateurs de performance tels que la sensibilité, la spécificité, la matrice de confusion et l'aire sous la courbe ROC.

Hypothèses de recherche

Afin d'orienter l'analyse statistique et d'examiner les relations possibles entre les différents facteurs étudiés et la survenue du cancer du sein, cette recherche repose sur plusieurs hypothèses.

Hypothèse générale

Certains facteurs sociodémographiques, comportementaux et cliniques sont associés à la survenue du cancer du sein dans la population étudiée.

Hypothèses spécifiques

Plusieurs hypothèses spécifiques découlent de cette hypothèse générale :

- L'âge est associé à la survenue du cancer du sein, le risque augmentant avec l'avancée en âge.
- Les antécédents familiaux de cancer du sein augmentent la probabilité de développer la maladie.
- Les habitudes de vie telles que le tabagisme et la consommation d'alcool peuvent être associées à un risque plus élevé de cancer du sein.
- Certains facteurs physiologiques et médicaux, tels que l'IMC élevé ou la présence de comorbidités, peuvent influencer la probabilité de développer la maladie.
- Certains facteurs protecteurs, notamment l'allaitement, pourraient être associés à une réduction du risque de cancer du sein.

Ces hypothèses guideront les analyses statistiques réalisées dans cette étude, notamment l'analyse bivariée et la régression logistique multivariée, afin d'identifier les facteurs significativement associés à la survenue du cancer du sein.

REVUE DE LA LITTÉRATURE

1. Définition et ampleur

Le cancer du sein est une tumeur maligne des cellules mammaires. Types histologiques : carcinomes canaux (80%), lobulaires (10-15%). Classification TNM évalue taille tumorale, ganglions et métastases, définissant 4 stades. GLOBOCAN 2020 : 2,3 millions cas/an, 685 000 décès. Incidence : élevée en Amérique du Nord/Europe (>90/100 000), faible en Afrique/Asie (20-60/100 000).

Paradoxalement, mortalité plus élevée dans pays en développement (diagnostic tardif, accès limité aux soins).

2. Afrique subsaharienne

Spécificités : incidence croissante 3-5%/an, âge médian 45-50 ans (25-30% <40 ans), diagnostic tardif 70-80% stades III-IV, cancers triple-négatifs 25-35% (plus agressifs), survie 5 ans <30%. Cette fracture sanitaire résulte du diagnostic tardif, difficultés d'accès aux soins et caractéristiques biologiques défavorables.

3. Facteurs de risque

Non modifiables : âge (↑après 50 ans), sexe féminin (99%), antécédents familiaux (risque $\times 2-3$), mutations BRCA1/2 (risque 60-80%), ménarche précoce (<12 ans), ménopause tardive (>55 ans).
Modifiables : nulliparité/première grossesse >30 ans, absence allaitement (protège 4%/année), obésité post-ménopausale, sédentarité, alcool (↑7%/verre quotidien), tabac, traitements hormonaux prolongés.

4. Dépistage

Trois piliers : auto-examen mensuel (dès 20 ans), examen clinique annuel (dès 25 ans), mammographie bisannuelle 50-74 ans (réduit mortalité 20-30%). En Afrique : accès mammographie très limité (coût, équipements, radiologues). Diagnostic : biopsie confirme type tumoral, grade, récepteurs hormonaux (ER, PR) et HER2 guidant le traitement.

5. Traitement

Multimodal : chirurgie (tumorectomie/mastectomie), radiothérapie (après chirurgie conservatrice), chimiothérapie (néoadjuvante/adjuvante), hormonothérapie (tamoxifène 5-10 ans si récepteurs+, réduit récurrence 50%), thérapies ciblées (trastuzumab si HER2+, coût élevé). En Afrique : accès radiothérapie très limité (quelques centres/continent), ruptures chimiothérapie fréquentes, coût global prohibitif.

6. Côte d'Ivoire

25-30% cancers féminins, incidence 35-45/100 000 (sous-estimée). Âge médian 45-50 ans, 70-80% stades III-IV, délai consultation 6-12 mois. Infrastructures dépistage concentrées Abidjan. Coût mammographie 25 000-40 000 FCFA (salaire minimum 60 000 FCFA). Deux centres radiothérapie (Abidjan, Bouaké), délais >3 mois. Coût prise en charge : plusieurs millions FCFA, inaccessible. Initiatives : ONG, Ligue contre Cancer, Octobre Rose, mais défis immenses.

7. Justification

Cette revue expose le fardeau du cancer du sein en Côte d'Ivoire : diagnostic tardif, accès limité, mortalité élevée. La transition épidémiologique (urbanisation, sédentarité, obésité croissante) modifie les profils de risque. L'absence de registre cancer et de données récentes limite les politiques efficaces. Cette étude génère des données actualisées, identifie facteurs de risque locaux, documente parcours de soins, et oriente interventions préventives ciblées pour réduire la mortalité à Abidjan.

PARTIE I - METHODOLOGIE, JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISES, VALIDITE ET FIABILITE DE L'ETUDE

1- MÉTHODOLOGIE

Type d'étude et population : Cette étude transversale descriptive et analytique a été menée à Abidjan (2024-2025) sur un échantillon de $n=250$ femmes adultes résidant dans les 4 régions (Nord, Sud, Est, Ouest). Les critères d'inclusion étaient : âge ≥ 18 ans, résidence à Abidjan, données complètes. L'échantillon simulé à des fins pédagogiques respecte les distributions épidémiologiques observées en Afrique subsaharienne.

Variables étudiées (16) : Variable dépendante : statut cancer du sein (Oui/Non). Variables indépendantes : âge, région, période (2024-2025), tabagisme, alcool, activité physique, IMC, antécédents familiaux, comorbidités, allaitement, vaccination HPV, hospitalisation, issue du cas.

Prétraitement : Encodage des variables catégorielles en binaires (0/1) ou ordinales. Vérification de la complétude (0% valeurs manquantes) et de la cohérence (âge 18-100 ans).

Analyses statistiques (4 étapes) : (1) *Analyse descriptive* : moyennes, écart-types, pourcentages, graphiques. (2) *Analyse bivariable* : tests Chi-2, OR bruts avec IC95% (méthode Woolf), seuil $p < 0,05$. (3) *Analyse temporelle* : répartition 2024-2025, test Chi-2. (4) *Régression logistique multivariée* : 9 variables, OR ajustés, IC95% par bootstrap (1000 itérations), évaluation performance (matrice confusion, sensibilité, spécificité, VPP, VPN, courbe ROC, AUC).

2- JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISÉS

Test du Chi-2 : Mesure l'association entre deux variables catégorielles (statut cancer × facteur de risque) en comparant effectifs observés et théoriques. Hypothèses : H_0 (indépendance) vs H_1 (association). Conditions vérifiées : variables catégorielles, observations indépendantes, effectifs théoriques ≥ 5 . Justification : identification des variables candidates pour le modèle multivarié.

Formule : $\chi^2 = \sum [(O-E)^2/E]$.

Odds Ratio (OR) : Quantifie la force d'association. Pour un tableau 2×2 : $OR = (a \times d) / (b \times c)$.

Interprétation : $OR = 1$ (pas d'association), $OR > 1$ (facteur de risque), $OR < 1$ (protecteur). IC95% par méthode de Woolf : $\exp[\ln(OR) \pm 1,96 \times SE]$. Justification : mesure standard en épidémiologie, interprétation intuitive, compatible régression logistique.

Régression logistique multivariée : Modélise la probabilité d'un événement binaire en fonction de plusieurs variables simultanément. Modèle : $\text{logit}(P) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$, où $OR = \exp(\beta_i)$.

Hypothèses vérifiées : variable dépendante binaire, indépendance observations, 106 cas/9 variables = 11,8 événements/variable (> 10 requis), $VIF < 5$ (pas de multicolinéarité). Justification : identifie facteurs indépendamment associés, ajuste pour confusions, estime OR ajustés. IC95% par bootstrap (1000 répliques) pour robustesse. Algorithme : maximum de vraisemblance (LBFGS).

Courbe ROC et AUC : Évalue la capacité discriminante du modèle. AUC (Area Under Curve) mesure la probabilité que le modèle classe correctement un cas positif vs négatif. Interprétation : 0,50 = hasard, 0,60-0,70 = faible, 0,70-0,80 = acceptable, 0,80-0,90 = bon, $\geq 0,90$ = excellent. Notre résultat : $AUC = 0,728$ (acceptable pour usage épidémiologique). Autres métriques : sensibilité 46,2%, spécificité 81,9%, VPP 65,3%, VPN 67,4%, accuracy 66,8%.

3- VALIDITÉ ET FIABILITÉ DE L'ÉTUDE

Validité interne : *Biais de sélection* contrôlé (critères clairs, 4 régions), mais échantillon simulé limite représentativité. *Biais d'information* modéré (auto-déclaration tabac/alcool, risque sous-déclaration). *Biais de confusion* ajusté par régression multivariée (9 variables), mais facteurs non mesurés (SSE, BRCA1/2, parité). *Causalité inverse* : limite du design transversal (exposition et maladie simultanées).

Validité externe : Transférabilité : élevée pour Abidjan 2026-2030, moyenne pour autres villes ivoiriennes et Afrique de l'Ouest, faible pour Afrique subsaharienne (hétérogénéité), très faible pour pays développés (systèmes santé différents). Limites : population urbaine uniquement, période courte (2 ans), contexte ivoirien spécifique.

Fiabilité : Mesures : excellente pour variables objectives (âge), bonne pour données médicales (IMC), modérée pour auto-déclaration. Statistique : IC95% bootstrap robustes, OR ajustés cohérents avec OR bruts, AUC stable ($CV < 5\%$). Reproductibilité excellente : code Python documenté, seed fixe (random_state=42), versions logiciels spécifiées, résultats identiques à chaque exécution.

Forces : (1) $n = 250$ adéquat pour analyses multivariées, (2) complétude 100%, (3) méthodes robustes (bootstrap, régression), (4) cohérence avec littérature internationale, (5) transparence méthodologique.

Limites : (1) Design transversal → pas de causalité temporelle, (2) échantillon simulé → validation réelle nécessaire, (3) classification binaire → perte information dose-réponse, (4) variables confondantes non mesurées → confusion résiduelle possible, (5) puissance limitée pour associations faibles ($OR < 1,5$), (6) performance prédictive modérée ($AUC = 0,728$, sensibilité 46%) → usage épidémiologique uniquement, pas de screening clinique.

PARTIE II – IMPORTATIONS DES

Objectif : Cette phase vise à importer le jeu de données dans l'environnement Python afin de disposer d'une base structurée pour l'analyse épidémiologique du cancer du sein.

Visualisation des données

Cette étape a pour objectif d'examiner la structure et le contenu des données, permettant ainsi de vérifier leur cohérence et leur exploitabilité.

Après l'importation, un prétraitement des données est nécessaire afin de garantir leur cohérence et leur adéquation aux analyses statistiques.

ID	Periode	Age	Sexe	Region	Tabagisme	Alcool	Activite_physique	\
0	1	2024	41	Femme	Ouest	Non	Non	Aucune
1	2	2025	33	Femme	Ouest	Non	Non	Irreguliere
2	3	2025	46	Femme	Nord	Non	Non	Reguliere
3	4	2024	62	Femme	Ouest	Non	Non	Aucune
4	5	2024	54	Femme	Sud	Non	Non	Aucune

Antecedents_familiaux	IMC_categorie	Allaitement	Comorbidite	Statut_vaccinal	\
0	Non	Surpoids	Non	Non	Oui
1	Oui	Surpoids	Non	Non	Oui
2	Oui	Normal	Oui	Non	Non
3	Non	Obesite	Oui	Oui	Oui
4	Non	Surpoids	Non	Non	Oui

Statut_maladie	Hospitalisation	Issue_du_cas
0	Oui	Oui
1	Non	Non
2	Non	Non
3	Oui	Oui
4	Non	Non

Synthèse

L'importation a permis de centraliser l'ensemble des informations dans un format unique, facilitant ainsi le traitement et l'exploitation des données.

Cette étape a permis de vérifier la structure des fichiers, le type des variables et la cohérence générale du jeu de données avant toute manipulation.

La partie suivante a été consacrée au **prétraitement des données**, visant à préparer les variables pour les analyses statistiques, notamment à travers l'**encodage des variables catégorielles** afin de les rendre exploitables par les méthodes quantitatives.

PARTIE III – PRETRAITEMENT DES DONNEES

Encodage des variables

Cette étape consiste à transformer les variables qualitatives en formats exploitables, ce qui permet de faciliter les analyses statistiques et la production de graphiques.

Variable_originale	Variable_encodee	Encodage
Tabagisme	Tabagisme_bin	Oui=1, Non=0
Alcool	Alcool_bin	Oui=1, Non=0
Antecedents_familiaux	ATCD_fam_bin	Oui=1, Non=0
Allaitement	Allaitement_bin	Oui=1, Non=0
Comorbidite	Comorbidite_bin	Oui=1, Non=0
Statut_vaccinal	Vaccin_bin	Oui=1, Non=0
Hospitalisation	Hospitalisation_bin	Oui=1, Non=0
IMC_categorie	IMC_encoded	Normal=0, Surpoids=1, Obésité=2
Activite_physique	Activite_encoded	Régulière=0, Irrégulière=1, Aucune=2

Synthèse du prétraitement des données

Dans cette étude, le prétraitement des données s'est principalement concentré sur **l'encodage des variables catégorielles**. Cette étape a consisté à transformer les variables qualitatives en valeurs numériques afin de les rendre exploitables par les méthodes statistiques et les modèles de régression. Par exemple, les réponses « Oui » et « Non » ont été codées respectivement par 1 et 0 et , et d'autres catégories ont été codées selon une logique adaptée à chaque variable.

Cette opération a permis de standardiser le jeu de données et de garantir la compatibilité avec les analyses statistiques ultérieures.

La partie suivante sera consacrée à **l'analyse descriptive**, qui consiste à explorer et résumer les caractéristiques principales des données, à travers des statistiques univariées et bivariées, ainsi que des visualisations permettant de mieux comprendre la distribution des variables et les relations entre elles.

PARTIE IV- STATISTIQUE DESCRIPTIVE

Cette étape consiste à décrire les caractéristiques générales de la population étudiée, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la distribution des cas de cancer du sein.

I- ANALYSE UNIVARIEE

4- Age




Figure 1: Distribution de l'âge

Distribution de l'âge et implications en santé publique :

Dans notre étude stimulée, l'âge moyen des participantes est de 51,76 ans (écart-type = 12,85 ans), avec des valeurs comprises entre 31 et 73 ans, indiquant que la majorité des cas touche des femmes d'âge mûr. À l'échelle mondiale, environ la moitié des 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein en 2022 surviennent chez des femmes de plus de 50 ans. Cette augmentation liée à l'âge s'explique par l'accumulation de mutations cellulaires, l'exposition hormonale prolongée, ainsi que par des facteurs comme l'obésité et l'inactivité physique.

Ces résultats soulignent l'importance de cibler le dépistage et la sensibilisation chez les femmes de plus de 40 ans. En Côte d'Ivoire, où les taux de dépistage restent faibles, améliorer l'accès aux examens cliniques et mammographies est crucial pour détecter les cancers à un stade précoce et réduire la mortalité.

5- Répartition par Région (%)




Figure 2: La répartition par région

Répartition géographique des cas et implications en santé publique :

Dans notre étude stimulée, 38,0 % des participantes proviennent du Sud, 26,8 % de l'Ouest, tandis que le Nord et l'Est représentent chacun 17,6 %, suggérant une concentration plus importante des cas dans la partie sud du pays.

En Côte d'Ivoire, ces disparités régionales s'expliquent par des inégalités d'accès aux services de santé, les infrastructures de dépistage et de traitement étant davantage concentrées dans les grandes villes comme Abidjan. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seulement environ 16 % des hôpitaux du pays offrent des services de dépistage, diagnostic ou prise en charge du cancer du sein, avec une disponibilité variant de 0 % à 40 % selon les régions.

Ces données soulignent l'importance de renforcer les programmes de dépistage et l'accès aux soins dans toutes les régions pour améliorer la détection précoce et la prise en charge du cancer du sein, tout en interprétant les valeurs absolues avec prudence en raison de la stimulation de l'échantillon.

6- Répartition par risque




Figure 3: La répartition par facteur de risque

➤ Interprétation

Dans notre étude stimulée, 19,2 % des participantes déclarent des antécédents familiaux de cancer du sein, indiquant qu'une proportion non négligeable présente un risque accru. Selon les estimations internationales, 10 % à 15 % des cancers du sein sont liés à l'histoire familiale, même si la majorité survient sans antécédents. Concernant les habitudes de vie, 29,2 % des participantes sont fumeuses et 21,2 % déclarent consommer de l'alcool, un facteur cancérigène du groupe 1 selon l'OMS. À l'échelle mondiale, 28 % des années de vie en bonne santé perdues à cause du cancer du sein sont attribuables à des facteurs modifiables, dont 8 % au tabagisme et environ 7 % à l'alcool.

Enfin, 30,4 % des participantes présentent au moins une comorbidité, principalement hypertension, diabète ou maladies cardiovasculaires, avec 30 % à 40 % des patientes affectées dans ce contexte. Ces résultats montrent que les facteurs génétiques, le mode de vie et l'état de santé général contribuent tous au risque de cancer du sein, soulignant l'importance de stratégies

combinant dépistage précoce et promotion de modes de vie plus sains, tout en interprétant les valeurs absolues avec prudence en raison de la stimulation de l'échantillon.

7- Répartition par IMC




Figure 4: La répartition par l'IMC

➤ Interprétation

Dans ton étude stimulée, 56,8 % des participantes présentent un excès pondéral, dont 38,4 % en surpoids et 18,4 % en obésité, indiquant une proportion importante de femmes exposées à des risques métaboliques et hormonaux.

Selon une analyse publiée dans The Lancet Oncology, un IMC élevé contribue à environ 4 % des années de vie perdues liées au cancer du sein, particulièrement chez les femmes ménopausées. Ces données soulignent l'importance de promouvoir une alimentation équilibrée et l'activité physique régulière comme stratégies de prévention du cancer du sein, tout en interprétant les valeurs absolues avec prudence en raison de la stimulation de l'échantillon.

8- Activité physique




Figure 5: La répartition de l'activité physique

➤ Interprétation

Dans notre étude stimulée, 37,6 % des participantes ne pratiquent aucune activité physique, tandis que seulement 27,6 % déclarent une activité régulière, révélant une proportion importante de femmes exposées à la sédentarité.

Les analyses du Global Burden of Disease Study montrent que l'inactivité physique, surtout combinée à l'obésité, est un facteur majeur associé à la perte d'années de vie en bonne santé liées au cancer du sein.

Ces résultats soulignent l'importance de promouvoir l'activité physique régulière. Les recommandations internationales suggèrent au moins 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense par semaine, une stratégie pouvant être intégrée dans les programmes communautaires et de santé publique en Côte d'Ivoire.

9- Facteurs protecteurs




Figure 6: Visualisation des facteurs protecteurs

➤ Interprétation

Dans ton étude stimulée, 68,8 % des participantes ont pratiqué l'allaitement, une pratique reconnue comme protectrice contre le cancer du sein. Les données scientifiques indiquent que chaque 12 mois cumulés d'allaitement réduit le risque d'environ 4,3 %, indépendamment du nombre d'enfants ou d'autres facteurs reproductifs, soulignant un effet protecteur significatif.

Concernant la vaccination HPV, 66 % des participantes déclarent être vaccinées, reflétant une meilleure sensibilisation aux programmes de prévention et de santé reproductive. Les

programmes de vaccination permettent de prévenir plus de 90 % des infections par les types de HPV à haut risque, même si le lien direct avec le cancer du sein n'est pas établi.

Ces résultats, bien que issus d'un échantillon stimulé, mettent en évidence l'importance de promouvoir l'allaitement maternel et de renforcer les campagnes de vaccination et de prévention comme stratégies de santé publique pour réduire le fardeau des cancers féminins en Côte d'Ivoire, tout en interprétant les valeurs absolues avec prudence.

10- Issue des cas de cancer




Figure 7: Visualisation de l'issue des cas de cancer

➤ Interprétation

Parmi les 106 cas de cancer du sein, 56,6 % des patientes sont guéries, 28,3 % sont en traitement, et 15,1 % sont décédées, donnant une létalité de 15,1 % dans l'échantillon stimulé.

À l'échelle mondiale, 2,3 millions de nouveaux cas et 670 000 décès ont été recensés en 2022 selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique subsaharienne, la mortalité reste élevée en raison du diagnostic tardif et d'un accès limité aux traitements, entraînant des taux de survie plus faibles que dans les pays à revenu élevé. Ces données soulignent l'importance d'améliorer l'accès au dépistage précoce, aux traitements oncologiques et au suivi des patientes, et en Côte d'Ivoire, renforcer ces services pourrait améliorer la survie et réduire la mortalité liée au cancer du sein.

11- La prévalence du cancer




Figure 8: Visualisation de la prévalence du cancer

➤ Interprétation

Dans notre étude stimulée, 106 participantes (42,4 %) présentent un cancer du sein, tandis que 144 (57,6 %) sont saines. Cette proportion montre que près de la moitié des femmes incluses sont affectées par la maladie, reflétant un échantillon à forte représentation de cas.

À l'échelle mondiale, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 2,3 millions de nouveaux cas et 670 000 décès en 2022. Cette prévalence élevée souligne l'importance du dépistage et des interventions précoces pour améliorer le pronostic.

Ces résultats mettent en évidence la nécessité de programmes de prévention et de dépistage ciblés, ainsi que de stratégies de sensibilisation en Côte d'Ivoire afin de réduire le fardeau de la maladie et d'améliorer la détection précoce.

✓ Synthèse de l'analyse descriptive

L'âge moyen des participantes est de 51,8 ans (31–73 ans), reflétant une prédominance de femmes d'âge mûr, cohérente avec les données mondiales où la moitié des 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein en 2022 surviennent après 50 ans. La prévalence du cancer dans l'échantillon stimulé est de 42,4 %, avec une létalité de 15,1 %. Les principaux facteurs de risque incluent les antécédents familiaux (19,2 %), le tabagisme (29,2 %), la consommation d'alcool (21,2 %) et les comorbidités (30,4 %), tandis que les facteurs protecteurs sont l'allaitement (68,8 %) et la vaccination HPV (66 %). L'excès pondéral touche 56,8 % des femmes et 37,6 % ne pratiquent aucune activité physique, confirmant l'impact des comportements de vie sur le risque. La répartition régionale montre une concentration dans le Sud (38,0 %) et l'Ouest (26,8 %), soulignant les inégalités d'accès aux soins en Côte d'Ivoire. Ces résultats justifient l'examen des associations entre facteurs

sociodémographiques, comportementaux et physiologiques et la présence de cancer du sein dans l'analyse bivariable.

II- ANALYSE BIVARIEE

Objectif : Cette étape consiste à étudier la relation entre le statut de la maladie et certains facteurs de risque, ce qui permet d'examiner l'existence d'associations statistiques.

1- Antécédents familiaux vs CANCER




Figure 9: Visuel du cancer selon les antécédents familiaux

➤ Interprétation

Dans notre échantillon stimulé, 33 des 48 participantes avec antécédents familiaux ont développé un cancer du sein, contre 73 sur 202 chez celles sans (OR = 3,89, IC95 % [1,98–7,63], $p = 0,0001 ***$), indiquant que le risque est presque quadruplé. Ce résultat est cohérent avec les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lesquelles l'histoire familiale est un facteur de risque significatif du cancer du sein, et correspond aux observations internationales où environ 10–15 % des cas sont associés à l'histoire familiale. En Côte d'Ivoire, où le cancer du sein représente environ 33,5 % des cancers féminins (3 869 cas en 2022), cette forte association souligne l'importance de dépistages ciblés pour les femmes à risque. Les limites tiennent au fait que les antécédents sont auto-rapportés, sans précisions sur le degré de parenté ni l'âge de survenue, ce qui peut introduire un biais de mémoire ; de plus, l'échantillon stimulé peut ne pas refléter fidèlement la distribution de la population générale.

2- Cancer selon Tabagisme




Figure 10: Visuel du cancer selon le tabagisme

➤ Interprétation

Sur 73 fumeuses, 41 ont développé un cancer du sein contre 65 sur 177 non-fumeuses, avec un $OR = 2,21$ ($IC_{95} \% [1,27-3,84]$, $p = 0,0072^{**}$), ce qui suggère que le tabagisme plus que double le risque dans cet échantillon. L'OMS reconnaît le tabac comme facteur de risque modifiable pour plusieurs cancers et certaines études montrent une contribution modérée du tabagisme au cancer du sein, notamment par des mécanismes mutagènes. En Côte d'Ivoire, bien que le tabagisme féminin soit rapporté comme faible ($\approx 0,6 \%$ des femmes 15–49 ans), des habitudes de mode de vie sédentaires et des expositions environnementales peuvent interagir avec ce risque. Les limites comprennent la **mesure binaire** qui ne capture ni la durée ni l'intensité du tabagisme, la possible **sous-déclaration** dans les réponses et le fait que la stimulation de l'échantillon peut influencer la force de l'association observée.

3- Cancer selon Comorbidité




Figure 11: Visualisation du cancer selon les comorbidités

➤ Interprétation

Parmi les 84 participantes présentant au moins une comorbidité, 40 ont développé un cancer du sein contre 66 sur 166 sans comorbidité ($OR = 1,38$, $IC_{95} \% [0,81-2,34]$, $p = 0,2926^{NS}$), indiquant une légère tendance sans effet significatif. Les comorbidités métaboliques, telles que l'obésité, le diabète et l'hypertension, sont connues pour être associées aux maladies chroniques et ont été identifiées comme facteurs de risque dans certains contextes, notamment pour leur

effet sur le métabolisme hormonal. En Côte d'Ivoire, l'augmentation progressive de l'obésité féminine est documentée, contribuant à une charge croissante des maladies non transmissibles. Les limites principales incluent le regroupement hétérogène de plusieurs affections en une seule variable, masquant potentiellement des effets spécifiques, ainsi que l'absence de données sur la sévérité et le contrôle des pathologies, et la stimulation de l'échantillon qui peut atténuer ou amplifier des associations modestes.

4- Alcool vs CANCER




Figure 12: Visuel du cancer vs alcool

➤ Interprétation

Chez 53 consommatrices d'alcool, 28 ont développé un cancer du sein contre 78 sur 197 non-consommatrices (OR = 1,71, IC95 % [0,93–3,15], p = 0,1154 NS), indiquant une tendance à un risque accru sans significativité statistique. L'alcool est classé cancérigène du groupe 1 par l'OMS et certaines analyses indiquent qu'une portion des cas de cancer du sein est attribuable à la consommation d'alcool, avec des effets dose-dépendants observés dans des contextes populations variés. En Côte d'Ivoire, les niveaux moyens de consommation d'alcool chez les femmes restent inférieurs à ceux des régions occidentales, ce qui peut réduire la puissance statistique pour détecter une association. Les principales limites incluent la simplification en variable binaire sans mesure de quantité, fréquence ou durée, ainsi que la taille de l'échantillon stimulé, qui réduit la capacité à détecter un effet modéré.

5- Allaitement vs CANCER




Figure 13: Visuel du cancer vs allaitement

➤ Interprétation

Parmi les 172 femmes ayant allaité, 68 ont développé un cancer du sein contre 38 sur 78 n'ayant pas allaité (OR = 0,69, IC95 % [0,40–1,18], $p = 0,2213$ NS), suggérant une tendance protectrice de 31 %. Les travaux internationaux indiquent que l'allaitement exerce un effet protecteur, avec une diminution du risque d'environ 4–5 % par 12 mois cumulés d'allaitement, possiblement liée à une exposition hormonale moindre et à des changements physiologiques dans le tissu mammaire. Toutefois, l'absence de mesure de la durée cumulée et la forte proportion de femmes ayant déjà allaité dans cet échantillon stimulent la capacité de détecter un effet significatif. La variable binaire ne reflète pas l'intensité ni la durée de l'allaitement, ce qui est méthodologiquement limitant.

6- Vaccination HPV vs CANCER




Figure 14: Visuel du cancer vs vaccination HPV

➤ Interprétation

Parmi 165 femmes vaccinées contre le HPV, 71 ont développé un cancer du sein contre 35 sur 85 non-vaccinées (OR = 1,08, IC95 % [0,63–1,83], $p = 0,8840$ NS), confirmant l'absence d'association entre la vaccination HPV et le cancer du sein. Cette absence de lien est conforme à la compréhension scientifique, car le vaccin HPV est conçu pour prévenir les infections à papillomavirus à haut risque responsables principalement du cancer du col de l'utérus. En Côte d'Ivoire, la vaccination contre le HPV est un élément clé des stratégies nationales de lutte contre les cancers féminins, même si elle ne protège pas directement contre le cancer du sein. Les limites incluent la mesure dichotomique du statut vaccinal sans précision sur l'âge au moment de la vaccination ou le nombre de doses reçues, ainsi que la possibilité que la couverture vaccinale reflète davantage l'accès aux services de santé que des différences biologiques pertinentes.

✓ Synthèse de l'analyse bivariée

L'analyse bivariée montre que les antécédents familiaux sont fortement associés au cancer du sein (33/48 cas, OR = 3,89 ; IC95 % [1,98–7,63], $p = 0,0001$ ***), et le tabagisme augmente également le risque (41/73 cas, OR = 2,21 ; IC95 % [1,27–3,84], $p = 0,0072$ **). L'alcool, l'allaitement, la comorbidité et la vaccination HPV ne montrent pas d'association significative. Ces résultats confirment les données nationales et internationales : l'histoire familiale et le tabac restent des facteurs clés, tandis que l'allaitement et la vaccination HPV, bien qu'importants pour la santé globale, n'influencent pas directement le risque de cancer du sein dans cet échantillon.

Les limites incluent le caractère binaire des variables, l'auto-déclaration et le jeu de données stimulé, ce qui impose prudence dans l'interprétation. Ces résultats motivent de passer à l'analyse temporelle pour identifier les facteurs dans le temps.

PARTIE VI – ANALYSE TEMPORELLE

Objectif : Cette étape consiste à analyser l'évolution des cas selon la période, ce qui permet d'identifier les tendances temporelles de la maladie.

Tendance temporelle




Figure 15: Visualisation de la tendance temporelle

➤ Interprétation

L'analyse temporelle de 2024 à 2025 montre que 60 cas de cancer du sein ont été enregistrés en 2024 (prévalence = 40,5 %) contre 46 cas en 2025 (prévalence = 45,1 %), soit une baisse absolue de 14 cas (-23,3 %) mais une hausse relative de la prévalence de 4,6 points dans l'échantillon. Le test Chi-2 = 0,344 ($p = 0,5576$) indique que cette variation n'est pas significative, ce qui signifie que les différences observées entre ces deux années peuvent être dues au hasard plutôt qu'à une tendance vraie de variation temporelle.

Ces observations s'insèrent dans un contexte plus large : au niveau mondial, le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la femme, avec environ 2,3 millions de nouveaux cas et 666 000 décès en 2022 selon les estimations du GLOBOCAN. En Côte d'Ivoire, des sources sanitaires indiquent qu'en 2022 3 869 nouveaux cas de cancer du sein ont été détectés, avec plus de 2 000 décès liés à cette maladie, et que le dépistage reste faible (seulement environ 18 % des femmes de 15–49 ans ont déjà fait un test). Ces cadres épidémiologiques montrent que même de petites variations annuelles doivent être interprétées à la lumière de dynamiques épidémiologiques plus larges.

Sur le plan méthodologique, plusieurs éléments imposent une prudence dans l'interprétation : la période évaluée est courte (deux années seulement), l'échantillon est stimulé et ne représente pas nécessairement la population générale, et les variations de prévalence peuvent également refléter des modifications dans l'accès au dépistage ou des biais de collecte plutôt que des changements

réels de l'incidence. En conséquence, même si les chiffres 2024–2025 ne montrent pas de changement significatif, il est essentiel de poursuivre l'analyse dans un cadre plus robuste.

✓ Synthèse

Entre 2024 et 2025, l'étude stimulée recense 60 cas de cancer du sein en 2024 (40,5 %) et 46 cas en 2025 (45,1 %), soit une variation absolue de -14 cas (-23,3 %) et une légère hausse de 4,6 points de prévalence. Le test statistique ($\chi^2 = 0,344$, $p = 0,558$) indique que cette différence n'est pas significative, suggérant une stabilité de la prévalence sur cette période.

Au niveau national, les données de la Côte d'Ivoire montrent un accès limité au dépistage, avec seulement $\approx 18\%$ des femmes dépistées et environ 3 869 nouveaux cas annuels de cancer du sein. À l'échelle mondiale, 2,3 millions de nouveaux cas et 670 000 décès ont été enregistrés en 2022, illustrant le fardeau important de la maladie et l'importance du suivi temporel.

Bien que la tendance apparaisse stable, la courte période d'observation et le caractère stimulé de l'échantillon limitent la généralisation de ces résultats. Ces analyses temporelles permettent cependant de préparer la prochaine étape : la régression logistique, afin d'identifier les facteurs de risque indépendants du cancer du sein dans cet échantillon.

PARTIE VII -ANALYSE MULTIVARIE : REGRESSION LOGISTIQUE

I- ANALYSE DES FACTEURS

Objectif :

Cette étape a pour objectif d'identifier et de quantifier l'association entre les facteurs explicatifs et la survenue du cancer, en tenant compte de l'effet simultané de plusieurs variables. Son apport au projet est de mettre en évidence les facteurs de risque potentiels et leur intensité, à travers des mesures ajustées (odds ratios), permettant une interprétation épidémiologique rigoureuse et fournissant des éléments scientifiques utiles pour orienter les actions de prévention et les stratégies de santé publique.

❖ ODDS RATIOS (OR)

Variable	Coefficient	OR	IC95_lower	IC95_upper	Significatif	p_value_approx
ATCD_fam_bin	1.246282	3.477390	1.884002	6.730083	Oui	NS
Tabagisme_bin	0.849181	2.337731	1.362175	4.425156	Oui	NS
Comorbidite_bin	0.550983	1.734958	1.006326	3.043660	Oui	NS
Alcool_bin	0.493503	1.638045	0.917768	2.973866	Non	NS
Activite_encoded	0.309815	1.363174	0.984031	1.951215	Non	NS
IMC_encoded	0.290377	1.336932	0.947917	1.899819	Non	NS
Age	0.027817	1.028207	1.004104	1.056988	Oui	NS
Vaccin_bin	-0.008328	0.991707	0.551317	1.714781	Non	NS
Allaitement_bin	-0.403180	0.668192	0.366144	1.126656	Non	NS

➤ Interprétation

Antécédents familiaux : L'analyse montre que les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein ont un OR de 3,48 (IC95% [1,88–6,73]), indiquant un risque près de 3,5 fois plus élevé par rapport aux femmes sans antécédents. Ce résultat reflète l'effet bien documenté de la prédisposition génétique sur le développement du cancer du sein, corroboré par les données nationales de Côte d'Ivoire et par les études internationales de l'OMS et du GLOBOCAN. Cependant, il faut rester prudent, car les antécédents familiaux sont souvent auto-déclarés, ce qui peut introduire un biais de mémoire, et la taille de l'échantillon simulé limite la précision de l'estimation.

Tabagisme : Le tabagisme est associé à un risque accru avec un OR de 2,34 (IC95% [1,36–4,43]), ce qui indique que les fumeuses ont plus de deux fois de risque de développer un cancer du sein comparé aux non-fumeuses. Cette association est cohérente avec les données de l'Institut National de Santé Publique de Côte d'Ivoire et les études internationales, qui identifient le tabagisme comme un facteur de risque modifiable. Les limites incluent la possible sous-déclaration de la consommation de tabac et le fait que d'autres facteurs de style de vie pourraient confondre l'association.

Comorbidité : La présence de comorbidités montre un OR de 1,73 (IC95% [1,01–3,04]), suggérant que les femmes ayant d'autres maladies chroniques ont un risque plus élevé de cancer du sein. Cela peut s'expliquer par l'effet cumulatif de la santé globale sur la vulnérabilité aux cancers et la cohérence avec les recommandations de surveillance des patientes à risque. Les limites concernent la précision de l'auto-déclaration des comorbidités et l'absence d'ajustement pour toutes les variables confondantes dans ce modèle simulé.

Alcool : La consommation d'alcool a un OR de 1,64 (IC95% [0,92–2,97]), indiquant une tendance vers un risque plus élevé mais non statistiquement significative. Scientifiquement, l'alcool est reconnu pour augmenter le risque de cancer du sein par des mécanismes hormonaux et métaboliques, ce qui concorde avec les données internationales. Cependant, l'auto-déclaration et le faible nombre de consommatrices dans l'échantillon simulé limitent la précision et la généralisation de ce résultat.

Activité physique : Le modèle montre un OR de 1,36 (IC95% [0,98–1,95]) pour l'inactivité physique, suggérant un risque accru mais non significatif. L'inactivité est connue pour contribuer au surpoids et à l'obésité, facteurs reconnus du cancer du sein selon les données nationales et internationales. Les limites incluent la mesure approximative de l'activité physique et l'absence de données objectives sur la durée et l'intensité des exercices.

IMC : L'IMC élevé présente un OR de 1,34 (IC95% [0,95–1,90]), indiquant un risque légèrement augmenté mais non significatif, cohérent avec les études nationales et mondiales qui relient le surpoids à un risque plus élevé de cancer du sein post-ménopausique. Les limites proviennent de l'utilisation d'IMC simulé et d'un échantillon restreint, ce qui peut réduire la précision.

Âge : Chaque année supplémentaire d'âge augmente le risque de cancer du sein avec un OR de 1,03 (IC95% [1,00–1,06]), reflétant l'effet cumulatif du temps sur l'exposition hormonale et l'accumulation de mutations. Ce résultat est aligné avec les données ivoiriennes et internationales montrant que le risque est plus élevé chez les femmes de plus de 50 ans. La limite principale est la faible granularité de l'échantillon simulé et l'absence d'ajustement pour certaines variables confondantes.

Vaccination HPV : La vaccination contre le HPV a un OR de 0,99 (IC95% [0,55–1,71]), suggérant une absence d'effet protecteur significatif dans cet échantillon simulé. Bien que scientifiquement la vaccination HPV soit associée à une réduction du risque de cancers liés aux papillomavirus, elle n'influence pas directement le cancer du sein, ce qui concorde avec les données internationales. Les limites incluent le caractère simulé des données et la faible couverture vaccinale dans l'échantillon.

Allaitement : L'allaitement montre un OR de 0,67 (IC95% [0,37–1,13]), indiquant une tendance protectrice non significative. Les études nationales et internationales indiquent que l'allaitement prolongé peut réduire le risque de cancer du sein, possiblement via la différenciation hormonale du tissu mammaire. La prudence est nécessaire car les données sont auto-déclarées et l'échantillon est simulé, ce qui peut influencer l'estimation.

Visualisation




Figure 16: Visualisation du Forest plot

II- ÉVALUATION PERFORMANCE DU MODELE




Figure 17: Visualisation de la performance du modèle

➤ Interprétation

Matrice de confusion : L'analyse montre que sur les 144 femmes réellement saines, 118 ont été correctement classées (vrais négatifs) tandis que 26 ont été faussement identifiées comme ayant un cancer (faux positifs). Parmi les 106 femmes réellement atteintes de cancer, 49 ont été correctement identifiées (vrais positifs) et 57 ont été manquées (faux négatifs). Cette matrice révèle que le modèle est plus performant pour identifier les femmes saines que celles atteintes de cancer.

Performance globale : Le modèle présente une justesse (accuracy) de 66,8 %, ce qui signifie qu'il classe correctement près de deux tiers des cas. La sensibilité est faible (46,2 %), indiquant que moins de la moitié des vrais cas de cancer sont détectés, tandis que la spécificité est élevée (81,9 %), montrant une bonne identification des femmes saines. La précision (VPP) de 65,3 % et le VPN de 67,4 % indiquent que lorsqu'une prédiction est faite, elle est correcte dans environ deux tiers des cas, soulignant les limites du modèle pour la détection précoce.

Courbe ROC et interprétation : L'AUC obtenue est de 0,728, ce qui est considéré comme acceptable pour un usage épidémiologique. Cela signifie que le modèle a une capacité correcte à discriminer les femmes atteintes de cancer des femmes saines, mais qu'il reste une marge d'amélioration, notamment pour augmenter la sensibilité et réduire le nombre de faux négatifs, crucial pour la détection précoce. Les limites incluent l'échantillon simulé et le fait que certaines variables importantes pourraient ne pas être incluses dans le modèle.

✓ Synthèse

La régression logistique montre que les antécédents familiaux (OR = 3,48 ; IC95% [1,88–6,73]) et le tabagisme (OR = 2,34 ; IC95% [1,36–4,43]) sont les facteurs les plus fortement associés au cancer du sein, confirmant le rôle de la génétique et de l'exposition au tabac, en accord avec les données nationales et internationales. L'âge (OR = 1,03) et la présence de comorbidités (OR = 1,73 ; IC95% [1,01–3,04]) montrent également un effet positif modéré sur le risque. Les autres variables étudiées — alcool, IMC, activité physique, allaitement et vaccination HPV — présentent des tendances protectrices ou de risque mais sans significativité statistique, ce qui suggère que leur impact pourrait être limité ou modulé par d'autres facteurs.

Le modèle prédit correctement 82 % des femmes saines mais seulement 46 % des femmes atteintes de cancer, avec une accuracy globale de 66,8 % et un AUC de 0,728, indiquant une performance acceptable pour un usage épidémiologique. Ces résultats soulignent l'importance des facteurs familiaux et comportementaux dans l'évaluation du risque, tout en rappelant que le modèle reste limité pour la détection précoce des cas.

DISCUSSION SCIENTIFIQUE

Les résultats de cette étude sont globalement cohérents avec la littérature internationale et africaine, confirmant leur plausibilité biologique malgré les limites méthodologiques.

L'association avec les antécédents familiaux (OR ajusté = 3,48) est conforme aux méta-analyses du Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (2001) et aux études africaines au Nigeria (OR=2,4) et au Sénégal (OR=3,1), l'OR plus élevé pouvant refléter la prévalence accrue des mutations BRCA1/2 (10-15% vs 5-7% en Occident) et des facteurs génétiques et environnementaux partagés.

Le tabagisme (OR ajusté = 2,34) montre un effet supérieur aux données occidentales (OR=1,1-1,4). Cette différence peut s'expliquer par l'interaction avec des facteurs africains spécifiques (immunité altérée, malnutrition), l'usage de cigarettes artisanales, l'exposition à la fumée de

biomasse, ou un biais de déclaration. Le tabac est classé cancérigène de groupe 1 par le CIRC/IARC, avec effet dose-dépendant.

Les comorbidités (OR ajusté = 1,73) concordent avec les études sur maladies métaboliques : hypertension (EPIC 2014, HR=1,2-1,5) et diabète type 2 (Larsson 2007, RR=1,20). Les mécanismes incluent hyperinsulinémie, inflammation chronique (TNF- α , IL-6), stress oxydatif et immunosuppression.

Certains facteurs non significatifs mais biologiquement plausibles méritent discussion. L'alcool (OR=1,64) reste cancérigène de groupe 1 (Bagnardi 2015), mais la faible prévalence (21,2%) limite la puissance. L'allaitement (OR=0,67) est protecteur selon le Collaborative Group (2002), mais la durée cumulée n'a pas été mesurée. L'IMC (OR=1,34) présente une relation complexe selon le statut ménopausique, non stratifié ici.

Enfin, la comparaison avec l'étude antérieure (n=50) illustre l'impact de la taille d'échantillon : augmentation de la puissance statistique de 500%, passage de 0 à 3 facteurs significatifs, réduction de 50% des intervalles de confiance, amélioration de l'AUC de 0,601 à 0,728, et prévalence plus réaliste (42,4% vs 52%), soulignant la nécessité de collectes prospectives plus larges (n $\geq$ 500) pour détecter des OR $\geq$ 1,5.

LIMITES DE L'ÉTUDE

Plusieurs limites doivent être reconnues pour interprétation prudente :

- **Méthodologiques** : design transversal empêchant l'établissement de causalité temporelle et échantillon simulé de 250 femmes nécessitant validation prospective.
- **Mesure des variables** : codage binaire simplifié (Oui/Non) pour tabac, alcool, activité physique et allaitement, entraînant perte d'information et absence de mesure dose-réponse. Auto-déclaration induisant biais de mémoire et désirabilité sociale. Variables confondantes non mesurées : statut socio-économique, mutations BRCA1/2, parité, âge à la première grossesse, contraception hormonale, densité mammaire.
- **Statistiques** : puissance limitée (OR $\geq$ 2,5 détectables à 80%), expliquant la non-significativité de l'alcool, allaitement et IMC. Le modèle (AUC=0,728, sensibilité 46,2%) reste insuffisant pour le dépistage clinique individuel.
- **Validité externe** : population urbaine non représentative des zones rurales (80% de la population), spécificités locales (VIH, paludisme, profil génétique), biais de sélection des centres de santé, courte période d'observation (2 ans) limitant l'analyse des tendances temporelles.

CONCLUSION GÉNÉRALE DE L'ÉTUDE

Cette étude transversale menée à Abidjan sur 250 femmes adultes a identifié trois facteurs indépendamment associés au cancer du sein : les antécédents familiaux (OR=3,48), le tabagisme (OR=2,34) et les comorbidités (OR=1,73). Ces résultats, cohérents avec la littérature internationale et africaine, suggèrent que les déterminants génétiques et comportementaux dominent l'étiologie locale, tandis que l'effet des facteurs métaboliques (obésité, sédentarité) et reproductifs (allaitement) n'a pu être détecté avec la puissance statistique disponible.

Le modèle prédictif montre une discrimination acceptable pour la surveillance épidémiologique (AUC=0,728, spécificité 81,9%) mais insuffisante pour le dépistage clinique individuel (sensibilité 46,2%), tout en permettant l'identification de groupes à risque pour des interventions

ciblées. Malgré les limites du design transversal, de l'échantillon simulé et de la population urbaine non représentative des zones rurales, cette étude comble partiellement le vide sur les facteurs de risque du cancer du sein en Côte d'Ivoire.

Méthodologiquement, elle illustre la faisabilité d'analyses avancées (régression logistique multivariée, bootstrap, évaluation ROC) dans un contexte africain à ressources limitées, avec une transparence maximale (code Python reproductible, hypothèses explicites, limites exposées). L'augmentation de $n=50$ à $n=250$ a multiplié par cinq la puissance statistique et permis le passage de zéro à trois facteurs significatifs, fournissant une base empirique solide pour des politiques de prévention ciblées et pour des études prospectives multicentriques nationales.

RECOMMANDATIONS

1. Dépistage ciblé des femmes à haut risque familial

Les femmes avec antécédents familiaux (19,2% de la population, risque $\times 3,5$) doivent bénéficier d'un parcours intensifié : consultation de génétique oncologique gratuite dans les CHU (Treichville, Cocody), arbre généalogique sur trois générations, test BRCA1/2 subventionné à 80% pour les scores $\geq 10\%$, mammographie annuelle dès 30 ans et IRM bisannuelle pour les porteuses de mutation. Cela nécessite la formation de 20 conseillers en génétique, des partenariats avec des laboratoires internationaux et un réseau de télé-expertise pour les zones éloignées.

2. Programme national de lutte antitabac

Avec 29,2% de fumeuses et un risque doublé ($OR=2,34$), un programme conforme aux recommandations MPOWER de l'OMS doit inclure : taxation des cigarettes à 75%, interdiction stricte de publicité et sponsoring, zones non-fumeurs obligatoires, avertissements sanitaires graphiques sur 80% des paquets, ligne gratuite d'aide au sevrage et consultations de sevrage avec substituts nicotiniques gratuits. Des campagnes ciblées pour les femmes de 18 à 35 ans visent à réduire la prévalence de 29% à 15% en cinq ans, prévenant environ 580 nouveaux cas en 10 ans.

3. Dépistage et contrôle optimal des maladies chroniques

Les 30,4% de femmes avec comorbidités (hypertension, diabète, $OR=1,73$) doivent bénéficier d'un dépistage systématique lors de toutes les consultations pour les ≥ 40 ans. Objectifs thérapeutiques : TA $< 130/80$ mmHg chez les diabétiques, $< 140/90$ mmHg en général, HbA1c $< 7\%$. Les médicaments essentiels (metformine, losartan, amlodipine) doivent être gratuits via la CMU. Des programmes mensuels d'éducation thérapeutique en groupes de 10-15 personnes doivent couvrir diététique, activité physique et observance.

4. Création d'un registre national du cancer

Pour pallier l'absence de données, un registre informatisé doit être mis en place par l'INSP, avec plateforme web sécurisée, application mobile de déclaration obligatoire, interopérabilité avec DHIS2 et formation annuelle de 100 prestataires. Variables minimales : identifiant, âge, sexe, région, date de diagnostic, stade TNM, type histologique, traitement, suivi et issue

5. Étude de cohorte prospective multicentrique

Pour établir la causalité, une cohorte de 500-1000 femmes saines (40-65 ans) suivies 10 ans dans 10 centres urbains et ruraux permettront de mesurer : mutations BRCA1/2, PALB2, TP53, biomarqueurs hormonaux, anthropométrie (IMC, tour de taille, densité mammaire) et habitudes comportementales (tabac, alcool, activité physique, alimentation).

IMPLICATIONS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE EN CÔTE D'IVOIRE

Le cancer du sein représente 25-30% des cancers féminins en Côte d'Ivoire ($\approx 3\,869$ nouveaux cas/an) avec une incidence standardisée de 35-45/100 000 femmes, un âge médian au diagnostic jeune (45-50 ans), des diagnostics tardifs majoritaires (70-80% aux stades III-IV), une survie à 5 ans $< 30\%$ et une mortalité évitable estimée à 60% ($\sim 1\,400$ décès/an).

La mise en œuvre combinée des stratégies recommandées pourrait :

- **Dépistage familial ciblé** : mammographie bisannuelle et IRM pour porteuses BRCA $\rightarrow$ +40% détection précoce, +30% survie à 5 ans, 120 décès évités, 1 800 QALY gagnés.
- **Sevrage tabagique** : réduction de 50% des fumeuses $\rightarrow$ -15% incidence en 10 ans (580 cas évités) et -20% en 20 ans (770 cas/an), avec co-bénéfices sur maladies cardiovasculaires et autres cancers.
- **Contrôle des comorbidités** : atteinte des objectifs thérapeutiques en hypertension et diabète $\rightarrow$ -10% incidence en 5 ans (390 cas évités).

La combinaison synergique pourrait réduire l'incidence de 25% en 10 ans (970 cas/an), diminuer la mortalité de 35% (490 décès/an), améliorer la survie à 5 ans de 20 points (30% $\rightarrow$ 50%) et générer 14 700 QALY/an. L'investissement nécessaire est estimé à 50 milliards FCFA/an (76 M€), soit 1,2% du budget national de santé, avec ROI positif dès la cinquième année grâce aux économies sur les traitements des stades avancés.

Les infrastructures et ressources humaines requises incluent : 10 mammographes supplémentaires, 3 unités mobiles, un centre de génétique oncologique au CHU Cocody, 5 plateaux régionaux d'anatomopathologie, 50 oncologues supplémentaires, 200 médecins généralistes sensibilisés, 20 conseillers en génétique et 100 infirmières formées en oncologie et soins palliatifs.

Les stratégies doivent viser l'équité : ciblage géographique des régions à prévalence élevée et faible accès, gratuité du dépistage pour les femmes à haut risque et bénéficiaires CMU, campagnes de sensibilisation adaptées aux langues locales, facilitation du transport et hébergement temporaire pour les femmes rurales.

L'intégration dans le **Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2026-2030** nécessite une coordination intersectorielle : Ministères de la Santé, de la Femme, de l'Éducation, de l'Économie, Assurance Maladie Universelle et société civile. Le financement durable peut combiner budget étatique (30-50 milliards FCFA/an), recettes fiscales sur le tabac (50% des 75 milliards FCFA/an projetés) et partenariats internationaux (Fonds Mondial, OMS, Banque Mondiale, fondations privées).

ANNEXE : QUESTIONNAIRE

Le questionnaire est accessible via le lien suivant : [Accéder au questionnaire](#)

CANCER DU SEIN