

# Нелинейные уравнения и системы нелинейных алгебраических уравнений

К.ф.-м.н. Завьялова Наталья Александровна

[natalia.zavyalova@gmail.com](mailto:natalia.zavyalova@gmail.com)

Невмержицкий Ян Васильевич

[nevmerzhitski\\_y@mail.ru](mailto:nevmerzhitski_y@mail.ru)

# Постановка задачи


Рассматривается задача поиска корней уравнения для функции одного переменного

$$f(x) = 0$$

Комментарий: подавляющее большинство нелинейных уравнений не решается аналитически или же решается только в каких-либо упрощенных приближениях. Для более общего случая требуется численное решение.

**Решение нелинейного уравнения численно всегда проходит в 2 этапа:**

1. Локализация корней – нахождение непересекающихся отрезков, содержащих только один корень (требование обусловлено тем, что методы, о которых пойдет речь в дальнейшем подходят для поиска единственного корня на множестве)




2. Нахождение искомого корня на каждом отрезке локализации с требуемой точностью

# Методы локализации корней

Наиболее распространены следующие методы локализации


## Геометрическая локализация

1. Строим график функции
2. Смотрим где приблизительно находится корень и отмечаем этот отрезок



## Программная локализация

1. Известно, что корни расположены на отрезке  $[a, b]$



2. Для локализации отрезка выбирается мелкое разбиение


3. Для каждого отрезка проверяется условие  $f(x_i) \cdot f(x_{i+1}) < 0$

4. Если оно выполняется, то значит, что на отрезке находится нечетное число корней (по умолчанию считаем, что один)

**Примечание:** как правило, каждый метод локализации нужно адаптировать под задачу или под группу задач

# Деление отрезка пополам

Считаем, что задача локализации корней решена и на рассматриваемом отрезке содержится только один корень



$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

**Примечание:** метод так же носит название «Метод дихотомии» или «Метод бинарного поиска»

Задача: найти корень с точностью  $\varepsilon$

## Алгоритм

1. Выбираем точку  $c_1 = \frac{a + b}{2}$
2. Проверяем 2 условия  $f(a) \cdot f(c_1) < 0$  и  $f(c_1) \cdot f(b) < 0$
3. Пусть для определенности  $f(a) \cdot f(c_1) < 0$ . Тогда далее рассматривается отрезок  $[a, c_1]$  и выбирается точка  $c_2 = \frac{a + c_1}{2}$

## Условие завершения

$$l_n = \frac{b - a}{2^n}$$

Длина отрезка после  $n$  шагов

$$l_n \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad n \leq \frac{\ln(\frac{b - a}{\varepsilon})}{|\ln 2|}$$

Количество итераций, требуемое для достижения заданной точности

# Метод простых итераций для нелинейного уравнения

Исходное уравнение  $f(x) = 0$  заменяется на  $x = \phi(x)$

Обычно это можно сделать просто выразив  $x$  из уравнения, например

$f(x) = 0$	$x = \phi(x)$
$x + \sin x = 0$	или $x = \arcsin(-x)$ $x = -\sin x$
$e^x x + \operatorname{tg} x = 0$	или $x = \operatorname{tg} x / e^x$ или $x = \operatorname{arctg}(x e^x)$ или $x = \ln(\operatorname{tg} x / x)$

Метод простых итераций (МПИ)


$$x^{n+1} = \phi(x^n)$$

Однако, не любая замена с последующей организацией итераций приводит к решению

# Сходимость метода простых итераций

Пусть  $x^*$  - точное решение, тогда


$$f(x^*) \equiv 0$$



$$x^* = \phi(x^*)$$

$$x^* = \phi(x^*)$$

$$x^{n+1} = \phi(x^n)$$



$$x^{n+1} - x^* = \phi(x^n) - \phi(x^*) = \phi'(\xi)(x^n - x^*)$$

Теорема Лагранжа

$x^{n+1} - x^* = \varepsilon^{n+1}$  — ошибка, получаемая на  $n + 1$  —й итерации

Тогда эволюция ошибки:

$$\varepsilon^{n+1} = \phi'(\xi) \cdot \varepsilon^n = (\phi'(\xi))^2 \cdot \varepsilon^{n-1} = \dots = (\phi'(\xi))^{n+1} \cdot \varepsilon^0$$

Начальное приближение в любом случае выбирается с некоей ошибкой (сразу попасть в решение мы не можем).

Для того, чтобы эта ошибка убывала на итерациях необходимо, чтобы

$$|\phi'(\xi)| \leq q < 1$$

$q$  — скорость сходимости (максимальное по модулю значение производной)

# Оценка числа итераций

Невязка, при начальном приближении:  $r^0 = f(x^0)$

$$r^0 - 0 = f(x^0) - f(x^*) = f'(x^0)(x^0 - x^*) + O((x^0 - x^*)^2)$$



$$\varepsilon^0 \approx r^0 / f'(x^0) = f(x^0) / f'(x^0)$$

Условие  
прекращения  
итераций:

$$\varepsilon^{n+1} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_0 q^n < \varepsilon$$



Заданная точность



$$n \geq \left\lceil \frac{\ln\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)}{\ln q} \right\rceil$$

Необходимое число итераций для  
достижения заданной точности

Для прекращения итераций так же часто используют условие

$$f(x^{n+1}) < \varepsilon$$

# Метод релаксации

Вид метода простой итерации при  $\phi(x^n) = \tau f(x^n) + x^n$

Численная производная по времени

Итерационный параметр

$$\frac{x^{n+1} - x^n}{\tau} = f(x^n) \quad - \text{Каноническая форма}$$

МПИ сходится когда  $\max |\phi'(x)| < 1 \quad \Rightarrow \quad \max_{x \in U(x^*)} |1 + \tau f'(x)| < 1$

## Оптимальное значение итерационного параметра

Пусть  $\varepsilon^n = x^n - x^*$  - погрешность на n-й итерации, тогда

$$\frac{x^{n+1} - x^n}{\tau} = f(x^n) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x^{n+1} - x^* - (x^n - x^*)}{\tau} = f(x^* + \varepsilon^n)$$

Тогда уравнение для ошибки

$$\frac{\varepsilon^{n+1} - \varepsilon^n}{\tau} = f(x^* + \varepsilon^n) - \underbrace{f(x^*)}_{=0} \approx f'(\xi) \varepsilon^n$$



# Метод релаксации

$$\varepsilon^{n+1} = \varepsilon^n(1 + \tau f'(\xi))$$

Оценим при каких значениях итерационного параметра ошибка минимальна

$$|\varepsilon^{n+1}| \leq |\varepsilon^n| \max_{\xi} |1 + \tau f'(\xi)| \leq |\varepsilon^0| \left( \max_{\xi} |1 + \tau f'(\xi)| \right)^{n+1}$$

Пусть  $0 \leq m \leq |f'(\xi)| \leq M$  тогда  $\max_{\xi} |1 + \tau f'(\xi)| \leq \max(|1 - \tau m|, |1 - \tau M|)$


Нужно требовать одновременное ограничение максимума модуля с двух сторон.

Оно достигается в точке пересечения прямых

$$1 - \tau m = -(1 - \tau M)$$

$$\tau_{\text{опт}} = \frac{2}{m + M}$$

Оптимальное значение итерационного параметра при котором ошибка минимальна



$$|\varepsilon_{\min}^{n+1}| \leq \left( \frac{M - m}{M + m} \right)^{n+1} |\varepsilon^0|$$

# Метод Ньютона для поиска решения

Ищем решение уравнения  $f(x) = 0$ , предполагаем, что на  $n + 1$  - й итерации решение было найдено

$$f(x^{n+1}) = 0 = f(x^n) + f'(x^n)(x^{n+1} - x^n) + O((x^{n+1} - x^n)^2)$$

Пренебрегаем слагаемыми второго порядка малости и получаем:

$$x^{n+1} = x^n - \frac{f(x^n)}{f'(x^n)}$$

Метод Ньютона

Метод Ньютона – частный случай МПИ. Условие сходимости с такой правой частью

$$\max_{x \in U(x^*)} |\varphi'(x)| = \max_{x \in U(x^*)} \left| 1 - \frac{f'^2 - ff''}{f'^2} \right| = \max_{x \in U(x^*)} \left| \frac{ff''}{f'^2} \right| < 1$$

Если вторая производная функции ограничена в некоторой окрестности решения  $f'' < C_2$ , а первая производная ограничена снизу  $f' > C_1$  в этой же окрестности, то метод Ньютона сходится.

# Метод Ньютона

## Теорема (о квадратичной сходимости метода Ньютона):

Пусть существуют две ограниченные производные функции  $f(x)$  и кроме того пусть существует  $(f'(x))^{-1}$ , причем в некоторой окрестности корня  $U(x^*) = \{x: |x - x^*| \leq r\}$  имеют место оценки

$$\inf |f'(x)| = c_1 > 0$$

$$\sup |f''(x)| = c_2 > 0$$


и кроме того, если  $|x^0 - x^*| < \frac{2c_1}{c_2}, x \in U(x^*)$

то метод Ньютона сходится квадратично, при этом

$$|x^n - x^*| < q^{2^n - 1} |x^0 - x^*|^{2^n}, x \in U(x^*), \quad \text{где } q = \frac{c_2}{2c_1} < 1$$

## Доказательство:

$$f(x^*) = f(x^n) + f'(x^n)(x^* - x^n) + \frac{(x^* - x^n)^2}{2} f''(\xi), \quad \xi \in [x^*, x^n] \text{ или } [x^n, x^*]$$


$$x^{n+1} = x^n - \frac{f(x^n)}{f'(x^n)} = x^n - \frac{f(x^n) - f(x^*)}{f'(x^n)} = x^n - \frac{-f'(x^n)(x^* - x^n) - \frac{1}{2}f''(\xi)(x^* - x^n)^2}{f'(x^n)}$$

# Доказательство сходимости

$$x^{n+1} = x^* + \frac{\frac{1}{2}f''(\xi)}{f'(x^n)}(x^* - x^n)^2$$

т.е.

$$x^{n+1} - x^* = \frac{\frac{1}{2}f''(\xi)}{f'(x^n)}(x^* - x^n)^2$$

Оценим убывание ошибки

$$|x^{n+1} - x^*| \leq \frac{c_2}{2c_1}(x^* - x^n)^2 \leq \frac{c_2}{2c_1} \left( \frac{c_2}{2c_1}(x^* - x^{n-1})^2 \right)^2 \leq \dots$$

Таким образом

$$|x^{n+1} - x^*| \leq \left( \frac{c_2}{2c_1} \right)^{2^n - 1} |x^* - x^0|^{2^n}$$

Метод Ньютона сходится с квадратичной скоростью сходимости

Для сходимости метода Ньютона достаточно, чтобы были выполнены 2 условия:


$$q \leq \frac{c_2}{2c_1} < 1$$

$$\frac{c_2}{2c_1} |x^* - x^0| < 1$$

# Геометрический смысл метода Ньютона


## Пример:

Поиск корня у уравнения  $\cos x = x^3$   
начальное приближение  $x_0 = 0.5$




$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1,112\,141\,637\,097, \\x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \underline{0,909\,672\,693\,736}, \\x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = \underline{0,867\,263\,818\,209}, \\x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = \underline{0,865\,477\,135\,298}, \\x_5 &= x_4 - \frac{f(x_4)}{f'(x_4)} = \underline{0,865\,474\,033\,111}, \\x_6 &= x_5 - \frac{f(x_5)}{f'(x_5)} = \underline{0,865\,474\,033\,102}.\end{aligned}$$

## Иллюстрация последовательных приближений



## График сходимости



# Методы высших порядков

## Итерационный процесс третьего порядка

Как и в методе Ньютона предполагаем, что после  $n + 1$  шагов найдено решение

$$f(x^{n+1}) = f(x^n) + f'(x^n)(x^{n+1} - x^n) + \frac{f''(x^n)}{2!}((x^{n+1} - x^n)^2) = 0$$

Разделим всё выражение на  $f'(x^n)$  и для краткости обозначим  $f(x^n) = f_n$

Получаем

$$x^{n+1} - x^n + \frac{f_n}{f'_n} + \frac{f''_n}{2f'_n}(x^{n+1} - x^n)^2 = 0$$

Последний член является поправочным. Заменим в нем выражение  $x^{n+1} - x^n$  на  $(-f_n/f'_n)^2$  из метода Ньютона, получаем

$$x^{n+1} = x^n - \frac{f_n}{f'_n} - \frac{f''_n}{2f'_n} \left( \frac{f_n}{f'_n} \right)^2 = x^n - \frac{f_n}{f'_n} - \frac{f''_n f_n^2}{2(f'_n)^3}$$

## Итерационный процесс четвертого порядка

$$x^{n+1} = x^n - \frac{f_n}{f'_n} - \frac{f''_n f_n^2}{2(f'_n)^3} - \frac{(f''_n)^2 f_n^2}{2(f'_n)^5} + \frac{f'''_n f_n^2}{6(f'_n)^7}$$

Отметим, что итерационные методы высших порядков используются достаточно редко, в следствии повышенных требований к гладкости функций, необходимости вычисления производных высоких порядков и чувствительности к выбору начального приближения

# Решение систем нелинейных уравнений: аксиомы нормы

# Нормы векторов

## Аксиомы нормы

Норма в векторном пространстве  $V$  над полем вещественных или комплексных чисел – это функционал  $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbf{R}$ , обладающий следующими свойствами.

1.  $\|\mathbf{x}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$
2.  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$
3.  $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\| \quad \forall \alpha \in \mathbf{C} \quad \forall \mathbf{x} \in V$

В вычислительной математике широко распространены следующие нормы:

- Максимальная или бесконечная норма (иногда используется название норма Чебышева)

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$$

Обозначения, принятые в МФТИ

Так же встречающиеся обозначения

- $l_1$  норма (или «Манхэттновская норма» или «норма такси»)

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|$$

- Евклидова норма

$$\|\mathbf{x}\|_3 = \|\mathbf{x}\|_e = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$



# Нормы матриц

Норма матрицы должна удовлетворять следующим аксиомам

1.  $\|\mathbf{A}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{0}$
2.  $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\| \quad \forall x, y \in V$
3.  $\|\alpha \mathbf{A}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{C} \quad \forall x \in V$
4.  $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$

**Опр.:** Матричная норма  $\|\mathbf{A}\|$  называется согласованной с векторной нормой  $\|\mathbf{x}\|$ , если выполняется неравенство

$$\|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|, \quad \text{где } \mathbf{y} = \mathbf{Ax}$$

**Опр.:** Матричная норма  $\|\mathbf{A}\|$  называется подчиненной векторной норме  $\|\mathbf{x}\|$ , если выполняется

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

## Свойства нормы

Если норма  $\|\mathbf{A}\|$  подчинена кокой-либо норме  $\|\mathbf{x}\|$ , то она с ней согласована:

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} \Rightarrow \|\mathbf{Ax}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|$$

Кроме этого, из-за компактности множества  $\{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}$  точная верхняя грань достигается на некотором векторе  $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ , то есть для него справедливо

$$\|\mathbf{Ax}_0\| = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}_0\|$$

# Используемые нормы матриц

Определим выражения для норм матриц

$$\|\mathbf{Ax}\|_1 = \max_i \left| \sum_j a_{ij} x_j \right| \leq \max_i \sum_j |a_{ij}| \max_i |x_i| = \|\mathbf{x}\|_1 \cdot \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \sup_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_1}{\|\mathbf{x}\|_1} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

$$\|\mathbf{Ax}\|_2 = \sum_i \left| \sum_j a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{i,j} |a_{ij}| |x_j| = \sum_j |x_j| \sum_i |a_{ij}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \cdot \max_j \sum_i |a_{ij}|$$

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sup_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \max_j \sum_i |a_{ij}| = \|\mathbf{A}^T\|_1$$

# Евклидова норма

Воспользуемся связью между евклидовой нормой вектора и скалярным произведением

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = (\mathbf{x}, \mathbf{x}),$$

Тогда 
$$\|\mathbf{A}\|_2^2 = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{(\mathbf{A}^* \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{x})}{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}$$

Собственные векторы  $(\mathbf{A}^* \mathbf{A}) \omega_i = \lambda_i \omega_i$

Любой вектор  $\mathbf{x}$  можно представить в виде разложения по базису собственных векторов  $\omega_i$

$$\|\mathbf{A}\|_2^2 = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{(\mathbf{A}^* \mathbf{A} \mathbf{x}, \mathbf{x})}{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\sum_i (\lambda_i \xi_i \omega_i, \xi_i \omega_i)}{\sum_i (\xi_i \omega_i, \xi_i \omega_i)} = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\sum_i \lambda_i \xi_i^2}{\sum_i \xi_i^2} = \lambda_{\max} \mathbf{A}^* \mathbf{A}$$

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max} \mathbf{A}^T \mathbf{A}}$$

Если  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ , то

$$\|\mathbf{A}\|_2 = |\lambda_{\max} \mathbf{A}|$$

# Решение систем нелинейных уравнений: методы

# Метод простых итераций для систем

Для численного решения многомерных систем нелинейных уравнений могут быть использованы только обобщения одномерных методов.

Задача состоит в поиске решения системы нелинейных уравнений

$$\mathbf{f}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

Аналогично МПИ для одномерного случая представляем систему в виде:

$$\mathbf{u} = \varphi(\mathbf{u})$$

где  $u \in \mathbf{R}^n$ ,  $\mathbf{R}^n$  –  $n$ -мерное евклидово пространство.

Аналогично одномерному случаю строим итерационный процесс

$$\mathbf{u}^{n+1} = \varphi(\mathbf{u}^n)$$

Опр.: Область  $\Omega \in \mathbf{R}^n$  называется выпуклой, если наряду с двумя точками  $\mathbf{a} \in \Omega$  и  $\mathbf{b} \in \Omega$  она включает все точки отрезка  $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ , т.е. точки с координатами

$$\mathbf{u} = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \quad 0 \leq t \leq 1$$

Опр.: Отображение  $V = \varphi(u): \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$  называется сжимающим в замкнутой выпуклой области  $\Omega$ , если  $\exists q: 0 < q < 1$ :

$$\rho(\varphi(\mathbf{u}^1), \varphi(\mathbf{u}^2)) \leq q\rho(\mathbf{u}^1, \mathbf{u}^2), \quad \forall \mathbf{u}^1, \mathbf{u}^2 \in \mathbf{R}$$

# Метод простых итераций

**Теорема:** Если отображение  $\mathbf{V} = \varphi(\mathbf{u})$  в замкнутой выпуклой области  $\Omega$  является сжимающим, то и уравнение  $\mathbf{u} = \varphi(\mathbf{u})$  имеет решение  $\mathbf{u}^*$  и

$$\rho(\mathbf{u}^*, \mathbf{u}^n) \leq \frac{q^n a}{1 - q}, \quad a = \rho(\mathbf{u}^1, \mathbf{u}^0)$$

**Доказательство:**

$$\rho(\mathbf{u}^{n+1}, \mathbf{u}^n) = \rho(\varphi(\mathbf{u}^n), \varphi(\mathbf{u}^{n-1})) = q\rho(\mathbf{u}^{n-1}, \mathbf{u}^n)$$

Поэтому

$$\rho(\mathbf{u}^{n+1}, \mathbf{u}^n) = q^n \rho(\mathbf{u}^1, \mathbf{u}^0) = q^n a$$

При  $p > n$  имеем цепочку неравенств

$$\rho(\mathbf{u}^p, \mathbf{u}^n) \leq \rho(\mathbf{u}^p, \mathbf{u}^{p-1}) + \rho(\mathbf{u}^{p-1}, \mathbf{u}^{p-2}) + \dots + \rho(\mathbf{u}^{n+1}, \mathbf{u}^n) \leq$$

$$\leq q^{p-1}a + q^{p-2}a + \dots + q^n a \leq q^n a \cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{q^n a}{1 - q}$$

# Метод простых итераций

Согласно критерию Коши последовательность  $\{\mathbf{u}^n\}$  имеет некоторый предел  $\mathbf{u}^*$ . Переходя к пределу при  $p \rightarrow \infty$  получаем

$$\rho(\mathbf{u}^*, \mathbf{u}^n) \leq \frac{q^n a}{1 - q}$$

$$\rho(\mathbf{u}^*, \varphi(\mathbf{u}^*)) \leq \rho(\mathbf{u}^*, \mathbf{u}^{n+1}) + \rho(\varphi(\mathbf{u}^*), \mathbf{u}^{n+1}) = \rho(\mathbf{u}^*, \mathbf{u}^{n+1}) + \rho(\varphi(\mathbf{u}^*), \varphi(\mathbf{u}^n)) \leq$$

$$\rho(\mathbf{u}^*, \mathbf{u}^{n+1}) + q\rho(\mathbf{u}^*, \mathbf{u}^n) \leq 2 \frac{q^{n+1} a}{1 - q}$$

Поскольку  $n$  произвольно, то

$$\rho(\mathbf{u}^*, \varphi(\mathbf{u}^*)) = 0, \quad \text{т. е. } \mathbf{u}^* = \varphi(\mathbf{u}^*)$$

Замечание: При  $n = 0$

$$\rho(\mathbf{u}^p, \mathbf{u}^0) \leq \frac{a}{1 - q}$$

Таким образом все приближения принадлежат области

$$\Omega(\mathbf{u}^0, a, q): \rho(\mathbf{u}, \mathbf{u}^0) \leq \frac{a}{1 - q}$$



# Метод простых итераций

**Теорема (достаточное условие сходимости метода простых итераций):**

Пусть область  $\Omega \in \mathbf{R}^n$  выпуклая  $\mathbf{u} \in \Omega$ , а компоненты  $\varphi_i(\mathbf{u})$  вектора функции  $\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{u}) = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$  имеют равномерно непрерывные производные 1-го порядка. Положим, что норма матрицы Якоби

$$J = \frac{d\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{u})}{d\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial u_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial u_n} \end{pmatrix}$$

не превосходит некоторого числа  $0 \leq q \leq 1$   $\|J\| \leq q < 1 \quad \forall \mathbf{u} \in \Omega$

Обычно проверяют 1-ю или 2-ю нормы

В этом случае отображение  $\mathbf{V} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{u})$  является сжимающим в том числе в  $\Omega$ , т.е.

$$\rho(\boldsymbol{\varphi}(\mathbf{u}^1), \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{u}^2)) \leq q\rho(\mathbf{u}^1, \mathbf{u}^2)$$

# Метод простых итераций

**Доказательство:** Пусть выбрано нулевое приближение, а далее

$$\mathbf{u}_k^{s+1} = \boldsymbol{\varphi}_k (\mathbf{u}_1^s, \mathbf{u}_2^s, \dots, \mathbf{u}_n^s), \quad 1 \leq k \leq n$$

Погрешность в k-ой компоненте

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_k^{s+1} - \mathbf{u}_k^* &= \boldsymbol{\varphi}_k (\mathbf{u}_1^s, \mathbf{u}_2^s, \dots, \mathbf{u}_n^s) - \boldsymbol{\varphi}_k (\mathbf{u}_1^*, \mathbf{u}_2^*, \dots, \mathbf{u}_n^*) = \boldsymbol{\varphi}_k(\mathbf{u}^s) - \boldsymbol{\varphi}_k(\mathbf{u}^*) = \left[ \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}_k}{\partial \mathbf{l}} (\boldsymbol{\xi}_k) \right] \cdot \\ &\cdot \rho(\mathbf{u}^s, \mathbf{u}^*) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}_k(\boldsymbol{\xi}_k)}{\partial \mathbf{u}_j} (\mathbf{u}_j^s - \mathbf{u}_j^*) \end{aligned}$$

$\mathbf{l}$  — направление соединения точек  $\mathbf{u}^s$  и  $\mathbf{u}^*$   $\boldsymbol{\xi}_k$  некоторая точка на этом отрезке многомерного пространства

$$\|\mathbf{u}^{s+1} - \mathbf{u}^*\| \leq \|J\| \cdot \|\mathbf{u}^s - \mathbf{u}^*\| \leq \dots \leq q^{s+1} \|\mathbf{u}^0 - \mathbf{u}^*\|$$



# Метод Ньютона для систем

$$\mathbf{u}^{s+1} = \mathbf{u}^s - \mathbf{J}^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{u}^s)$$

В этом случае матрица Якоби отличается от матрицы метода простых итераций

$$J = \frac{d\mathbf{f}(\mathbf{u})}{d\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{u}_1} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial \mathbf{u}_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{f}_n}{\partial \mathbf{u}_1} & \cdots & \frac{\partial \mathbf{f}_n}{\partial \mathbf{u}_n} \end{pmatrix}$$

Достаточное условие сходимости имеет сложный вид и проверить его практически никогда не удастся. В достаточно малой окрестности корня итерации сходятся, причем сходимость квадратичная, если  $\det \mathbf{J} \neq 0$

Поэтому хорошим критерием окончания итераций является условие

$$\|\mathbf{u}^{s+1} - \mathbf{u}^s\| \leq \varepsilon$$

Для  $\varepsilon \sim 10^{-5} - 10^{-6}$  это означает 10 верных знаков для  $\mathbf{u}$ .

Самая трудоемкая операция в методе Ньютона – вычисление обратной матрицы. Поэтому иногда используют упрощенный метод Ньютона:

$$\mathbf{u}^{s+1} = \mathbf{u}^s - \mathbf{J}_0^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{u}^s)$$

Матрица Якоби обращается один раз. Метод приемлем, т.к. начальное приближение выбирается достаточно близко к корню.

Спасибо за внимание!