

건강정보

- 건강문제
- 치료방법
- 검사방법
- 생활습관 관리

심뇌혈관질환정보

약품/식품정보

장애/재활정보

희귀질환정보

암정보

응급상황정보

해외감염병정보

정신건강정보

눈꺼풀속말림과 겹말림


개요

등록일자 : 2020-07-27 업데이트 : 2022-03-18 조회 : 9805 정보신청 : 100

개요


눈꺼풀속말림은 눈꺼풀이 눈의 안쪽 방향으로 말리면서 눈꺼풀 피부나 속눈썹이 눈에 닿는 질환입니다. 속눈썹이 눈을 계속 찰라서 눈에 이물감과 자극감이 느껴지고, 눈의 겹면(각막)에 상처가 생겼다가 회복되는 과정이 반복되면서 각막이 혼탁해질 수 있습니다. 증상이 심하지 않은 경우 안약 또는 안연고 등의 약물치료만으로 충분하나 증상이 심할 경우 근본적인 치료는 수술을 통하여 교정하는 것입니다.

〈그림 오른쪽 아래눈꺼풀의 눈꺼풀속말림. 속눈썹이 눈을 찰르고 있는 것을 볼 수 있음〉



〈정상 눈꺼풀〉

〈눈꺼풀속말림〉



〈아래쪽 눈꺼풀속말림 환자의 사진〉


눈꺼풀속말림

눈꺼풀이 안으로 말리면서 피부나 눈꺼풀이 눈에 닿아 자극감을 주는 질환




반대로, 눈꺼풀겹말림은 눈꺼풀의 골격에 해당하는 눈꺼풀판이 눈과 반대방향인 바깥쪽으로 뒤집어진 것을 말합니다. 눈꺼풀겹말림으로 인해 눈물이 나고, 충혈, 자극감, 눈곱 등이 생길 수 있으며, 눈꺼풀겹말림 증상이 지속되어 눈동자가 계속 노출되면 각막이 굽히거나 혼탁해질 수도 있습니다.

〈그림 우안의 아래눈꺼풀 눈꺼풀겹말림〉



〈정상 눈꺼풀〉

〈눈꺼풀겹말림〉



〈아래쪽 눈꺼풀겹말림 환자의 사진〉

눈꺼풀겹말림

눈꺼풀이 바깥으로 뒤집어지면서 눈물흘림, 충혈, 자극감 등이 발생함



개요-종류

1. 눈꺼풀속말림

1) 퇴행성

가장 흔한 경우에 해당합니다. 나이가 들면서 아래눈꺼풀 근육이 약화되고 눈꺼풀이 이완되어 눈꺼풀테가 눈의 안쪽 방향으로 말려 들어가는 것이 원인입니다. 환자의 아래눈꺼풀을 눈의 바깥쪽 방향으로 잡아당겨 보면 쉽게 들어지는 것을 볼 수 있습니다.

〈그림 퇴행성 눈꺼풀속말림. 아래 속눈썹이 눈을 찌르고 있고 아래눈꺼풀을 아래로 당겼을 때 쉽게 늘어지는 것을 볼 수 있음〉



2) 선천성

태어날 때부터 아래눈꺼풀을 당기는 근육의 이상으로 인해 생깁니다. 소아에서 생기는 덧눈꺼풀과 흔히 혼동되기도 하나 선천성 눈꺼풀속말림은 덧눈꺼풀에 비해 매우 드문 질환입니다.

3) 반흔성

눈꺼풀 안쪽의 흉터와 아래눈꺼풀을 당기는 근육의 손상으로 인해 눈꺼풀이 눈의 안쪽 방향으로 말리게 되는 것을 말합니다.

4) 연축성

눈 주변 부위의 수술 후 또는 눈 주위의 염증과 같은 자극에 의하여 반사적으로 눈꺼풀경련이 발생하는 것이 원인입니다.

2. 눈꺼풀겉말림

1) 퇴행성

나이가 들면서 눈 주변 근육이 약해지고 눈꺼풀이 늘어지면서 생깁니다. 초기에는 눈꺼풀의 안쪽 부분에만 겉말림이 나타나다가 시간이 지나면서 서서히 그 증상이 진행하여 눈꺼풀의 가운데 부분에서도 겉말림 증상이 나타나고 마침내 눈꺼풀 전체의 겉말림으로 진행됩니다.

2) 마비성

얼굴신경(안면신경)마비로 인해 눈꺼풀을 감는 근육이 마비되어 눈꺼풀겉말림과 눈이 완전히 안 감기는 증상(토안)이 발생합니다.

3) 반흔성

외상, 수술, 질환 등에 의해 눈꺼풀 피부에 흉터가 있는 경우 발생할 수 있습니다.

증상

눈꺼풀속말림이 발생하면, 눈꺼풀과 속눈썹의 자극이 계속되어 이로 인해 결막충혈이 생기고 눈물이 고이거나 흐르며 눈곱이 자주 낍니다. 눈을 자주 만지거나 비비게 되면 눈꺼풀 주변의 피부가 짓무르기도 합니다.

눈꺼풀겉말림 환자들은 보통 자극감, 결막충혈, 혹은 눈물흘림 증상을 호소합니다. 눈물흘림증상은 눈물점(눈물이 내려가는 입구)이 눈 바깥쪽으로 뒤집어져 눈물층에 닿지 못하고 눈을 완전히 감지 못하게 되어 눈물을 코로 내려 보내는 펌프기능이 약해지면서 생기며, 노인 환자보다 젊은 환자가 불편을 더 호소할 수 있습니다. 또한 눈이 완전히 감기지 않으므로 눈의 자극감을 호소하고 결막충혈이 생기며 눈곱이 자주 끼게 됩니다.

눈꺼풀속말림에서는 안쪽으로 말려들어난 눈꺼풀 피부나 속눈썹이 안구표면을 자극하고, 눈꺼풀겉말림에서는 눈이 완전히 감기지 않아 안구표면이 노출되면서 안구표면에 상처가 생기는데, 심한 경우 각막에 궤양이 발생할 수도 있습니다. 장기간 상처가 생기고 치유되는 과정이 반복되면서 각막이 서서히 혼탁해 질 수 있고, 특히 궤양이 생겼던 경우 치유 과정에서 새로운 혈관이 자라나며 각막이 혼탁해지기도 합니다. 각막혼탁이 중심부를 침범하는 경우 영구적으로 시력이 떨어질 수 있습니다.

진단 및 검사

1. 문진

- 발생 시기
- 눈 주변의 수술을 받은 적이 있는지
- 아토피각결막염이 있는지

- 눈 주변의 화상 혹은 외상 병력이 있는지
- 얼굴신경마비가 있었는지

2. 눈 검사

1) 시력 검사 및 눈의 앞부분 검사

눈꺼풀속말림 혹은 눈꺼풀겉말림의 위치와 정도를 확인합니다.

2) 세극등현미경검사

동반된 각막의 손상 정도를 파악하고 결막 혹은 눈꺼풀 피부에 흉터가 있는지 확인합니다.

3) 눈꺼풀 수평이완검사

아래눈꺼풀을 아래로 당겼다가 놓아본 후 제 위치로 돌아가는 속도를 관찰합니다. 또한 아래눈꺼풀테의 중심부를 눈으로부터 앞쪽으로 당겨보아 6 mm 이상 늘어나면 눈꺼풀의 이완이 있다고 봅니다. 눈꺼풀 수평이완이 있는 경우 퇴행성 눈꺼풀속말림 혹은 눈꺼풀겉말림의 원인이 되며, 치료를 위해 교정이 필요합니다.

치료

1. 보존적 치료

환자가 불가피하게 수술을 받을 수 없는 상황에 있거나 증상이 경미한 경우에 보존적 치료를 시행해 볼 수 있습니다.

눈꺼풀속말림의 경우 인공눈물을 투여하고 눈꺼풀이 말려 들어가지 않게 반창고로 붙여놓거나 치료용 콘택트렌즈를 착용하여 증상을 완화시킬 수 있습니다.

눈꺼풀겉말림의 경우 인공눈물과 안연고를 자주 투여합니다. 특히, 얼굴신경마비 환자들은 잘 때 안연고를 눈 안에 넣어 눈을 보호하여야 하며, 아래눈꺼풀을 위쪽으로 올린 후 테이프를 붙이는 방법도 임시로 사용해 볼 수 있습니다.

각막의 상처가 심해 감염의 위험이 예상될 경우, 항생제를 점안하기도 합니다.

2. 수술적 치료

대부분 국소마취 하에 수술이 시행되며 눈꺼풀속말림, 눈꺼풀겉말림의 종류 및 정도에 따라 수술 방법이 달라집니다.

눈꺼풀속말림 중 가장 흔한 퇴행성눈꺼풀속말림의 경우 아래눈꺼풀을 당겨주는 근육을 눈꺼풀판에 부착시키고 눈꺼풀의 수평이완이 있는 경우 이를 단축시켜주는 수술이 보편적으로 시행됩니다.


반흔성 눈꺼풀속말림에서는 점막이식, 반흔성 눈꺼풀겉말림에서는 피부이식이 각각 필요하기도 합니다.

마비성 눈꺼풀겉말림에서는 아래눈꺼풀을 팽팽하게 하는 수술과 함께 눈썹치짐의 수술이 필요할 수 있습니다.

〈그림 아래눈꺼풀 눈꺼풀속말림 수술 전 및 수술 후 모습〉



〈그림 좌안 아래눈꺼풀 눈꺼풀겉말림 수술 전 및 수술 후 모습〉



합병증

수술 후 발생할 수 있는 합병증에는 다음과 같은 것이 있습니다.

- 저교정, 재발
- 과교정
- 흉터, 감염, 혈종

참고문헌

1. 대한성형안과학회 (2015). 성형안과학 제3판. 내외학술.
2. 김현승, 김효명, 성공재, 유영석 (2020). 안과학 제12판. 일조각.



본 공공저작물은 공공누리 "**출처표시+상업적이용금지+변경금지**" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

☰ 목록

[개인정보처리방침](#) [개인정보이용안내](#) [저작권정책 및 웹접근성](#)

[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 내 질병관리청
문의사항: 02-2030-6602 (평일 9:00-17:00, 12:00-13:00 제외) / 관리자 이메일 : nhis@korea.kr
COPYRIGHT © 2024 질병관리청. ALL RIGHT RESERVED

해외기관



유관기관



정부기관



※ 본 페이지에서 제공하는 내용은 참고사항일 뿐 게시물에 대한 법적책임은 없음을 밝혀드립니다. 자세한 내용은 전문가와 상담하시기 바랍니다.

