

증상

잠복기는 1개월 내지 3개월이며, 소수의 편충이 감염되었을 경우에는 가벼운 위장 증상 정도이지만, 많은 수 감염시에는 복통, 만성 설사, 점혈변, 빈혈, 체중감소, 드물게 직장이 항문을 통해 빠져나오는 직장탈출증도 생깁니다.

진단 및 검사

대변검사에서 특징적인 충란을 검출하면 확진할 수 있습니다.

예방 및 예방접종

감염자를 반드시 치료하여 전파를 방지하며, 인분의 위생적 처리로 토양오염 방지하고, 채소를 깨끗이 씻어 먹는 것이 중요합니다.

치료-약물 치료

알벤다졸(Albendazole) 400 mg을 1회 투여합니다.

대상별 맞춤 정보

환자 및 접촉자관리

편충증은 장내 기생충 질환으로, 그 환자를 따로 격리하거나 환자와 접촉했다고해서 그 사람을 따로 관리할 필요는 없는 질환입니다.

참고문헌

1. 질병관리본부 (2020). 감염병포털. <http://www.kdca.go.kr/npt/biz/npp/iss/parasitosisStatisticsMain.do>



공공누리
공공저작물 자유이용허락

본 공공저작물은 공공누리 "**출처표시+상업적이용금지+변경금지**" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

☰ 목록

[개인정보처리방침](#) [개인정보이용안내](#) [저작권정책 및 웹접근성](#)

[28159] 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 내 질병관리청
문의사항: 02-2030-6602 (평일 9:00-17:00, 12:00-13:00 제외) / 관리자 이메일 : nhis@korea.kr
COPYRIGHT @ 2024 질병관리청. ALL RIGHT RESERVED

해외기관



유관기관



정부기관



※ 본 페이지에서 제공하는 내용은 참고사항일 뿐 게시물에 대한 법적책임은 없음을 밝혀드립니다. 자세한 내용은 전문가와 상담하시기 바랍니다.

