
Consensus, 635 by_ki
Liparia
Stirtonanthus
Podalyria burchellii
54.7%
Podalyria cordata
Podalyria hirsuta
70.3%
Podalyria lanceolata
Podalyria orbicularis
60.9%
100%
Podalyria calyptrata
83.2%
Podalyria rotundifolia
Podalyria argentea
Podalyria variabilis
100%
Podalyria buxifolia
99.2%
Podalyria oleaefolia
Podalyria biflora
53.9%
Podalyria sericea
84%
Podalyria leipoldtii
98.4%
Podalyria myrtillifolia
50.4%
Podalyria microphylla
85.2%
Podalyria pearsonii
Consensus, 635 by_t_ki
Liparia
Stirtonanthus
Podalyria burchellii
88.3%
Podalyria cordata
Podalyria hirsuta
72.3%
Podalyria lanceolata
Podalyria orbicularis
87.1%
100%
Podalyria calyptrata
78.9%
Podalyria rotundifolia
Podalyria argentea
Podalyria variabilis
100%
Podalyria buxifolia
100%
Podalyria oleaefolia
Podalyria biflora
53.1%
Podalyria sericea
79.7%
Podalyria leipoldtii
95.7%
Podalyria myrtillifolia
55.1%
Podalyria microphylla
84%
Podalyria pearsonii


Mapping of tree−tree distances
Dispersion
mad
nn
mst
0.00
0.10
0.20
Mk: Equal rates
Mk−t: Neo/Trans
Clustering Info Distance
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
+ vs +
+ vs x
x vs x

Silhouette plot
n = 512
2 clusters C_j
j : n_j | $ave_{i \in Cj}$ s_i
1 : 256 | −0.05
2 : 256 | 0.08
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Silhouette width s_i
Average silhouette width : 0.02

	Burnin	PSRF	ESS	FrechESS	mdPsESS	steppingStn	pathSmpl
Mk: Equal rates	0.05	1.00159	722.038	842.804	745.653	−135.924	−135.703
Mk−t: Neo/Trans	0.05	1.00168	305.953	427.145	357.098	−134.874	−134.381