
Consensus, 1271 by_ki
Oistoceras figulinum
Amaltheus bifurcus
Amaltheus repressus
Amaltheus subbifurvus
Amaltheus talrosei
73.8%
Amaltheus conspectus
Amaltheus viligaensis
Amaltheus stokesi
Amaltheus wertheri
Amauroceras ferruginum
Amaltheus subnodosus
100%
Amaltheus gloriosus
Amaltheus striatus
Amaltheus gibbosus
Amaltheus gloriosus W
Amaltheus salebrosus
Pleuroceras becheteri
100%
Pleuroceras transiens
Pleuroceras quadratum
Pleuroceras solare
Pleuroceras apyrenum
Pleuroceras hawskerense
Pleuroceras paucicostatum
100%
Pleuroceras spinatum
Pleuroceras yeovilense
Consensus, 1271 by_t_ki
Oistoceras figulinum
Amaltheus bifurcus
Amaltheus repressus
Amaltheus subbifurvus
Amaltheus talrosei
81.6%
Amaltheus conspectus
Amaltheus viligaensis
Amaltheus stokesi
Amaltheus wertheri
Amauroceras ferruginum
Amaltheus subnodosus
100%
Amaltheus gloriosus
Amaltheus striatus
Amaltheus gibbosus
Amaltheus gloriosus W
Amaltheus salebrosus
Pleuroceras becheteri
100%
Pleuroceras transiens
Pleuroceras quadratum
Pleuroceras solare
Pleuroceras apyrenum
Pleuroceras hawskerense
Pleuroceras paucicostatum
98.8%
Pleuroceras spinatum
Pleuroceras yeovilense


Mapping of tree−tree distances
Dispersion
mad
nn
mst
0.00
0.10
0.20
Mk: Equal rates
Mk−t: Neo/Trans
Clustering Info Distance
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
+ vs +
+ vs x
x vs x

Silhouette plot
n = 512
2 clusters C_j
j : n_j | $ave_{i \in Cj}$ s_i
1 : 256 | 0.02
2 : 256 | −0.01
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Silhouette width s_i
Average silhouette width : 0.01

	Burnin	PSRF	ESS	FrechESS	mdPsESS	steppingStn	pathSmpl
Mk: Equal rates	0.05	1.00836	607.119	677.011	650.374	−186.17	−185.385
Mk−t: Neo/Trans	0.1	1.00528	543.657	621.13	598.386	−184.478	−183.543