

מבוא לתורת הקבוצות

משה קמנסקי

20 במאי 2024

1 מבוא

מטרת הקורס היא לתת מבוא לתורה של המבנים המתמטיים הכי בסיסיים, קבוצות. קבוצה A מאופיינת על-ידי אוסף האיברים ששייכים אליה: לכל עצם x , ניתן לשאול: האם x שייך ל- A ? אנחנו נסמן את הטענה ש- x שייך ל- A ב- $x \in A$. הנה כמה מהשאלות בהן נתמקד:

1.1 איזה מבנים מעניינים ניתן לתאר באמצעות קבוצות?

1. תכונות כתתי קבוצות

2. בניית קבוצות חדשות מקבוצות קיימות

3. יחסים ופעולות

1.2 איך אפשר לעבוד עם קבוצות אינסופיות?

1. קבוצות סופיות ואינסופיות

2. גדלים של קבוצות אינסופיות

3. על מה אפשר לעשות אינדוקציה?

1.3 מהן קבוצות?

1. הגישה האקסיומטית

2. הגדרה ותכונות של קבוצות מוכרות

1.4 כמה שאלות

1. האם לכל מרחב וקטורי יש בסיס?
2. האם קיים מספר ממשי שאינו אלגברי?
3. האם קיימת פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ שהיא חיבורית אבל לא רציפה?
4. האם אפשר להגדיר באופן סביר את האורך של כל תת-קבוצה של קטע ממשי חסום?
5. האם כל פונקציה מהטבעיים לטבעיים ניתנת לחישוב על-ידי תכנית מחשב?
6. האם קיימת קבוצה של נקודות במישור שכל ישר פוגש בשתי נקודות בדיוק?
7. האם המישור הוא איחוד של מעגלים זרים? מה לגבי המרחב התלת-מימדי?

2 תורת קבוצות אלמנטרית (תזכורת)

2.1 פעולות בסיסיות

1. הכלה
2. חיתוך, איחוד, הפרש, הפרש סימטרי
3. קבוצת חזקה

2.2 גרפים

מכפלה קרטזית, יחסים, פונקציות, תחום, תמונה, הרכבה, יחס הפוך

- הגדרה 2.2.1.** גרף הוא זוג $\Gamma = \langle X, R \rangle$ כאשר X קבוצה ו- $R \subseteq X \times X$ יחס מעל X . גרף
- הגדרה 2.2.2.** נניח ש- $\langle A, R \rangle$ ו- $\langle B, S \rangle$ שני גרפים ו- $f: A \rightarrow B$ פונקציה. אז נקראת העתקה (של גרפים) אם לכל $a, a' \in A$, אם aRa' אז $f(a)Sf(a')$. אם בנוסף גם הכיוון השני נכון (כלומר לכל $a, a' \in A$, אם $f(a)Sf(a')$ אז aRa'), אז נקראת שיכון. אם f העתקה שהפיכה כפונקציה, וההופכית היא גם העתקה של גרפים, אז f נקראת איזומורפיזם. העתקה
שיכון
איזומורפיזם

2.3 יחסי שקילות, מנות

- הגדרה 2.3.1.** יחס שקילות על קבוצה A הוא יחס סימטרי, טרנזיטיבי ורפלקסיבי מעל A . יחס שקילות
- דוגמה 2.3.2.** A קבוצת המשולשים במישור שאינם שווים שוקיים. יחס החפיפה על A הוא יחס שקילות, וכך גם יחס הדמיון. ◇

דוגמה 2.3.3. נניח ש- n מספר שלם, ו- $A = \mathbb{Z}$. נגדיר יחס E_n על \mathbb{Z} על-ידי: $mE_n k$ אם $n \mid m - k$, כאשר יחס החלוקה $p \mid q$ (כלומר " p מחלק את q ") מתקיים אם יש l שלם עבורו $q = pl$. אז לכל n שלם, E_n יחס שקילות (תרגיל) \diamond

אינטואיטיבית, יחס שקילות על A מבטא את הרעיון שאנחנו רוצים לזהות איברים שונים של A . דרך אחת שזה יכול לקרות היא שצרכי פונקציה מסוימת על האיברים הללו הם זהים.

הגדרה 2.3.4. אם $f : A \rightarrow B$ פונקציה, הגרעין של f הוא היחס $\ker(f) = \{ \langle a_1, a_2 \rangle \in A \times A \mid f(a_1) = f(a_2) \}$ הגרעין

תרגיל 2.3.5. הוכיחו שלכל $f : A \rightarrow B$, הגרעין של f הוא יחס שקילות.

דוגמה 2.3.6. נניח ש- $n > 0$ שלם, ונסמן $C_n = \{0, \dots, n-1\}$. נגדיר $r_n : \mathbb{Z} \rightarrow C_n$ על-ידי: $r_n(m)$ הוא השארית של m בחלוקה ב- n (כלומר, המספר היחיד $k \in C_n$ כך ש- $m - k$ מתחלק ב- n). אז $\ker(r_n) = E_n$ מדוגמה 2.3.3 (תרגיל). \diamond

נמשיך להשתמש בסימונים C_n, r_n ו- E_n מהדוגמה האחרונה גם בהמשך.

דוגמה 2.3.7. אם A קבוצת המשולשים במישור שאינם שווים שוקיים, נגדיר את $f : A \rightarrow B$ להיות הפונקציה שמתאימה לכל משולש את קבוצת אורכי הצלעות שלו (הבחירה במשולשים שאינם שווים שוקיים היא כדי להבטיח שהקבוצה הזו היא בת שלושה איברים בדיוק, ולכן ניתן לשחזר את אורכי כל הצלעות בצורה יחידה). לפי משפט החפיפה צלע-צלע-צלע, f היא העתקת מנה עבור יחס החפיפה. \diamond

תרגיל 2.3.8. מצאו פונקציה f על אותה קבוצת משולשים כך ש- $\ker(f)$ הוא יחס הדמיון

יחסי שקילות מהצורה $\ker(f)$ הם נוחים במיוחד: על מנת לקבוע האם a_1 ו- a_2 שקולים, מספיק לחשב את הערכים $f(a_i)$. לכן, מעניין לשאול אילו יחסי שקילות הם מהצורה הזו. מסתבר שהתשובה היא: כולם.

משפט 2.3.9. לכל יחס שקילות E על קבוצה A קיימת פונקציה $f : A \rightarrow B$ שהיא על, כך ש- $\ker(f) = E$. כל פונקציה כזו נקראת העתקת מנה עבור E .

העוקבת מנה

על-מנת להוכיח את המשפט, נציג את המינוח הבא: אם E יחס שקילות על A , ו- $a \in A$, מחלקת השקילות של a היא הקבוצה $[a]_E = \{a' \in A \mid aEa'\}$.

מחלקת השקילות

הוכחה. נגדיר $B = \{[a]_E \mid a \in A\}$ ו- $f : A \rightarrow B$ על ידי $f(a) = [a]_E$. \square

תרגיל 2.3.10. השלימו את ההוכחה (הנקודה העיקרית היא ש- $[a_1]_E = [a_2]_E$ אם ורק אם $a_1 E a_2$).

הערה 2.3.11. בניגוד למקובל במקומות אחרים, אנחנו לא נשתמש במפורש בבנייה שמופיעה בהוכחת המשפט (כלומר, בקבוצת מחלקות השקילות) אלא רק במשפט עצמו. הסיבה היא שהמידע הנוסף שהבנייה הזו מספקת אינו שימושי לרוב, ומאידך הגמישות שבבחירת העתקת מנה כלשהי היא לעתים שימושית ויותר אינטואיטיבית. למשל, ראינו את העתקת המנה r_n עבור היחס E_n , שהיא יותר טבעית מהבניה בהוכחה.

כאמור, ניתן לחשוב על יחס שקילות E על A כעל מושג מוחלש של שוויון בין איברי A . מנקודת המבט הזו, העתקת מנה $f: A \rightarrow B$ "שוכחת" את המידע הלא רלוונטי על איברי A , והופכת את השוויון המוחלש לשוויון ממש: aEa' אם ורק אם $f(a) = f(a')$. לכן, ניתן לחשוב על איבר $b \in B$ כמחזיק "המידע הרלוונטי" אודות $a \in A$ עבורו $f(a) = b$ (ההנחה ש- f מבטיחה שלכל $b \in B$ אכן קיים a כזה). לכן, מעניין להבין איזה מידע מעניין על A מושרה ל- B . נדגים זאת באמצעות השימוש הבא.

שלשה פיתגורית היא שלשה a, b, c של מספרים טבעיים כך ש- $a^2 + b^2 = c^2$ (לכן, הם אורכים של צלעות משולש ישר זווית). אנחנו רוצים להוכיח את הטענה הבאה:

טענה 2.3.12. לא קיימת שלשה פיתגורית בה אורכי הניצבים a, b הם אי-זוגיים.

על מנת להוכיח את הטענה הזו, נשתמש בטענה הבאה:

טענה 2.3.13. נניח ש- n טבעי חיובי, ו- $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow B$ העתקת מנה עבור E_n . אז קיימות פעולות יחידות \oplus ו- \odot על B המקיימות לכל $m, k \in \mathbb{Z}$ את השוויונות $\pi(m+n) = \pi(m) \oplus \pi(n)$ ו- $\pi(mn) = \pi(m) \odot \pi(n)$.

נוכיח את הטענה הזו בהמשך. בינתיים, נשים לב שהתנאים בטענה מאפשרים לחשב את הפעולות על כל זוג איברים: למשל, כדי לחשב את $b_1 \oplus b_2$, עלינו לבחור $a_i \in A$ כך ש- $\pi(a_i) = b_i$, ולחשב את $\pi(a_1 + a_2)$. הטענה מבטיחה שהתשובה אינה תלויה בבחירה של a_i . תכונות של הפעולות הללו גם ניתן להסיק מתוך הטענה. למשל:

תרגיל 2.3.14. הוכיחו שלכל $u, v, w \in B$ מתקיים $u \oplus v = v \oplus u$, $u \odot v = v \odot u$ ו- $u \odot (v \oplus w) = (u \odot v) \oplus (u \odot w)$ (במונחים של טענה 2.3.13).

עבור $n = 4$ ו- $\pi = r_4$, כמו בדוגמא 2.3.6, אפשר בקלות לחשב את טבלת ה"חיבור" וה"כפל" ב- C_4 , קבוצה בת ארבעה איברים. אנחנו בעיקר רוצים לשים לב שאם $u \in C_4$ זוגי (כלומר 0 או 2) אז $u \odot u = 1$ ואחרת $u \odot u = 0$. עכשיו אפשר להוכיח את טענה 2.3.12:

הוכחת טענה 2.3.12. נניח בשלילה שקיימים מספרים אי-זוגיים a, b ושלם c כך ש- $a^2 + b^2 = c^2$. נחשב את r_4 בשני הצדדים:

$$\begin{aligned} r_4(c) \odot r_4(c) &= r_4(c \cdot c) = r_4(a \cdot a + b \cdot b) = \\ &= (r_4(a) \odot r_4(a)) \oplus (r_4(b) \odot r_4(b)) = 1 \oplus 1 = 2 \in C_4 \end{aligned}$$

כאשר השוויון הלפני אחרון נובע מההנחה ש- a, b אי-זוגיים, ומהחשוב שעשינו לפני ההוכחה. אותו חישוב מראה שהגענו לסתירה, שכן צד שמאל חייב להיות 0 או 1. \square

על-מנת להשלים את ההוכחה, עלינו להוכיח את טענה 2.3.13. נשים לב ראשית שהטענה אינה טריוויאלית: ישנן פעולות על השלמים שלא מקיימות את התכונה המקבילה.

תרגיל 2.3.15. נסמן $m \star k = m^{|k|}$ עבור מספרים שלמים m, k . הוכיחו שלא קיימת פעולה \star על C_4 כך שלכל $m, k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $r_4(m \star k) = r_4(m) \star r_4(k)$.

אנחנו נוכיח את טענה 2.3.13 כמסקנה מטענה כללית על יחסי שקילות. אנחנו מתעניינים בטענה מהצורה הבאה: נתון יחס שקילות E על קבוצה A , עם העתקת מנה $\pi : A \rightarrow B$. יש לנו "מבנה מעניין" על A , ואנחנו מעוניינים להבין באיזה תנאי הוא "משרה" מבנה דומה על B . בטענה 2.3.13 המבנה המעניין היה פעולות החיבור והכפל. באופן כללי, זה יכול להיות למשל פונקציה מ- A , תת-קבוצה של A , יחס על A וכו'.

אנחנו נתמקד ראשית במקרה הפשוט של פונקציה. נתונה לנו פונקציה $g : A \rightarrow C$ (כאשר C קבוצה כלשהי). מתי הפונקציה הזו "משרה" פונקציה על B ? אנחנו שואלים האם קיימת פונקציה $\bar{g} : B \rightarrow C$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $g(a) = \bar{g}(\pi(a))$ (כלומר, האם הגודל g שאנחנו מודדים על איברי A תלוי בעצם רק במידע שבאמת מעניין אותנו, כלומר בתמונה של האיבר ב- B). נשים לב שאם זה המצב, ו- a' שקול ל- a , אז $g(a') = g(a) = \bar{g}(\pi(a)) = \bar{g}(\pi(a'))$. לכן, מצאנו תנאי הכרחי. מסתבר שהוא גם תנאי מספיק:

משפט 2.3.16. נניח ש- E יחס שקילות על קבוצה A , עם העתקת מנה $\pi : A \rightarrow B$, ונניח ש- $g : A \rightarrow C$ פונקציה כלשהי. אז התנאים הבאים שקולים:

1. קיימת פונקציה $\bar{g} : B \rightarrow C$ כך ש- $g = \bar{g} \circ \pi$.
2. לכל $a, a' \in A$, אם aEa' אז $g(a) = g(a')$ (במילים אחרות, $E \subseteq \ker(g)$).

אם התנאים מתקיימים, אז \bar{g} יחידה.

סוף הרצאה 1, 1
במאי 2024

הוכחה. כיוון אחד ראינו בדיוק לפני הניסוח של המשפט. בכיוון השני, נגדיר

$$\bar{g} = \{\langle \pi(a), g(a) \rangle \mid a \in A\}$$

נוכיח ש- \bar{g} פונקציה: אם $\langle u, w \rangle$ ו- $\langle u, v \rangle$ שייכים ל- \bar{g} אז קיים $a \in A$ כך ש- $u = \pi(a)$ ו- $v = g(a)$ וקיים $a' \in A$ כך ש- $\pi(a') = u$ ו- $g(a') = w$. כיוון ש- $\pi(a) = u = \pi(a')$, מתקיים aEa' ולכן לפי ההנחה $g(a) = g(a')$, כלומר $v = w$. השוויון $g = \bar{g} \circ \pi$ נובע ישירות מהבניה. העובדה ש- \bar{g} מוגדרת על B ויחידה נובעת מכך ש- π על: הערך של \bar{g} על כל איבר $b \in B$ נקבע על-ידי התנאי $g = \bar{g} \circ \pi$. \square

למשפט יש מספר מסקנות והכללות שימושיות:

מסקנה 2.3.17. נניח ש- E יחס שקילות על X , עם העתקת מנה $\pi_X : X \rightarrow \bar{X}$, ו- F יחס שקילות על Y , עם העתקת מנה $\pi_Y : Y \rightarrow \bar{Y}$. נניח ש- $h : Y \rightarrow X$ פונקציה. אז שני התנאים הבאים שקולים:

1. קיימת פונקציה $\bar{h} : \bar{Y} \rightarrow \bar{X}$ כך שלכל $y \in Y$ מתקיים $\pi_X(h(y)) = \bar{h}(\pi_Y(y))$.
2. לכל $y, y' \in Y$, אם yFy' אז $h(y)Eh(y')$.

הוכחה. נגדיר $g : Y \rightarrow \bar{X}$ על-ידי $g = \pi_X \circ h$. אז לכל $y, y' \in Y$ מתקיים: $g(y) = g(y')$ אם ורק אם $h(y)Eh(y')$. לכן, לפי משפט 2.3.16, התנאי השני שקול לקיומה של פונקציה $\bar{h} : \bar{Y} \rightarrow \bar{X}$ כך ש- $\bar{h} \circ \pi_Y = g = \pi_X \circ h$. כנדרש. \square

דוגמה 2.3.18. נניח ש- $X = Y = \mathbb{Z}$, $E = E_2$ ו- $F = E_6$, עם העתקות מנה r_2 ו- r_6 , כמו בדוגמא 2.3.6, ונניח ש- $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ נתונה על-ידי $h(n) = 7n$. אם nFn' אז $n - n'$ מתחלק ב-6. לכן $h(n) - h(n') = 7(n - n')$ מתחלק ב-6 ולכן גם ב-2, כלומר $h(n)Eh(n')$. המסקנה מבטיחה שקיימת פונקציה (יחידה) $\bar{h} : C_6 \rightarrow C_2$ עם התכונה: $\bar{h}(r_6(n)) = r_2(7n)$ לכל $n \in \mathbb{Z}$. במלים אחרות, הזוגיות של $7n$ (שנמדדת על-ידי r_2) תלויה רק בשארית של n ביחס ל-6: אם השארית הזו ידועה, אנחנו יודעים האם $7n$ זוגי. לא קשה לחשב את \bar{h} : לכל $k \in C_6$ מתקיים $\bar{h}(k) = 1$ אם ורק אם k אי-זוגי (כמספר טבעי). אפשר גם לחשוב על אותה דוגמא כאשר מחליפים בין E ו- F . במקרה הזה, אין \bar{h} המקיימת $\bar{h}(r_2(n)) = r_6(7n)$: השארית של $7n$ ביחס ל-6 לא תלויה רק בזוגיות של n , איבדנו יותר מדי מידע. \diamond

מסקנה 2.3.19. נניח ש- E יחס שקילות על קבוצה X עם העתקת מנה $\pi : X \rightarrow \bar{X}$, ו- $h : X \times X \rightarrow X$ פונקציה. אז התנאים הבאים שקולים:

1. קיימת פונקציה (יחידה) $\bar{h} : \bar{X} \times \bar{X} \rightarrow \bar{X}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in X$ מתקיים $\bar{h}(\pi(x_1), \pi(x_2)) = \pi(h(x_1, x_2))$.

2. לכל $x_1, x'_1, x_2, x'_2 \in X$, אם $x_1Ex'_1$ ו- $x_2Ex'_2$ אז $h(x_1, x_2)Eh(x'_1, x'_2)$.

לפני שנוכיח את המסקנה, נסיק ממנה את טענה 2.3.13.

הוכחת טענה 2.3.13. ניקח $X = \mathbb{Z}$ עם $E = E_n$ ו- $h : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ פונקציית החיבור $h(m, k) = m + k$. התנאי הראשון במסקנה 2.3.19 מבטיח פונקציה (יחידה) $\bar{h} : B \times B \rightarrow B$ כך שלכל $m, k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $\bar{h}(\pi(m), \pi(k)) = \pi(h(m, k))$. כלומר $\bar{h} \oplus = \pi$. היא בדיוק הפונקציה שאנחנו מחפשים.

המסקנה אומרת שקיומה של הפונקציה הזו שקול לתנאי שאם mEm' וגם kEk' אז $m + kEm' + k'$. ההנחה במקרה שלנו היא ש- $m - m'$ מתחלק ב- n וגם $k - k'$ מתחלק ב- n . אם זה אכן המצב, אז גם הסכום שלהם $m - m' + k - k' = m + k - (m' + k')$ מתחלק ב- n , כנדרש. \square

ההוכחה עבור כפל דומה (תרגיל).

סוף הרצאה 2, 6
במאי, 2024

עכשיו נוכיח את המסקנה

הוכחת מסקנה 2.3.19. נסמן ב- F את היחס על $Y = X \times X$ הנתון על-ידי $\langle x_1, x_2 \rangle F \langle x'_1, x'_2 \rangle$ אם $x_1Ex'_1$ וגם $x_2Ex'_2$. אז F הוא הגרעין של הפונקציה $\pi_Y : X \times X \rightarrow \bar{X} \times \bar{X}$ הנתונה על-ידי $\pi_Y(x_1, x_2) = \langle \pi(x_1), \pi(x_2) \rangle$ (בפרט, הוא יחס שקילות), וכיוון ש- π_Y על, זוהי העתקת מנה עבור F . עכשיו הטענה נובעת מיידית ממסקנה 2.3.17. \square

מסקנה 2.3.20. נניח ש- E יחס שקילות על קבוצה X עם מנה $\pi : X \rightarrow \bar{X}$, ונניח ש- $S \subseteq X$ תת-קבוצה. אז התנאים הבאים שקולים:

1. קיימת תת-קבוצה $\bar{S} \subseteq \bar{X}$ כך שלכל $x \in X$ מתקיים: אם $x \in S$ אז ורק אם $\pi(x) \in \bar{S}$.

2. לכל $x, x' \in X$, אם xEx' אז $x \in S$ אם ורק אם $x' \in S$.

הוכחה. נגדיר $C = \{0, 1\}$, ו- $g : X \rightarrow C$ הפונקציה המציינת של S , כלומר: $g(x) = 1$ אם ורק אם $x \in S$. אז התנאי השני שקול לתנאי השני עבור g במסקנה 2.3.17. לכן, לפי אותה מסקנה, הוא שקול לקיומה של פונקציה $\bar{g} : \bar{X} \rightarrow C$ כך ש- $\bar{g}(\pi(x)) = g(x)$ לכל $x \in X$. נגדיר $\bar{S} = \bar{g}^{-1}[\{1\}]$. אז התנאי האחרון שקול לתנאי הראשון במסקנה (תרגיל). \square

דוגמה 2.3.21. נניח שאני יודע מהי השארית של מספר שלם m ביחס ל-7. האם אני יכול לגלות אם m הוא זוגי? התשובה היא לא: ל-3 ול-10 זוגיות שונה, אבל אותה שארית ביחס ל-7. זהו המקרה של מסקנה 2.3.20 בו $S \subseteq X = \mathbb{Z}$ קבוצת הזוגיים.

התשובה שונה אם מחליפים את 7 ב-6: לכל שני מספרים שההפרש ביניהם מתחלק ב-6 אותה זוגיות. הקבוצה $\bar{S} \subseteq C_6$ מהמסקנה היא, במקרה הזה, $\{0, 2, 4\}$. \diamond

הערה 2.3.22. נשים לב לעקרון הכללי שהשתמשנו בו בהוכחת מסקנה 2.3.20: יש התאמה טבעית בין תתי-קבוצות S של קבוצה X , ופונקציות $c : X \rightarrow \{0, 1\}$. ההתאמה נתונה על-ידי: לכל תת-קבוצה $S \subseteq X$ מתאימה הפונקציה $c_S : X \rightarrow \{0, 1\}$ המוגדרת כ- $c_S(x) = 1$ אם ורק אם $x \in S$. הפונקציה c_S נקראת הפונקציה המציינת של S . בכיוון ההפוך, אם $c : X \rightarrow \{0, 1\}$ פונקציה כלשהי, מתאימה לה קבוצה $S_c = \{x \in X \mid c(x) = 1\}$.

הפונקציה המציינת

תרגיל 2.3.23. הוכיחו (בסימונים של הערה 2.3.22) שלכל $S \subseteq X$ מתקיים $S = S_{c_S}$, ולכל $c : X \rightarrow \{0, 1\}$ מתקיים $c = c_{S_c}$ (כלומר, שתי ההתאמות הפוכות אחת לשנייה).

לסיום, נאמר מילה על יחידות המנה והעתקת המנה. כפי שכבר ראינו, בהינתן יחס שקילות E על X , ישנן לרוב הרבה העתקות מנה עבור E (וראינו שלעתים זה מועיל). למרות זאת, נסביר בתרגיל הבא שניתן לזהות כל שתיים מהן באופן יחיד.

תרגיל 2.3.24. נניח ש- E יחס שקילות על קבוצה X , עם העתקת מנה $\bar{X} : X \rightarrow \bar{X}$.

1. נניח ש- $h : \bar{X} \rightarrow \bar{X}$ פונקציה המקיימת $h \circ \pi = \pi \circ h$. הוכיחו ש- h היא הזהות.

2. נניח ש- $\pi_1 : X \rightarrow \bar{X}_1$ העתקת מנה נוספת עבור E . הוכיחו שקיימת פונקציה יחידה $f : \bar{X} \rightarrow \bar{X}_1$ כך ש- $f \circ \pi = \pi_1$, ופונקציה יחידה $g : \bar{X}_1 \rightarrow \bar{X}$ כך ש- $g \circ \pi_1 = \pi$ (רמז: משפט 2.3.16).

3. הוכיחו ש- f ו- g הפוכות אחת לשנייה.

בגלל התרגיל הזה, לרוב מתייחסים אל העתקת מנה שונות (עבור יחס שקילות נתון) כאל אובייקט יחיד, וקוראים לו העתקת המנה.

2.3.25 מנות במרחבים וקטוריים

נניח ש- $T : U \rightarrow V$ העתקה ליניארית בין שני מרחבים וקטוריים מעל שדה k . כמו לכל פונקציה, ל- T יש גרעין $E = \ker(T) = \{\langle u_1, u_2 \rangle \mid u_1, u_2 \in U, T(u_1) = T(u_2)\}$. אבל המבנה הליניארי מאפשר לרשום את התנאי האחרון כ- $T(u_1 - u_2) = T(u_1) - T(u_2) = 0$, כלומר $u_1 - u_2 \in \ker(T)$. $\underline{\ker}(T) = \{u \in U \mid T(u) = 0\} \subseteq U$ היא הקבוצה שנקראת

הגרעין של T באלגברה לינארית. זוהי בדיוק מחלקת השקילות של 0 ביחס ל- E . אז המידע של E ושל $\ker(T)$ שקול עבור העתקות לינאריות. איזה תתי-קבוצות W של U הן מהצורה $\ker(T)$ עבור העתקה לינארית T כלשהי? האבחנה הבסיסית היא שאם W היא גרעין של העתקה לינארית, אז W תת-מרחב וקטורי. מסתבר, שזו ההגבלה היחידה.

משפט 2.3.26. נניח ש- W תת-מרחב וקטורי של מרחב וקטורי U מעל שדה k . אז קיים מרחב וקטורי V והעתקה לינארית $T: U \rightarrow V$ כך ש- T על W היא $\ker(T)$.

הוכחה. נגדיר יחס E על U על-ידי: $u_1 E u_2$ אם $u_1 - u_2 \in W$. זהו יחס שקילות (תרגיל). לפי משפט 2.3.9, קיימת ל- E העתקת מנה $T: U \rightarrow V$ (בפרט T על). עלינו להגדיר מבנה של מרחב וקטורי על V , עבורו T תהיה העתקה לינארית. ביתר פירוט, עלינו להראות:

1. קיימת פעולה $\oplus: V \times V \rightarrow V$ כך שלכל $u_1, u_2 \in U$ מתקיים $T(u_1 + u_2) = T(u_1) \oplus T(u_2)$

2. לכל $c \in k$, קיימת פונקציה $f_c: V \rightarrow V$ (הכפלה בסקלר c), המקיימת לכל $u \in U$ ש- $T(cu) = f_c(T(u))$.

3. ביחד עם הפעולות \oplus והכפל בסקלרים שנתון על-ידי $c \cdot_V v = f_c(v)$ לכל $c \in k$ ו- $v \in V$ מקיימים את ההגדרה של מרחב וקטורי מעל k .

על מנת להוכיח את (1), נשתמש במסקנה 2.3.19, עבור הנתונים $X = U$, יחס השקילות E שהגדרנו, $\bar{X} = V$ ו- $\pi = T$, כאשר $h: X \times X \rightarrow X$ פונקציית החיבור של U . התנאי הראשון באותה מסקנה מבטיח שקיימת פונקציה $\bar{h}: V \times V \rightarrow V$ כך שלכל $u_1, u_2 \in U$ מתקיים $T(u_1 + u_2) = \bar{h}(T(u_1), T(u_2)) = T(u_1) \oplus T(u_2)$. כלומר בדיוק תנאי (1) שלנו. לכן, מספיק להוכיח את התנאי השקול באותה מסקנה, כלומר שלכל $u_1, u_2, u'_1, u'_2 \in U$ אם $u_1 E u'_1$ וגם $u_2 E u'_2$ אז $u_1 + u_2 E u'_1 + u'_2$. לפי הגדרת E , ההנחה פירושה ש- $u_1 - u'_1 \in W$ ו- $u_2 - u'_2 \in W$. כיוון ש- W תת-מרחב, הוא סגור לחיבור, ולכן גם $u_1 + u_2 - (u'_1 + u'_2) = (u_1 - u'_1) + (u_2 - u'_2) \in W$. (2.3.13). באופן דומה, כדי להוכיח את (2), נקבע $c \in k$, ונשתמש במסקנה 2.3.17 עבור $X = Y = U$, $\bar{X} = \bar{Y} = V$ ו- $\pi_X = \pi_Y = T$, כאשר h היא פונקציית הכפל בסקלר ב- U , כלומר $h(u) = cu$. עלינו לבדוק שאם $u E u'$ אז $cu E cu'$, כלומר שאם $u - u' \in W$ אז גם $cu - cu' = c(u - u') \in W$. וזה נובע מהעובדה שתת-המרחב W סגור לכפל בסקלר c . תכונות המרחב הווקטורי נובעות בקלות ממה שכבר הוכחנו. למשל, על-מנת להוכיח ש- $v_1 \oplus v_2 = v_2 \oplus v_1$ לכל $v_1, v_2 \in V$, נבחר $u_1, u_2 \in U$ כך ש- $T(u_i) = v_i$ (זה אפשרי משום ש- T על). אז

$$\begin{aligned} v_1 \oplus v_2 &= T(u_1) \oplus T(u_2) = T(u_1 + u_2) = \\ &= T(u_2 + u_1) = T(u_2) \oplus T(u_1) = v_2 \oplus v_1 \end{aligned}$$

□

הוכחת יתר האקסיומות דומה.

תרגיל 2.3.27. השלימו את ההוכחה

מרחב V כמו במשפט נקרא מרחב מנה של U ב- W , ומסומן ב- U/W . ההעתקה T נקראת העתקת מנה. כמו במקרה של קבוצות, מרחב המנה והעתקת המנה אינם יחידים, אבל הם יחידים עד כדי העתקה לינארית יחידה:

תרגיל 2.3.28. נניח ש- $W \subseteq U$, ו- $T_1 : U \rightarrow V_1$ ו- $T_2 : U \rightarrow V_2$ שתי העתקות מנה עבור W . הוכיחו שקיימת העתקה לינארית הפיכה יחידה $S : V_1 \rightarrow V_2$ כך ש- $S \circ T_1 = T_2$.

סוף הרצאה 3, 8
במאי, 2024

2.4 יחסי סדר

הגדרה 2.4.1. יחס סדר על קבוצה X הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל X . קבוצה סדורה חלקית (קס"ח) היא זוג $\langle X, R \rangle$ כאשר X קבוצה לא ריקה, ו- R יחס סדר מעל X .

יחס סדר
קבוצה סדורה חלקית (קס"ח)

דוגמה 2.4.2. קבוצות המספרים \mathbb{N}, \mathbb{Z} ו- \mathbb{Q} עם הסדר הרגיל $R = \leq$.

דוגמה 2.4.3. אם A קבוצה כלשהי, אז \subseteq הוא יחס סדר על קבוצת החזקה $X = \mathcal{P}(A)$.

אם $\langle X, R \rangle$ קס"ח ו- $Y \subseteq X$, אז הצמצום $R \upharpoonright_Y = R \cap (Y \times Y)$ הוא יחס סדר על Y . לעתים נמשיך לסמן R במקום $R \upharpoonright_Y$.

דוגמה 2.4.4. המקרים הפרטיים הבאים עשויים להיות מעניינים: אם A קבוצה, נגדיר $\mathcal{F}(A) = \{B \subseteq A \mid B \text{ סופית}\}$ ו- $\Phi(A) = \mathcal{F}(A) \cup \{B \subseteq A \mid A \setminus B \in \mathcal{F}(A)\}$.

דוגמה 2.4.5. יחס החלוקה \mid הוא יחס סדר על \mathbb{N} , אך אינו סדר חלקי על \mathbb{Z} : מתקיים $1 \mid -1$ ו- $-1 \mid 1$, למרות שהם שונים.

דוגמה 2.4.6. נניח ש- A קבוצה. נגדיר יחס \leq על $X = \mathcal{P}(A)$ על-ידי: $B \leq C$ אם יש קבוצה סופית D כך ש- $B \subseteq C \cup D$ (נאמר ש- B "כמעט מוכלת" ב- C במצב הזה). היחס \leq רפלקסיבי וטרנזיטיבי, אך אינו אנטי-סימטרי: למשל, לכל שתי קבוצות סופיות B, C מתקיים $B \leq C$. אינטואיטיבית, אם $B \leq C$ ו- $C \leq B$, כלומר כל אחת מהן "כמעט מוכלת" בשניה, היינו רוצים לומר שהן "כמעט שוות", ולהתייחס אליהן כאל אותו איבר. ראינו איך ניתן לעשות זאת: עלינו לחלק ביחס שקילות. בתרגיל הבא נעשה זאת באופן כללי.

תרגיל 2.4.7. נניח ש- \leq יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי על קבוצה X (יחס כזה נקרא קדם סדר). נגדיר יחס \sim על X על-ידי: $x \sim y$ אם $x \leq y$ וגם $y \leq x$.

1. הוכיחו ש- \sim יחס שקילות על X .

2. נניח ש- $p : X \rightarrow B$ העתקת מנה עבור \sim . הוכיחו שקיים יחס יחיד \leq על B כך שלכל $x, y \in X$ מתקיים $x \leq y$ אם ורק אם $p(x) \leq p(y)$.

3. הוכיחו \leq יחס סדר על B .

4. נניח ש- $q : Y \rightarrow C$ פונקציה, ו- R יחס סדר על C . נגדיר $\tilde{R} = \{\langle x, y \rangle \in Y \times Y \mid \langle q(x), q(y) \rangle \in R\}$. הוכיחו ש- \tilde{R} קדם-סדר, אך לא בהכרח סדר.

5. הוכיחו ש- $|\cdot|$ קדם-סדר על \mathbb{Z} , ושפונקציית הערך המוחלט $|\cdot| : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ היא העתקת מנה עבור יחס השקילות המתאים \sim . תארו את יחס הסדר שמתקבל מהבנייה בסעיפים הקודמים.

6. הוכיחו שבדוגמא האחרונה, יחס השקילות שמתקבל מקדם הסדר הוא: $B \sim C$ אם ורק אם $B \triangle C$ סופית.

יחסי סדר הם טבעיים ונפוצים מאוד במתמטיקה, האם יש לנו אפשרות להבין, באיזשהו אופן, מהם כל יחסי הסדר? בשלב ראשון, עלינו להבין איך להשוות בין שני יחסי סדר שונים, ובפרט להבין מתי הם אותו דבר, עד כדי "שינוי שמות". כיוון שקס"ח היא מקרה פרטי של גרף, המושגים העתקה, שיכון ואיזומורפיזם תקפים גם עבורו. בהקשר הזה, העתקה של גרפים נקראת גם העתקה שומרת סדר. נשים לב לעובדה שמקילה על הבדיקה שהעתקה היא איזומורפיזם:

העניקה שומרת סדר

תרגיל 2.4.8. נניח ש- $f : X \rightarrow Y$ שיכון מגרף אנטי-סימטרי $\langle X, R \rangle$ לגרף רפלקסיבי $\langle Y, S \rangle$. אז f חז"ע

בפרט, ההנחות בתרגיל חלות אם R, S יחסי סדר.

דוגמה 2.4.9. הקס"ח $X = \langle \mathcal{P}(\{2, 3, 5\}), \subseteq \rangle$ איזומורפית לקס"ח $Y = \langle \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}, |\cdot| \rangle$. איזומורפיזם $f : X \rightarrow Y$ נתון על-ידי $f(A) = \Pi A$. מכפלת האיברים ב- A , עם הופכית $g : Y \rightarrow X$ המוגדרת על-ידי: $g(n)$ קבוצת הגורמים הראשוניים של n . (תרגיל)

דוגמה 2.4.10. הקס"ח $X = \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ איזומורפית לקס"ח $Y = \langle \mathbb{Z}, \geq \rangle$, איזומורפיזם נתון על-ידי $f(n) = -n$. כיוון ש- $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{Z}}$, זוהי העתקה הפיכה, וההפוכה היא העתקה.

דוגמה 2.4.11. נניח ש- A קבוצה. אז $X = \langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ איזומורפית ל- $\langle \mathcal{P}(A), \supseteq \rangle$: העתקה $f : X \rightarrow X$ נתונה על-ידי $f(B) = A \setminus B$, וזה איזומורפיזם, שוב משום ש- $f \circ f = \text{Id}_X$. (תרגיל)

האם כל קס"ח איזומורפית לקס"ח ההפוך? נראה ש- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ אינה איזומורפית ל- $\langle \mathbb{N}, \geq \rangle$, אבל איך ניתן להוכיח זאת? ב- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ יש מינימום: איבר $a = 0 \in \mathbb{N}$ כך $a \leq b$ לכל $b \in \mathbb{N}$. אם f איזומורפיזם של הקס"ח לקס"ח כלשהו $\langle Y, S \rangle$, אז $f(0)$ יהיה מינימום ב- Y . לכן, אם ב- Y אין מינימום, אז Y לא יכולה להיות איזומורפית ל- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$. בפרט, זה המצב ב- $\langle \mathbb{N}, \geq \rangle$: מינימום בקס"ח זו הוא מקסימום ב- $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$, וזה לא קיים.

את העקרון הזה ניתן להכליל: כיוון שקס"ח איזומורפיות הן "אותו קסח בשינוי שמות האיברים", כל תכונה של יחסי סדר שמוגדרת רק במונחי היחס נשמרת תחת איזומורפיזם, ולכן אם התכונה מופיעה רק באחת הקס"ח, אז הן אינן איזומורפיות.

דוגמה 2.4.12. האם $X = \langle \mathbb{N}, |\cdot| \rangle$ איזומורפית לקסח ההפוך $Y = \langle \mathbb{N}, |\cdot|^{-1} \rangle$? בשתייהן יש מינימום ומקסימום, אז הגישה הקודמת לא תעזור. למינימום 1 ב- X יש התכונה הבאה: קיים איבר $b \neq 1$ (ולכן בהכרח גדול ממנו), כך שאין אף איבר שנמצא ממש בין 1 ל- b : למשל $b = 5$ (או באופן כללי, כל ראשוני שונה מ-0). איבר b כזה נקרא עוקב מידי של 1. אם קיים איזומורפיזם f מ- X ל- Y , אז $f(1) = 0$ (כי f שומר על המינימום), ואם $b \in X$ עוקב מידי של 1, אז $f(b)$ צריך להיות עוקב מידי של 0 ב- Y , אבל ל-0 אין עוקבים מידיים ב- Y (תרגיל).

ננסה את ההגדרה שהופיעה בדוגמא.

הגדרה 2.4.13. נניח ש- $\langle X, \leq \rangle$ קס"ח.

איבר מינימלי (מזערי)

1. איבר $a \in X$ נקרא איבר מינימלי (מזערי) אם לא קיים $b \neq a$ ב- X כך ש- $b \leq a$.

עוקב
עוקב מידי

2. אם $a \in X$ איבר כלשהו, עוקב של a הוא איבר $b \in X$ המקיים $b \leq a$ ו- $a \neq b$. עוקב מידי של a הוא איבר מינימלי בקבוצת העוקבים של a .

איבר מקסימלי (מירבי)
קודם
קודם מידי

3. המושגים איבר מקסימלי (מירבי), קודם וקודם מידי מוגדרים כמושגים המקבילים עבור הסדר ההפוך \leq^{-1} .

תרגיל 2.4.14. הוכיחו ש- b עוקב מידי של a אם $a \leq b$, $a \neq b$ ולכל $c \in X$, אם $c \leq b$ ו- $c \leq a$ אז $a = c$ או $b = c$.

כאמור, כל תכונה של סדר (או, באופן כללי, של גרפים) נשמרת על-ידי איזומורפיזמים. אין לנו (כרגע) אפשרות לנסח במדויק מה זה "תכונה של סדר", ולכן נסתפק בדוגמאות. הטענה הבאה מנוסחת עבור המושגים שהזכרנו עד כה, אבל נכונה גם ליתר התכונות שמופיעות בהמשך.

טענה 2.4.15. נניח ש- $\langle X, R \rangle$ ו- ppY, S שני גרפים, ו- $f : X \rightarrow Y$ איזומורפיזם.

1. X רפלקסיבי, סימטרי, אנטי סימטרי, או טרנזיטיבי אם ורק אם Y כזה. בפרט, X קס"ח אם ורק אם Y קס"ח.

2. $a \in X$ מינימום, מקסימום, מינימלי או מקסימלי אם ורק אם $f(a) \in Y$ הוא כזה. בפרט, ב- X יש מינימום אם ורק אם ב- Y הוא ישנו, ובדומה עבור התכונות האחרות.

3. $b \in X$ עוקב מידי של $a \in X$ אם ורק אם $f(b)$ עוקב מידי של $f(a)$ (ובדומה עבור קודם מידי).

הערה 2.4.16. ההגדרות של מינימום, מינימלי וכו' נוסחו עבור קבוצות סדורות, אבל הן תקפות לגרפים כלשהם.

הוכחה. נוכיח עבור עוקבים מידיים. נשתמש בניסוח בתרגיל 2.4.14. נניח ש- $a, b \in X$ ו- b עוקב מידי של a . עלינו להוכיח ש- $f(a)Sf(b)$, ש- $f(a) \neq f(b)$, ושכל $d \in Y$, אם $f(a)Sd$ ו- $f(b)Sd$, אז $d = f(a)$ או $d = f(b)$. התנאי הראשון נובע ישירות מכך ש- f העתקה, והשני מכך ש- f חז"ע. נסמן ב- g את ההפכית של f , ונשתמש ב- g על-מנת לתרגם את הבעיה מ- Y ל- X .

נסמן $c = g(d)$. כיוון ש- $f(a)Sd$ ו- g העתקה, $g(f(a))Rg(d) = c$. כיוון ש- g הפוכה ל- f , מתקיים $g(f(a)) = a$. לכן aRc . באופן דומה, $c = g(d)Rg(f(b)) = b$. כיוון ש- b עוקב מידי של a , נובע מזה ש- $a = c$ או $a = b$. לכן, $f(a) = f(c) = f(g(d))$ או $f(a) = f(b)$. $f(g(d)) = f(c) = f(b)$. \square כנדרש.

תרגיל 2.4.17. הוכיחו את הסעיפים האחרים

הערה 2.4.18. במונחים של הסעיף הקודם, אפשר לנסח את הטענה כך: היחס " X איזומורפי ל- Y " הוא יחס שקילות על האוסף \mathcal{G} של כל הגרפים (או על אוסף כל הקס"חים). אם $\pi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{B}$ העתקת מנה עבורו, התכונות מהטענה (כמו קיום מינימום) מוגדרות על \mathcal{B} .

אם $\langle X, \leq \rangle$ קסה, נסמן ב- \leq את היחס Id_X .

דוגמה 2.4.19. הקס"חים \mathbb{Z} ו- \mathbb{Q} אינם איזומורפיים: ב- \mathbb{Z} לכל איבר יש עוקב מידי, וב- \mathbb{Q} לאף איבר אין. \diamond

הגדרה 2.4.20. נניח ש- $\langle X, \leq \rangle$ קס"ח. נאמר ש- X היא צפופה אם לכל $x, y \in X$, אם $x < y$ אז צפופה יש $a \in X$ כך ש- $x < a < y$.

דוגמה 2.4.21. \mathbb{Q} צפופה, אבל \mathbb{Z} לא (עם הסדר הרגיל) \diamond

תרגיל 2.4.22. קסח X היא צפופה אם ורק אם לאף איבר ב- X אין עוקב מידי.

הגדרה 2.4.23. שני איברים x, y בקסח $\langle X, \leq \rangle$ ניתנים להשוואה אם מתקיים $x \leq y$ או $y \leq x$. ניתנים להשוואה קווי מלא הקסח X נקרא קווי (או מלא) אם כל שני איברים ב- X ניתנים להשוואה.

דוגמה 2.4.24. $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ אינה איזומורפית ל- $\langle \mathbb{N}_+, | \rangle$ (כאשר \mathbb{N}_+ הטבעיים החיוביים): \leq הוא קווי ו- $|$ לא. \diamond

עבור סדרים קוויים, הכיוון ההפוך לתרגיל 2.4.8 תקף:

תרגיל 2.4.25. אם $f : X \rightarrow Y$ העתקה חח"ע שומרת סדר מסדר קווי X לקס"ח Y , אז f שיכון.

אינטואיטיבית, יחסי סדר קוויים הם "גדולים": הם מחליטים על הכי הרבה זוגות. לכן, טבעי לשאול, האם כל יחס סדר ניתן להרחבה לסדר קווי. הטענה הבאה מאפשרת לנסח את השאלה מחדש.

נניח ש- X קבוצה, ונסמן ב- $\mathcal{O}(X)$ את קבוצת כל יחסי הסדר על X . זוהי תת-קבוצה של $\mathcal{P}(X \times X)$ ולכן סדורה על-ידי הכלה.

טענה 2.4.26. יחס סדר \leq על קבוצה X הוא קווי אם ורק אם הוא איבר מירכי ב- $\mathcal{O}(X)$.

לכן, אפשר להמיר את השאלה "האם \leq ניתן להרחבה לסדר קווי?" בשאלה "האם יש יחס סדר על X שמרחיב את \leq והוא מירכי ביחס להכלה?". בהמשך נענה על השאלה הזו. על-מנת להוכיח את הטענה, נשתמש בתרגיל הבא:

תרגיל 2.4.27. נניח ש- \leq יחס סדר על X , ונניח ש- $x, y \in X$ לא מקיימים $y \leq x$. אז קיים יחס סדר \leq_1 על X שמרחיב את \leq , כך ש- $y \leq_1 x$.

הוכחת הטענה. נניח ש- \leq קווי, ונניח בשלילה שיש איבר \leq' ב- $\mathcal{O}(X)$ שמרחיב את \leq . אז יש $x, y \in X$ כך ש- $y \leq' x$ אבל $x \not\leq y$. כיוון ש- \leq קווי, נובע מזה ש- $y \leq x$, ולכן גם $y \leq' x$. בסתירה לאנטי-סימטריות של \leq' .

בכיוון השני, נניח ש- \leq מירכי ב- $\mathcal{O}(X)$, אבל לא קווי. אז יש $x, y \in X$ שלא ניתנים להשוואה לפי \leq . לפי התרגיל האחרון, קיים \leq_1 שמרחיב את \leq כך ש- $y \leq_1 x$. זו סותר את המירכיות. \square

2.4.28 חסמים עליונים

נניח ש- A קבוצה אינסופית. האם $\mathcal{P}(A)$ איזומורפית ל- $\Phi(A)$? התכונות שראינו עד כה לא מאפשרות להבדיל ביניהן.

נזכיר שאם \mathcal{C} היא קבוצה של קבוצות, האיחוד האוני של \mathcal{C} הוא הקבוצה

$\bigcup C = \{x \mid \exists A \in C, x \in A\}$ אם C תת-קבוצה של $\Phi(A)$ (ולכן בפרט של $\mathcal{P}(A)$), אז $\bigcup C \in \mathcal{P}(A)$, אבל לא בהכרח ב- $\Phi(A)$. האם אפשר להשתמש באבחנה הזו כדי להבדיל בין שתי הקבוצות הסדורות? לשם כך, עלינו להבין האם אפשר לתאר את $\bigcup C$ באמצעות הסדר. נשים לב ש- $\bigcup C$ מאופיינת באמצעות שתי התכונות הבאות:

1. לכל $A \in C$ מתקיים $A \subseteq \bigcup C$

2. אם B קבוצה כלשהי אם התכונה שלכל $A \in C$ מתקיים $A \subseteq B$, אז $\bigcup C \subseteq B$.

תרגיל 2.4.29. הוכיחו ש- $\bigcup C$ אכן מקיימת את שתי התכונות הנ"ל, ושהתכונות הללו מאפיינות אותה, כלומר: אם D קבוצה נוספת שמקיימת את שתי התכונות הנ"ל, אז $\bigcup C = D$. כיוון ש- \subseteq הוא יחס הסדר על $\mathcal{P}(A)$, האבחנה הנ"ל מספקת תיאור של $\bigcup C$ במונחים של יחס הסדר. תיאור זה ניתן להכליל:

הגדרה 2.4.30. נניח ש- $\langle X, \leq \rangle$ קס"ח, ו- $C \subseteq X$. חסם מלעיל של C הוא איבר $b \in X$ המקיים $a \leq b$ לכל $a \in C$. חסם עליון של C הוא המינימום של קבוצת כל החסמים מלעיל של C (אם הוא קיים). המושגים המקבילים עבור הסדר ההפוך נקראים חסם מלרע וחסם תחתון.

כלומר, חסם עליון של C הוא איבר $b \in X$ המקיים: $a \leq b$ לכל $a \in C$ ו- $c \leq b$ לכל חסם מלעיל c של C . נדגיש ש- b לא חייב להיות איבר של C . כיוון שמינימום של קבוצה הוא יחיד, לכל תת-קבוצה יש לכל היותר חסם עליון אחד.

תרגיל 2.4.31. אם ל- C יש חסם עליון ששייך ל- C אז הוא המקסימום של C . אם ל- C יש מקסימום, אז הוא גם החסם העליון של C .

דוגמה 2.4.32. 1 הוא החסם העליון של הקטע הפתוח $C = \{x \in \mathbb{Q} \mid 0 < x < 1\}$ ב- \mathbb{Q} . \diamond

דוגמה 2.4.33. לכל קבוצה A , ולכל $C \subseteq \mathcal{P}(A)$, הקבוצה $\bigcup C$ היא החסם העליון של C . \diamond

דוגמה 2.4.34. נסמן $C = \{\{2n\} \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \Phi(\mathbb{N})$ (קבוצת היחידונים של מספרים זוגיים). האיחוד $\bigcup C$ הוא החסם העליון של C כתת-קבוצה של $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, אך אינו שייך ל- $\Phi(\mathbb{N})$. זה לא אומר שאין לא חסם עליון שם: אולי יש איבר אחר שהוא החסם העליון שלו שם.

נניח בשלילה שיש ל- C חסם עליון B ב- $\Phi(\mathbb{N})$. אז B קבוצה סופית, או שהמשלימה שלה סופית. המקרה הראשון אינו אפשרי, משום ש- B כוללת כל מספר זוגי. במקרה השני, ב- B יש לפחות מספר אי-זוגי אחד k (כל מספר אי-זוגי שאינו במשלימה של B). אבל אז גם $B \setminus \{k\}$ כוללת את כל הזוגיים, בסתירה למינימליות של B .

מצאנו תת-קבוצה של $\Phi(\mathbb{N})$ שאין לה חסם עליון, ולכן $\Phi(\mathbb{N})$ אינה איזומורפית ל- $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. \diamond

תרגיל 2.4.35. הוכיחו שהתכונה "לכל תת-קבוצה יש חסם עליון" של קבוצות סדורות נשמרת תחת איזומורפיזם.

לתכונה שלכל תת-קבוצה יש חסם עליון יש השלכות מעניינות. נניח ש- $f: X \rightarrow X$ פונקציה מקבוצה X לעצמה. במצב הזה טבעי ומעניין לשאול האם יש איבר $x \in X$ כך ש- $f(x) = x$. איבר כזה נקרא נקודת שבת של f . בהקשר שלנו, ישנה הטענה הכללית הבאה:

נקודת שבת

טענה 2.4.36. נניח ש- $\langle X, \leq \rangle$ קס"ח בה לכל תת-קבוצה יש חסם עליון, ונניח ש- $f: X \rightarrow X$ שומרת סדר. אז ל- f יש נקודת שבת.

הוכחה. נסמן $C = \{x \in X \mid x \leq f(x)\}$. לפי ההנחה, ל- C יש חסם עליון a . נוכיח ש- a נקודת שבת של f .
 נניח ש- $x \in C$. אז $x \leq a$ משום ש- a חסם (מלעיל) של C . כיוון ש- f שומרת סדר, $f(x) \leq f(a)$, וכיוון ש- $x \in C$, מקבלים $x \leq f(x) \leq f(a)$. הוכחנו ש- $f(a)$ חסם מלעיל של C , ולכן החסם העליון a קודם לו, $a \leq f(a)$.
 בפרט, $a \in C$. כעת, נשים לב שלכל $x \in C$ גם $f(x) \in C$: כיוון ש- $x \leq f(x)$, הפעלת f נותנת $f(x) \leq f(f(x))$. בפרט, $f(a) \in C$. כיוון ש- a חסם מלעיל של C ו- $f(a) \in C$, מקבלים $f(a) \leq a$. בסה"כ, הוכחנו אי-שוויון לשני הכיוונים, אז $f(a) = a$. \square

ראינו מספר תכונות שמאפשרות לנו להוכיח שקבוצות סדורות לא איזומורפיות. אם אנחנו רוצים להוכיח ששתי קבוצות סדורות הן כן איזומורפיות, האופן היחיד שיש לנו כרגע הוא למצוא איזומורפיזם ספציפי, וזה לעתים קשה. היה יותר נוח אם היינו יכולים לאפיין קבוצות סדורות באמצעות התכונות שלהן. למשל, נניח שנתונה קס"ח $\langle X, \leq \rangle$ כך ש- \leq סדר קווי, X צפופה וללא מינימום או מקסימום. דוגמא אחת לקבוצה כזו היא \mathbb{Q} , עם הסדר הרגיל, אבל עוד דוגמא היא תת-הקבוצה של \mathbb{Q} המורכבת ממספרים קטנים מ-1 וגדולים מ-0. האם קבוצה כזו בהכרח איזומורפית ל- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$? על מנת שזה יקרה, הכרחי כמובן שקיימת בכלל פונקציה הפיכה מ- X ל- \mathbb{Q} (ללא שום תנאים על הסדר). תחת ההנחה הזו, אנחנו נראה בהמשך שהתשובה היא "כן".

סוף הרצאה 5, 20
 במאי 2024