מבוא לטופולוגיה

משה קמנסקי

25 במרץ 2026

1 מבוא

1.1 מרחבים מטריים ומרחבים טופולוגיים

המטרה של טופולוגיה היא ליצור מושג כללי למדי של "מרחב", ולחקור את התכונות הגסות של מרחבים כאלה. נזכיר שכבר יש לנו מושג די כללי של מרחב:

מטריקה

הגדרה 1.1.1. *מטריקה* על קבוצה X היא פונקציה $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ המקיימת לכל $x, y \in X$:

1. $d(x, y) = 0$ אם ורק אם $x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. (אי שוויון המשולש) $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$ לכל $z \in X$.

מרחב מטרי

זוג $\langle X, d \rangle$ כאשר X קבוצה ו-d מטריקה על X נקרא *מרחב מטרי*.

זוהי הכללה טבעית של מושג המרחק במרחב האוקלידי, ולמרות שזו הכללה די רחבה, היא לא מספיק כללית עבורנו. אנחנו נעבוד במקום זה עם מרחבים מהסוג הבא:

טופולוגיה

הגדרה 1.1.2. *טופולוגיה* על קבוצה X מורכבת מקבוצה $\mathcal{T}$ של תתי-קבוצות של X כך ש:

1. אם $Y, Z \in \mathcal{T}$ אז גם $Y \cap Z \in \mathcal{T}$
2. אם $C \subseteq \mathcal{T}$ אז $\bigcup C \in \mathcal{T}$
3. $X \in \mathcal{T}$

מרחב טופולוגי

קבוצה פתוחה

זוג $\langle X, \mathcal{T} \rangle$ כאשר X קבוצה ו-$\mathcal{T}$ טופולוגיה על X נקרא *מרחב טופולוגי*. קבוצה ב-$\mathcal{T}$ נקראת *קבוצה פתוחה* של המרחב הטופולוגי.

בקרוב נראה שזו אכן, במובן מסוים, הכללה של מרחבים מטריים, אבל במבוא הזה ננסה להסביר למה המושג המופשט הזה אכן נחוץ.

מרחבי פונקציות

נזכיר שסדרת פונקציות f_n מ-$\mathbb{R}$ ל-$\mathbb{R}$ *מתכנסת נקודתית* לפונקציה g אם הסדרה $f_n(x)$ מתכנסת ל-$g(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$. היינו רוצים לומר שהסדרה f_n עצמה, כסדרה של נקודות בקבוצה $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ של כל הפונקציות מ-$\mathbb{R}$ לעצמו, מתכנסת ל-g, איבר נוסף באותה קבוצה. אולם אין שום מטריקה סבירה על $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ עבורה זה נכון.

מנות

המעגל $S^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid |v| = 1\}$ הוא תת-קבוצה של מרחב מטרי, ולכן מרחב מטרי בעצמו. התיאור הזה של הגאומטריה של המעגל משתמש בשיכון שלו במישור. האם הגאומטריה שלו אכן תלויה בשיכון הזה? אינטואיטיבית, המעגל מתקבל מקטע היחידה הסגור $I = [0,1]$ על-ידי הדבקת הקצוות $0, 1$ אחד לשני. האם ניתן לתאר את הפעולה הזו מתמטית? הקטע I הוא מרחב מטרי בעצמו, אבל פונקציית ההדבקה לא שומרת על המטריקה: המרחק בין 0 ל-1 הוא 1, אבל המרחק בין התמונות הוא 0.

באופן כללי, נסמן ב-d את המטריקה על I, וב-$p : I \to S^1$ את פונקציית ההדבקה (נניח, $p(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t) \rangle$). על-מנת להגדיר מטריקה על S^1 שתשקף את המטריקה על I, אפשר לנסות להגדיר: $d_1(u,v) = \min\{d(x,y) \mid p(x) = u, p(y) = v\}$ לכל $u, v \in I$.

תרגיל 1.1.3. 1. הוכיחו שהנוסחה אכן מגדירה פונקציה $d_1 : S^1 \times S^1 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, אבל היא אינה מטריקה.

2. אפשר לנסות לתקן את הבעיה בהגדרה באמצעות התיקון הבא: $d_2(u,v) = \min\{d_1(u,w) + d_1(w,v) \mid w \in S^1\}$. הוכיחו ש-$d_2$ מטריקה על S^1.

3. באופן כללי, יתכן שצריך לעשות יותר מ"קפיצה" אחת, אז סביר לנסות להגדיר $d'(u,v) = \inf\{d_1(u,w_1) + \cdots + d_1(w_n,v) \mid w_i \in S^1\}$. נתבונן במקום בהדבקה הקודמת בפונקציה $p : \mathbb{R} \to S^1$ הנתונה על-ידי $p(t) = \langle \cos(2\pi e^t), \sin(2\pi e^t) \rangle$. הוכיחו שביחס לפונקציה זו (עם המטריקה הרגילה על $\mathbb{R}$), הפונקציה d' אינה מטריקה על S^1.

מטריקות שונות על אותו מרחב

לא הגדרנו מה זה אומר ששני מרחבים מטריים הם "אותו דבר", אבל סביר שזה אומר שהתכונות של המטריקה זהות בשניהם. למשל, המרחבים המטריים $(0,1)$ (קטע פתוח) ו-$\mathbb{R}$ עם המטריקות הרגילות הם שונים: המטריקה על $(0,1)$ חסומה, ועל $\mathbb{R}$ לא. מצד שני, קיימת העתקה רציפה הפיכה מ-$(0,1)$ ל-$\mathbb{R}$, עם הופכית רציפה (למשל $t \mapsto \cot(\pi t)$), ולכן מנקודת המבט של פונקציות רציפות, שני המרחבים לא ניתנים להפרדה. איזו נקודת מבט היא הנכונה? זה תלוי בהקשר.

1.2 הטורוס

המושג של מרחב טופולוגי מאפשר להגדיר מהן העתקות רציפות בין שני מרחבים כאלה. אחת הגישות להבנה של מרחב טופולוגי היא דרך הבנת אוסף כל ההעתקות הרציפות ממנו (למרחב כלשהו) או אליו. נדגים זאת ראשיות באמצעות המעגל. קיימת העתקה רציפה מ-I ל-S^1, העתקת ההדבקה f (רציפה במובן המוכר עבור מרחבים מטריים, בהמשך נראה שעבור מרחבים מטריים המושגים מתלכדים). אם $g : S^1 \to X$ העתקה רציפה (כאשר X מרחב כלשהו), אז $\tilde{g} = g \circ f : I \to X$ העתקה רציפה המקיימת $\tilde{g}(0) = \tilde{g}(1)$. בהמשך נראה שגם ההיפך נכון: אם $g : I \to X$ העתקה רציפה המקיימת $g(0) = g(1)$, אז יש העתקה רציפה (בהכרח יחידה) $\bar{g} : S^1 \to X$ כך ש-$g = \bar{g} \circ f$.

במלים אחרות, העתקות רציפות מ-S^1 למרחב כלשהו X זה "אותו דבר" כמו העתקות רציפות מ-I ל-X שמקבלות אותו ערך בקצוות. זה בדיוק הרעיון של "הדבקת הקצוות". אם לא ידענו מראש מהו S^1 היה אפשר לתאר את ההדבקה באופן הבא: זהו מרחב S ביחד עם העתקה רציפה $f : I \to S$, המקיימת $f(0) = f(1)$, ועם התכונה:

(†) לכל מרחב X, ההרכבה $g \mapsto g \circ f$ נותנת התאמה חח"ע ועל בין העתקות רציפות מ-S ל-X, להעתקות רציפות מ-I ל-X המסכימות על הקצוות.

תכונה זו מתארת לחלוטין את אוסף ההעתקות הרציפות מ-S למרחב כלשהו X, ולכן נותר לשאול: האם מרחב כזה S קיים? והאם הוא יחיד? על השאלה הראשונה אנחנו יודעים את התשובה בדוגמא הנוכחית כי ראינו ש-S^1 כזה (ובאופן כללי, התשובה על שאלות כאלה היא כן, כפי שנראה בהמשך. זה אחד היתרונות של מרחבים טופולוגיים). לגבי היחידות, ניתן לענות כבר עכשיו:

טענה 1.2.1. *אם $f : I \to S$ ו-$f' : I \to S'$ שניהם מקיימים את התכונה לעיל, אז יש העתקה רציפה יחידה $t : S \to S'$ כך ש-$t \circ f = f'$.*

הוכחה. לפי ההנחה, $f'(0) = f'(1)$. לכן, לפי התנאי (†), עבור $X = S'$, קיימת העתקה רציפה יחידה $t : S \to S'$ כך ש-$t \circ f = f'$. מאותה סיבה, קיימת העתקה רציפה יחידה $u : S' \to S$ המקיימת $u \circ f' = f$. לכן, $f = u \circ f' = u \circ (t \circ f) = (u \circ t) \circ f$. שימוש נוסף בתכונה (†), הפעם עבור $X = S$ וההעתקה $f : I \to S$, מראה שיש העתקה *יחידה* $v : S \to S$ המקיימת $v \circ f = f$. כיוון שהזהות היא העתקה כזו, קיבלנו ש-$u \circ t$ היא הזהות על S. באופן דומה, $t \circ u$ היא הזהות על S', כלומר u ההפכית של t. □

במלים אחרות, עד כדי העתקה רציפה הפיכה יחידה, המנה S מוגדרת על-ידי התכונה לעיל. הצלחנו לתאר את S^1 בלי להסתמך על המרחב $\mathbb{R}^2$ המכיל אותו.

תרגיל 1.2.2. הוכיחו שניתן לתאר את הפונקציות הרציפות על S^1 גם כפונקציות רציפות על $\mathbb{R}$ שהן מחזוריות עם מחזור 1 (כלומר, $f(x+1) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

באופן דומה, ניתן לתאר את הטורוס $\mathbb{T}^2$: אינטואיטיבית, זהו מרחב שהוא המעטפת של אבוב (או דונאט). דרך אחת לתאר אותו הוא כהדבקה: הוא מתקבל מריבוע היחידה הסגור $I \times I$ על-ידי



איור 1: מערכת קואורדינטות על הטורוס

הדבקת צלעות הפוכות. מנקודת המבט הזו, ניתן לתאר כמו קודם את אוסף הפונקציות הרציפות ממנו למרחב X: אלה פונקציות רציפות $f : I \times I \to X$ המקיימות $f(0,x) = f(1,x)$ ו-$f(x,0) = f(x,1)$ לכל $x \in \mathbb{R}$. אבל אם אנחנו כבר מבינים את המרחב S^1, אפשר לגשת אל הטורוס אחרת: אם נצייר שני מעגלים בכיוונים מאונכים על הטורוס, ניתן לתאר כל נקודה על הטורוס על-ידי שתי קואורדינטות, כל אחת על אחד המעגלים (ראו איור 1).

במלים אחרות, כקבוצה, ניתן לזהות את הטורוס עם המכפלה הקרטזית $S^1 \times S^1$, ואינטואיטיבית, הזיהוי הזה הוא רציף. האם ניתן לבטא את העובדה הזו במדויק?

נשאל שאלה יותר כללית: בהינתן מרחבים X ו-Y, האם יש מבנה טבעי של מרחב טופולוגי על המכפלה הקרטזית $X \times Y$? ננסה לתאר את הבעיה מנקודת המבט של פונקציות רציפות. קבוצתית, נקודה ב-$X \times Y$ מתאימה לזוג נקודות, אחת ב-x והשנייה ב-Y. מידע על נקודה בודדת לא יכול לקודד רציפות, אבל קבוצתית, אפשר לומר באופן שקול שפונקציה מ-Z ל-$X \times Y$ זה כמו לתת פונקציה מ-Z ל-X ופונקציה מ-Z ל-Y. את הרעיון הזה אפשר להעביר להקשר הטופולוגי: המרחב $X \times Y$ הוא מרחב המקיים:

1. פונקציות ההטלה $\pi_1 : X \times Y \to X$ ו-$\pi_2 : X \times Y \to Y$ הן רציפות. לכן, אם $h : Z \to X \times Y$ פונקציה רציפה, מתקבלות פונקציות רציפות $\pi_i \circ h$.

2. אם Z מרחב כלשהו, ו-$f : Z \to X$ ו-$g : Z \to Y$ שתי פונקציות רציפות, אז יש פונקציה יחידה $h : Z \to X \times Y$ כך ש-$\pi_1 \circ h = f$ ו-$\pi_2 \circ h = g$.

גם כאן, סביר לשאול האם מרחב כזה $X \times Y$ קיים, ועד כמה התנאים שהשתמשנו בהם מגדירים אותו ביחידות. על השאלה הראשונה נענה (כן) בהמשך, על השנייה אפשר לענות באופן דומה לטיעון עם המעגל, אבל אנחנו ניקח נקודת מבט יותר כללית.

1.3 קטגוריות

בסעיף הקודם אימצנו את נקודת המבט שכדי להבין מרחב טופולוגי X עלינו להבין את אוסף ההעתקות ממנו או אליו מכלל המרחבים. ראינו שנקודת המבט הזו מועילה למרות שלא הגדרנו

עדיין מהי העתקה רציפה. התכונה העיקרית של העתקות רציפות שהשתמשנו בה (ללא הוכחה) היא שהרכבה של העתקות רציפות היא העתקה רציפה.

נקודת המבט הזו מועילה לא רק בטופולוגיה אלא גם בתחומים רבים אחרים, והיא מפורמלת במסגרת *תורת הקטגוריות*, שמאפשרת הגדרות וטיעונים כמו שראינו במסגרת כללית. התורה שימושית מאוד בהקשר הטופולוגי (ובמידה רבה נולדה במסגרת זו), ואנחנו נשתמש במושגי היסוד שלה.

תורת הקטגוריות

הגדרה 1.3.1. *קטגוריה* $\mathcal{C}$ מורכבת מאוסף $\mathbf{Ob}=\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ של *אובייקטים*, לכל $x,y\in\mathbf{Ob}$ קבוצה $\mathbf{Mor}_{\mathcal{C}}(x,y)=\mathcal{C}(x,y)$ של *מורפיזמים*, ולכל שלושה אובייקטים x,y,z פונקציה $\circ=\circ_{x,y,z}:\mathcal{C}(y,z)\times\mathcal{C}(x,y)\to\mathcal{C}(x,z)$ שנקראת *הרכבה*. המידע הזה מקיים את התנאים הבאים:

קטגוריה
אובייקטים
מורפיזמים
הרכבה

1. (אסוציאטיביות) לכל $f\in\mathcal{C}(x,y)$, $g\in\mathcal{C}(y,z)$ ו-$h\in\mathcal{C}(z,w)$ מתקיים $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$.
2. (יחידה) לכל אובייקט $x\in\mathbf{Ob}$ קיים מורפיזם $\mathbf{1}_x\in\mathcal{C}(x,x)$ המקיים $f\circ\mathbf{1}_x=f$ ו-$\mathbf{1}_x\circ g=g$ לכל $f\in\mathcal{C}(y,x)$ ולכל $g\in\mathcal{C}(y,x)$.

אם x,y אובייקטים ו-$f\in\mathcal{C}(x,y)$ נאמר ש-f *מורפיזם מ-x ל-y*, ונסמן גם $f:x\to y$ או $x\xrightarrow{f}y$. האובייקט x נקרא *התחום* או *המקור* של f, ו-y נקרא *הטווח*.

מורפיזם מ-x ל-y
תחום
המקור
טווח

הערה 1.3.2. שימו לב למילה *אוסף* בהגדרת האובייקטים: אוסף זה לא נדרש להיות קבוצה (ובהרבה דוגמאות טבעיות אכן אינו קבוצה). בניגוד לזה, אוסף המורפיזמים בין שני אובייקטים הוא קבוצה. קטגוריה שאוסף האובייקטים בה הוא קבוצה נקראת *קטגוריה קטנה*.

קטגוריה קטנה

נשים לב גם שכל מורפיזם בקטגוריה "יודע" מיהם התחום והטווח שלו. בפרט, קבוצות המורפיזמים עבור אובייקטים שונים הן זרות. נסמן ב-$\mathbf{Mor}_{\mathcal{C}}$ את האיחוד $\bigcup_{x,y\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}}\mathcal{C}(x,y)$. אז יש לנו פונקציות $d,c:\mathbf{Mor}\to\mathbf{Ob}$ שמתאימות לכל מורפיזם את התחום והטווח שלו.

דוגמא 1.3.3. רוב המבנים המתמטיים שאנחנו מכירים מהווים קטגוריות: למשל, הקטגוריה $\mathcal{S}et$ בה האובייקטים הם קבוצות (מחלקה שאינה קבוצה!) והמורפיזמים הם פונקציות בין קבוצות, הקטגוריה $\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$ של מרחבים וקטוריים מעל שדה (קבוע) $\Bbbk$, עם העתקות ליניאריות ביניהם, הקטגוריה $\mathcal{G}rp$ של חבורות והעתקות של חבורות, וכו'. בכל המקרים, ההרכבות הן הרכבות רגילות של פונקציות. הקורס הזה יעסוק בעיקר בקטגוריה $\mathcal{T}op$ של מרחבים טופולוגיים, שלא הוגדרה עדיין.

דוגמא 1.3.4. נקבע שדה $\Bbbk$. הקטגוריה $\mathcal{M}at_{\Bbbk}$ היא קטגוריה בה אוסף האובייקטים הוא $\mathbb{N}$, ולכל $i,j\in\mathbb{N}$, המורפיזמים מ-i ל-j הם מטריצות $j\times i$ עם ערכים ב-$\Bbbk$. ההרכבה נתונה על-ידי כפל מטריצות.

סוף הרצאה 1, 16 במרץ

תכונות ובניות מוכרות ניתן לפעמים לבצע ברמה הקטגורית. למשל, מורפיזם $f\in\mathcal{C}(x,y)$ נקרא *מורפיזם הפיך* אם קיים $g\in\mathcal{C}(y,x)$ כך ש-$g\circ f=\mathbf{1}_x$ ו-$f\circ g=\mathbf{1}_y$. במקרה זה נאמר גם ש-f איזומורפיזם מ-x ל-y וש-x איזומורפי ל-y. המורפיזם g נקרא *הפכי* של f.

מורפיזם הפיך
הפכי

תרגיל 1.3.5. מהם המורפיזמים ההפיכים בדוגמא 1.3.4?

טענות על קטגוריות לעתים נוח לנסח באמצעות דיאגרמות של חצים, שמייצגים מורפיזמים. למשל, האסוציאטיביות של ההרכבה היא הטענה שהדיאגרמה הבאה מתחלפת:

$$\begin{tikzcd}
x \arrow[rr, "g\circ f"] \arrow[dr, "f"'] & & z \arrow[dr, "h"] & \\
& y \arrow[ur, "g"] \arrow[rr, "h\circ g"] & & w
\end{tikzcd}$$

והטענה ש-f הפיך היא הטענה שקיים מורפיזם g שמשלים את הדיאגרמה הבאה לדיאגרמה מתחלפת:

$$\begin{tikzcd}
x \arrow[rr, "\mathbf{1}_x"] \arrow[dr, "f"'] & & x \arrow[dr, "f"] & \\
& y \arrow[ur, dotted, "g"] \arrow[rr, "\mathbf{1}_y"] & & y
\end{tikzcd}$$

תרגיל 1.3.6. נניח ש-f מורפיזם מ-x ל-y. הוכיחו:

1. אם g הפכי של f, אז g הפיך
2. אם $g_1, g_2 : y \to x$ מקיימים $g_1 \circ f = \mathbf{1}_x$ ו-$f \circ g_2 = \mathbf{1}_y$ אז $g_1 = g_2$ ו-f הפיך (בפרט, ההפכי יחיד אם הוא קיים).
3. "x איזומורפי ל-y" הוא יחס שקילות על אוסף האובייקטים.

קטגוריה בה כל המורפיזמים הם הפיכים נקראת *גרופואיד*. גרופואיד

דוגמא 1.3.7. לכל קבוצה S אפשר להתאים קטגוריה $\mathcal{C}_S$ שאוסף האובייקטים בה הוא S, והמורפיזמים היחידים הם מהצורה $\mathbf{1}_x$ עבור $x \in S$. קטגוריה זו היא גרופואיד.

ניתן להכליל את הדוגמא האחרונה באופן הבא:

תרגיל 1.3.8. נניח ש-R יחס על קבוצה S. נגדיר $\mathbf{Ob} = S$ ו-$\mathbf{Mor} = R$ כאשר הפונקציות d, c הן ההטלות (כלומר יש מורפיזם יחיד מ-x ל-y אם ורק אם xRy).

1. הוכיחו שיש לכל היותר מבנה אחד של קטגוריה עם הנתונים הללו.
2. מהן התכונות ש-R צריך לקיים על מנת שזו אכן תהיה קטגוריה? אילו תכונות נוספות נדרשות על מנת שהקטגוריה תהיה גרופואיד?

נסמן את הקטגוריה הזו ב-$\mathcal{C}_{S,R}$.

נחזור כעת למכפלה הקרטזית. בחינה של ההגדרה שהצענו מראה שהיא תקפה בכל קטגוריה!

מכפלה

הגדרה 1.3.9. נניח ש-x, y אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$. *מכפלה* של x ו-y היא אובייקט z ביחד עם מורפיזמים $\pi_1 : z \to x$ ו-$\pi_2 : z \to y$, עם התכונה: לכל אובייקט u עם מורפיזמים $f : u \to x$ ו-$g : u \to y$, יש מורפיזם יחיד $t : u \to z$ כך ש-$f = \pi_1 \circ t$ ו-$g = \pi_2 \circ t$.

הטלות

זוהי בדיוק התכונה שניסחנו עבור הטורוס, מנוסחת בקטגוריה כללית. המורפיזמים π_1, π_2 נקראים *הטלות*. כמובן שמכפלות לא בהכרח קיימות.

תרגיל 1.3.10. הוכיחו שבקטגוריית הקבוצות ובקטגוריית החבורות, המכפלה הקרטזית הרגילה היא מכפלה במובן הקטגוריה. הוכיחו גם שבקטגוריית השדות אין מכפלות.

השאלה ששאלנו בהקשר של הטורוס הייתה: האם התכונה שרשמנו מגדירה את המכפלה ביחידות? נראה עכשיו שהתשובה היא כן, בהקשר הקטגורי המלא.

טענה 1.3.11. *אם z ו-w שניהם מכפלה של x_1 ו-x_2, עם הטלות $p_i : z \to x_i$ ו-$q_i : w \to x_i$, אז קיים מורפיזם יחיד $f : z \to w$ כך ש-$q_i \circ f = p_i$ עבור $i = 1, 2$, ו-f הוא איזומורפיזם.*

ההוכחה דומה מאוד להוכחת טענה 1.2.1.

הוכחה. הקיום והיחידות של f נובעים ישירות מהיותו של w מכפלה, כשההגדרה מופעלת על הנתונים p_1, p_2. באופן דומה, נובע מהעובדה ש-z מכפלה שקיים מורפיזם (יחיד) $g : w \to z$ כך ש-$p_i \circ g = q_i$. אז $f \circ g : w \to w$ מקיימת $q_i \circ (f \circ g) = (q_i \circ f) \circ g = p_i \circ g = q_i$. כיוון ש-$q_i \circ \mathbf{1}_w = q_i$ גם כן, נובע מהיחידות ש-$f \circ g = \mathbf{1}_w$. באופן דומה, $g \circ f = \mathbf{1}_z$. $\square$

אם y, z אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$ שיש להם מכפלה ב-$\mathcal{C}$, נסמן מכפלה זו ב-$y \times z$. לפי הטענה האחרונה, זה מוגדר היטב עד-כדי איזומורפיזם *יחיד*.

תרגיל 1.3.12. נניח ש-R יחס סדר על קבוצה S. תארו, במונחים של R, את המכפלות ב-$\mathcal{C}_{S,R}$ (תרגיל 1.3.8).

אובייקט אחרון

אובייקט סופי

תרגיל 1.3.13. אובייקט x בקטגוריה $\mathcal{C}$ נקרא *אובייקט אחרון* (או *אובייקט סופי*) אם לכל אובייקט יש מורפיזם יחיד ל-x.

1. מיצאו את האובייקטים האחרונים בקטגוריית הקבוצות, החבורות והשדות.
2. הוכיחו שאם R יחס סדר על קבוצה S, אז בקטגוריה $\mathcal{C}_{S,R}$ (תרגיל 1.3.8) אובייקט הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימום ב-R.
3. הוכיחו שכל שני אובייקטים אחרונים באותה קטגוריה הם איזומורפיים.

תרגיל 1.3.14. נניח ש-x, y אובייקטים ב-$\mathcal{C}$, ונגדיר קטגוריה $\mathcal{C}_{/x,y}$ באופן הבא:

- האובייקטים הם שלשות $\langle z, p, q \rangle$ כאשר z אובייקט ב-$\mathcal{C}$ ו-$p : z \to x$ ו-$q : z \to y$ הם מורפיזמים ב-$\mathcal{C}$.

- מורפיזם מ-$\langle z_1, p_1, q_1\rangle$ ל-$\langle z_2, p_2, q_2\rangle$ הוא מורפיזם $t : z_1 \to z_2$ המקיים $p_2 \circ t = p_1$ ו-$q_2 \circ t = q_1$.

$$\begin{tikzcd}
z_1 \arrow[rr, dashed, "t"] \arrow[dr, "p_1"'] \arrow[drr, "q_1"] & & z_2 \arrow[dl, "q_2"] \arrow[dll, "p_2"'] \\
& x \quad y &
\end{tikzcd}$$

- ההרכבה היא כמו ב-$\mathcal{C}$.

מיצאו את האובייקטים הסופיים ב-$\mathcal{C}_{/x,y}$.

תרגיל 1.3.15. נתבונן בקטגוריה שהאובייקטים שלה הן קבוצות, והמורפיזמים מ-A ל-B הם יחסים $R \subseteq A \times B$. הרכבה נתונה על-ידי הרכבת יחסים (כלומר $S \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b \in B(aRb \wedge bSc)\}$ עבור $R : A \to B$ ו-$S : B \to C$). חשבו בקטגוריה זו מיהם המורפיזמים ההפיכים, האובייקטים האחרונים והמכפלות.

2 מרחבים טופולוגיים וההעתקות ביניהם

2.1 הגדרות ודוגמאות

הגדרנו מרחבים טופולוגיים בהגדרה 1.1.2. נזכיר שקבוצה ששייכת לטופולוגיה נקראת קבוצה פתוחה. תת-קבוצה של המרחב נקראת *קבוצה סגורה* אם המשלימה שלה (ביחס למרחב כולו) היא פתוחה.

קבוצה סגורה

עכשיו נראה מספר דוגמאות.

דוגמא 2.1.1. הממשיים עם הקבוצות הפתוחות הרגילות (באופן יותר כללי, $\mathbb{R}^n$)

אם $\mathcal{T}_1$ ו-$\mathcal{T}_2$ שתי טופולוגיות על אותה קבוצה, $\mathcal{T}_1$ נקראת *גסה* יותר מ-$\mathcal{T}_2$, ו-$\mathcal{T}_2$ *עדינה* יותר מ-$\mathcal{T}_1$ אם $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$.

גסה

עדינה

דוגמא 2.1.2. על כל קבוצה X יש טופולוגיה עדינה ביותר $\mathcal{P}(X)$ שנקראת *הטופולוגיה הדיסקרטית* וטופולוגיה גסה ביותר $\{\emptyset, X\}$ שנקראת *הטופולוגיה הטריוויאלית*.

הטופולוגיה הדיסקרטית

הטופולוגיה הטריוויאלית

נשים לב שטופולוגיה $\mathcal{T}$ על X היא הדיסקרטית אם ורק אם כל יחידון של X שייך ל-$\mathcal{T}$, אם ורק אם כל תת-קבוצה היא סגורה.

לעתים יותר קל לתאר טופולוגיה על-ידי הצגת הקבוצות הסגורות.

דוגמא 2.1.3. *הטופולוגיה הקו-סופית* היא הטופולוגיה בה הקבוצות הסגורות הן הקבוצות הסופיות (וכל X). באופן יותר כללי, אם κ מונה אינסופי, ישנה טופולוגיה על X בה הקבוצות הסגורות הן אלה שעוצמתן קטנה מ-κ (ו-X).

הטופולוגיה הקו-סופית

לא תמיד קל לתאר במפורש את כל הקבוצות הפתוחות, ויותר נוח לתאר קבוצה שיוצרת אותן, במובן הבא:

בסיס

הגדרה 2.1.4. קבוצה $\mathcal{B}$ של תתי-קבוצות של X נקראת *בסיס* של קבוצות פתוחות אם $\bigcup \mathcal{B} = X$ ולכל $A, C \in \mathcal{B}$, החיתוך $A \cap C$ הוא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$.

תרגיל 2.1.5. נניח ש-X קבוצה

1. הוכיחו שאם $\mathcal{C}$ אוסף לא ריק של טופולוגיות על X, אז גם $\bigcap \mathcal{C}$ טופולוגיה על X. הסיקו שלכל קבוצה $\mathcal{B}$ של תתי-קבוצות של X, יש טופולוגיה גסה ביותר $\langle \mathcal{B} \rangle$ שבה איברי $\mathcal{B}$ קבוצות פתוחות.

2. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס על X. הוכיחו שהתנאים הבאים שקולים עבור $U \subseteq X$:

   (א) $U \in \langle \mathcal{B} \rangle$.

   (ב) U היא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$.

   (ג) לכל $x \in U$ יש $A \in \mathcal{B}$ כך ש-$x \in A \subseteq U$.

אם $\mathcal{T}$ טופולוגיה ו-$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ בסיס כך ש-$\mathcal{T} = \langle \mathcal{B} \rangle$, אומרים ש-$\mathcal{B}$ בסיס של $\mathcal{T}$. הקשר בין טופולוגיה לבסיס שלה דומה לקשר בין מרחב וקטורי לתת-קבוצה יוצרת שלו: הטופולוגיה היא האובייקט הקאנוני שקל לעבוד איתו באופן מופשט, אבל תיאור של טופולוגיה ספציפית לעתים יותר קל באמצעות בסיס.

הטופולוגיה המטרית

אחת הדוגמאות להגדרה של טופולוגיה באמצעות בסיס היא הטופולוגיה על מרחב מטרי. אם $\langle X, d \rangle$ מרחב מטרי, *כדור פתוח* ב-X הוא קבוצה מהצורה $B_r(x) = \{y \in X \mid d(x,y) < r\}$, כאשר $x \in X$ ו-$r \in \mathbb{R}$. כדור פתוח

טענה 2.1.6. *אם $\langle X, d \rangle$ מרחב מטרי, אז האוסף $\mathcal{B} = \{B_r(x) \mid x \in X, r \in \mathbb{R}\}$ של הכדורים הפתוחים מהווה בסיס.*

הוכחה. נניח ש-$y \in B_{r_1}(x_1) \cap B_{r_2}(x_2)$. אז $r_i' = d(x_i, y) < r_i$. נסמן $r = \min\{r_1 - r_1', r_2 - r_2'\}$, ונוכיח ש-$B_r(y) \subseteq B_{r_i}(x_i)$ (ואז החיתוך הוא איחוד של כדורים כאלה). נניח ש-$z \in B_r(y)$, כלומר $d(z,y) < r$. אז לפי אי-שוויון המשולש, $d(x_i, z) \leq d(x_i, y) + d(y, z) < r_i' + r \leq r_i$. $\square$

הטופולוגיה המטרית

הטופולוגיה שנוצרת על-ידי הבסיס הזה נקראת *הטופולוגיה המטרית*. אנחנו נתייחס לכל מרחב מטרי כאל מרחב טופולוגי באמצעות הטופולוגיה הזו.

דוגמא 2.1.7. הטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}^n$ היא לפי הגדרה הטופולוגיה המטרית (שמושרית על-ידי המטריקה האוקלידית).

סוף הרצאה 2, 18 במרץ

כיוון שלטופולוגיה נתונה יכולים להיות בסיסים שונים, מעניין לבדוק לפעמים ששני בסיסים יוצרים אותה טופולוגיה.

תרגיל 2.1.8. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה $\mathcal{T}$, ונניח ש-$\mathcal{B}'$ קבוצה של תתי-קבוצות של X כך שכל קבוצה ב-$\mathcal{B}'$ היא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$. הוכיחו שגם $\mathcal{B}'$ בסיס, ושהטופולוגיה $\mathcal{T}'$ שהוא יוצר גסה יותר מ-$\mathcal{T}$. בפרט, אם כל קבוצה ב-$\mathcal{B}$ היא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}'$, אז $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$.

תרגיל 2.1.9. הוכיחו שאוסף הקופסאות הפתוחות $I_1 \times \cdots \times I_n \subseteq \mathbb{R}^n$, כאשר כל I_j קטע פתוח, הוא גם בסיס לטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}^n$.

בהינתן מרחב טופולוגי, טבעית לשאול האם הטופולוגיה עליו היא מטרית, עבור איזושהי מטריקה. מרחב כזה נקרא *מרחב מטריזבילי*. בהמשך נעסוק בשאלה הזו בהרחבה, אך כרגע נראה שתי דוגמאות.

מרחב מטריזבילי

תרגיל 2.1.10. הוכיחו שהטופולוגיה הדיסקרטית על כל קבוצה היא מטרית.

מרחב סירפינסקי הוא הקבוצה $\{0,1\}$ עם הטופולוגיה שכוללת את כל תתי-הקבוצות מלבד $\{1\}$.

מרחב סירפינסקי

תרגיל 2.1.11. הוכיחו שטופולוגיה מטרית על קבוצה סופית היא בהכרח דיסקרטית. הסיקו שמרחב סירפינסקי אינו מטריזבילי

תרגיל 2.1.12. מטריקה d על מרחב X נקראת *אולטרא-מטריקה* אם לכל $x, y, z \in X$ מתקיים $d(x,z) \leq \max(d(x,y), d(z,y))$. נניח ש-$d$ אולטרא-מטריקה על X. הוכיחו:

אולטרא-מטריקה

1. אם B_1 ו-B_2 שני כדורים (פתוחים) שאינם זרים, אז אחד מהם מוכל בשני.
2. כל כדור פתוח הוא קבוצה סגורה.

טופולוגיית הסדר

עוד מחלקה של טופולוגיות שקל להגדיר על-ידי בסיס הוא טופולוגיות על קבוצות סדורות. אם $\langle X, \preceq \rangle$ קבוצה סדורה, נסמן $X_\infty = X \cup \{\infty, -\infty\}$, עם הסדר מורחב כך ש-$-\infty \preceq x \preceq \infty$ לכל $x \in X_\infty$. לכל $a, b \in X_\infty$, קבוצה מהצורה $(a,b) = \{x \in X \mid a \prec x \prec b\}$ נקראת *קטע פתוח*, וקבוצה מהצורה $[a,b) = \{x \in X \mid a \preceq x \prec b\}$ נקראת *קטע חצי פתוח מימין*.

קטע פתוח

קטע חצי פתוח מימין

הגדרה 2.1.13. נניח ש-$\langle X, \preceq \rangle$ קבוצה סדורה קווית. *טופולוגיית הסדר* על X היא הטופולוגיה שנוצרת על-ידי הקטעים הפתוחים. *טופולוגיית הגבול התחתון* על X נוצרת על-ידי הקטעים החצי פתוחים מימין. נסמן ב-X_o את המרחב עם טופולוגיית הסדר, וב-X_l את המרחב עם טופולוגיית הגבול התחתון.

טופולוגיית הסדר

טופולוגיית הגבול התחתון

דוגמא 2.1.14. הטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}$ היא טופולוגיית הסדר (עם הסדר הרגיל).

תרגיל 2.1.15. נניח ש-$\langle X, \preceq \rangle$ קבוצה סדורה קווית. הוכיחו:

1. שני האוספים הם בסיסים עבור הטופולוגיה שהם מגדירים.
2. הטופולוגיה על X_l עדינה מזו על X_o.

3. כל קטע חצי פתוח מימין הוא גם סגור ב-X_l.

תרגיל 2.1.16. הוכיחו שקטעים מהצורה $(a,b]$ עבור $a<b$ ב-$\mathbb{R}$ אינם פתוחים ואינם סגורים ב-$\mathbb{R}_l$.

תרגיל 2.1.17. בכל אחד מהסעיפים נתונה קבוצה X ושתי טופולוגיות. קיבעו לגבי כל אחת האם היא מעדנת את האחרת.

1. $X=\mathbb{N}$, עם טופולוגיית הסדר (עבור הסדר הרגיל) ועם הטופולוגיה הדיסקרטית.
2. $X=\{0,1\}\times\mathbb{N}$, עם טופולוגיית הסדר עבור הסדר המילוני (כלומר, $\langle i,n\rangle \preceq \langle j,m\rangle$ אם $i<j$ או $i=j$ ו-$n\leq m$), ועם הטופולוגיה הדיסקרטית.
3. $X=\mathbb{R}$ עם טופולוגיית הסדר, ועם הטופולוגיה שנוצרת על-ידי קטעים פתוחים שהקצוות שלהם ב-$\mathbb{Q}_\infty$.
4. $X=\mathbb{R}$ עם טופולוגיית הגבול התחתון, ועם הטופולוגיה שנוצרת על-ידי קטעים חצי פתוחים מימין שקצוותיהם ב-$\mathbb{Q}_\infty$.
5. $X=\mathbb{R}$ עם טופולוגיית הסדר, ועם הטופולוגיה שנוצרת על-ידי קטעים חצי פתוחים מימין שקצוותיהם ב-$\mathbb{Q}_\infty$.

דוגמאות נוספות

דוגמא 2.1.18. נניח ש-A תת-אלגברה (מעל $\mathbb{R}$) של אלגברת הפונקציות $\mathbb{R}^X$ מ-X ל-$\mathbb{R}$. לכל $B\subseteq A$, נסמן $Z(B)=\{x\in X \mid b(x)=0\forall b\in B\}$. הטופולוגיה בה הקבוצות הסגורות הן מצורה זו נקראת *טופולוגיית זריצקי*.

טופולוגיית זריצקי

תרגיל 2.1.19. הוכיחו שזו אכן טופולוגיה

דוגמא 2.1.20. הטופולוגיה הסטנדרטית על המעגל S^1 נוצרת על-ידי הקשתות הפתוחות. (בהמשך ניתן תיאורים יותר קונספטואליים של הטופולוגיה הזו).

דוגמא 2.1.21. נניח ש-V מרחב וקטורי ממימד n סופי מעל $\mathbb{R}$ (או $\mathbb{C}$). אם $T:V\to\mathbb{R}^n$ איזומורפיזם לינארי (כלומר בחירת בסיס), נגדיר טופולוגיה על V על-ידי $\{T^{-1}(U)\mid U\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה$\}$ (הוכיחו שהטופולוגיה לא תלויה בבחירת הבסיס).

המרחב הפרויקטיבי

נגדיר את $\mathbb{P}(V)$, *המרחב הפרויקטיבי* המתאים ל-V, באופן הבא: כקבוצה, זוהי קבוצת תתי-המרחבים ממימד 1 של V. לכל $v\in V$ שונה מ-0, יש איבר יחיד של $\mathbb{P}(V)$ שמכיל את v (המרחב שנוצר על-ידי v). זה מגדיר פונקציה מ-$V\setminus\{0\}$ על $\mathbb{P}(V)$. בהמשך נגדיר טופולוגיה קבוצה זו.

2.2 העתקות רציפות

הגדרה 2.2.1. נניח ש-X, Y מרחבים טופולוגיים. פונקציה $f : X \to Y$ היא *העתקה רציפה* אם לכל קבוצה פתוחה U של Y, הקבוצה $f^{-1}(U)$ פתוחה ב-X. העתקה רציפה

תרגיל 2.2.2. אם $f : X \to Y$ ו-$g : Y \to Z$ העתקות רציפות, אז גם $g \circ f : X \to Z$ רציפה.

לכן, מרחבים טופולוגיים עם העתקות רציפות (והרכבה רגילה של פונקציות) מהווה קטגוריה, $\mathcal{T}op$.

תרגיל 2.2.3. נניח ש-$f : X \to Y$ פונקציה בין מרחבים טופולוגיים.

1. f רציפה אם ורק אם $f^{-1}(Z)$ סגורה לכל $Z \subseteq Y$ סגורה.
2. נניח ש-$\mathcal{B}$ יוצר את הטופולוגיה על Y. אז f רציפה אם ורק אם $f^{-1}(U)$ פתוחה לכל $U \in \mathcal{B}$ (רמז: התבוננו ב-$\{V \subseteq Y \mid f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$).

תרגיל 2.2.4. נניח ש-X קבוצה. הוכיחו שהטופולוגיה הדיסקרטית על X היא הטופולוגיה היחידה עבורה כל פונקציה מ-X למרחב כלשהו Y היא רציפה, והטופולוגיה הטריוויאלית היחידה עבורה כל פונקציה ממרחב Y ל-X היא רציפה.

תרגיל 2.2.5. כל פונקציה קבועה בין מרחבים טופולוגיים היא רציפה

דוגמא 2.2.6. נסמן ב-S את מרחב סירפינסקי. אז $f : X \to S$ רציפה אם ורק אם היא הפונקציה המציינת של תת-קבוצה פתוחה.

דוגמא 2.2.7. אם $\mathcal{T}_1$ ו-$\mathcal{T}_2$ טופולוגיות על קבוצה X, אז פונקציית הזהות מ-X לעצמו היא רציפה ביחס ל-$\mathcal{T}_1$ בתחום ו-$\mathcal{T}_2$ בתמונה, אם ורק אם $\mathcal{T}_1$ מעדנת את $\mathcal{T}_2$.

דוגמא 2.2.8. עבור הטופולוגיה הקו-סופית על Y, פונקציה $f : X \to Y$ היא רציפה אם ורק אם לכל $y \in Y$, הסיב $X_y = \{x \in X \mid f(x) = y\}$ הוא קבוצה סגורה. בפרט, עם הטופולוגיה הקו-סופית על $\mathbb{R}$, בטופולוגיית זריצקי המתאימה ל-A, כל איברי A הם פונקציות רציפות.

אם $\langle X, d_X \rangle$ ו-$\langle Y, d_Y \rangle$ שני מרחבים מטריים, יש לנו כבר הגדרה אחרת לפונקציה רציפה, שאנחנו סוחבים עוד מאינפי: $f : X \to Y$ רציפה בנקודה $x \in X$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $d_X(x', x) < \delta$ אז $d_Y(f(x'), f(x)) < \epsilon$, ו-$f$ רציפה אם היא רציפה בכל נקודה של X. על מנת להראות שההגדרה שלנו סבירה, נראה ששני המושגים מתלכדים עבור מרחבים כאלה.

לשם כך, נגדיר ראשית רציפות בנקודה:

הגדרה 2.2.9. נניח ש-X מרחב טופולוגי. *סביבה פתוחה* של הנקודה $x \in X$ היא קבוצה פתוחה שכוללת את x. סביבה פתוחה

אם Y מרחב טופולוגי נוסף, פונקציה $f : X \to Y$ היא *רציפה בנקודה* $x \in X$ אם לכל סביבה פתוחה V של $f(x)$ ב-Y יש סביבה פתוחה U של x כך ש-$f(U) \subseteq V$. רציפה בנקודה

טענה 2.2.10. *אם X, Y מרחבים טופולוגיים, ו-$f : X \to Y$ פונקציה, אז f רציפה אם ורק אם היא רציפה בכל נקודה של X.*

הוכחה. נניח ש-f רציפה ו-$x \in X$. ניקח סביבה פתוחה V של $f(x)$, ונגדיר $U = f^{-1}(V)$. אז U פתוחה וכוללת את x, ו-$f(U) \subseteq V$.

נניח ש-f רציפה בכל נקודה של X, וניקח $V \in \mathcal{T}_Y$. נסמן $U = f^{-1}(V)$. לכל $x \in U$, יש U_x פתוחה שכוללת את x ו-$f(U_x) \subseteq V$. אז $U = \bigcup_x U_x$ פתוחה. $\square$

התרגיל הבא מקל על השימוש בהגדרת רציפות בנקודה.

תרגיל 2.2.11. נניח ש-$f : X \to Y$ פונקציה בין מרחבים טופולוגיים, ו-$x \in X$.

1. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על Y. אם f מקיימת את הגדרת הרציפות בנקודה עבור סביבות פתוחות $V \in \mathcal{B}$, אז f רציפה ב-x.

2. אם $\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על X, ו-f רציפה ב-x, אז ניתן לבחור את U ב-$\mathcal{B}$.

מסקנה 2.2.12. *נניח ש-X, Y מרחבים מטריים, ו-$f : X \to Y$. אז f רציפה במובן המטרי אם ורק אם היא רציפה במובן הטופולוגי.*

הוכחה. לפי הטענה, f רציפה במובן הטופולוגי אם ורק אם היא רציפה בכל נקודה, ולפי התרגיל האחרון מספיק לבדוק את ההגדרה לכדורים. נניח ש-f רציפה במובן המטרי, ונניח ש-B כדור ברדיוס ϵ סביב $f(x)$. לפי ההנחה, יש $\delta > 0$ כך שתמונת הכדור U ברדיוס δ סביב x מוכלת ב-B. הכיוון ההפוך דומה. $\square$

מסקנה 2.2.13. *פונקציות החיבור והכפל על $\mathbb{R}$ (עם הטופולוגיה הרגילה) הן רציפות. באופן דומה עבור $\mathbb{C}$.*

הערה 2.2.14. בשלב זו אנחנו רואים שפעולות החשבון על $\mathbb{R}$ רציפות כפונקציות מ-$\mathbb{R}^2$ עם הטופולוגיה המטרית. זה לא לגמרי שימושי כי אנחנו לא יודעים שהטופולוגיה הזו היא טופולוגיית המכפלה (הקטגורית). נראה זאת בקרוב.

דוגמא 2.2.15. פונקציה $f : \mathbb{R}_l \to \mathbb{R}$ היא רציפה בנקודה a אם ורק אם היא רציפה מימין ב-a ביחס לטופולוגיה הרגילה.

תרגיל 2.2.16. נגדיר $f : \mathbb{R}_l \to \mathbb{R}_l$ על-ידי: $f(x) = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$ (הערך השלם של x). הוכיחו ש-f רציפה.

סוף הרצאה 3, 23 במרץ

הומאומורפיזמים

הומיאומורפיזם

מורפיזם הפיך ב-$\mathcal{T}op$ נקרא *הומיאומורפיזם*. שני מרחבים הם הומיאומורפיים אם יש הומיאומורפיזם מאחד לשני. ראינו כבר שפונקציה רציפה, חח"ע ועל לא חייבת להיות הפיכה. הדרישה החסרה מצויה בהגדרה הבאה:

העתקה פתוחה

העתקה סגורה

הגדרה 2.2.17. העתקה רציפה $f : X \to Y$ היא *העתקה פתוחה* אם $f(U)$ פתוחה לכל $U \subseteq X$ פתוחה, והיא *העתקה סגורה* אם $f(Z) \subseteq Y$ סגורה לכל $Z \subseteq X$ סגורה.

תרגיל 2.2.18. העתקה פתוחה ורציפה שהיא חח"ע ועל היא הומיאומורפיזם.

בניגוד לרציפות, שניתן לבטא באופן שקול באמצעות קבוצות פתוחות או סגורות, שני התנאי האחרונים הם בלתי תלויים:

תרגיל 2.2.19. הוכיחו שההטלה מ-$\mathbb{R}^2$ ל-$\mathbb{R}$ היא פתוחה אבל לא סגורה, ושהפונקציה $f(x)=\sin(x)$ היא סגורה אבל לא פתוחה.

תרגיל 2.2.20. הוכיחו שההכלה $f:\mathbb{Q}_o\to\mathbb{R}_o$ (ביחס לסדר הרגיל) היא רציפה, אך אינה פתוחה או סגורה.

תרגיל 2.2.21. נסמן ב-$\preceq$ את הסדר המילוני על $\mathbb{Q}^2$, כלומר $\langle x_1,y_1\rangle\preceq\langle x_2,y_2\rangle$ אם $x_1<x_2$ או $x_1=x_2$ ו-$y_1\le y_2$. נסמן ב-$f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}^2$ את השיכון $f(x)=\langle x,0\rangle$. האם f רציפה?

תרגיל 2.2.22. הפונקציה $f:[0,1)\to S^1$, כאשר הטופולוגיה על התחום היא המטרית, ועל S^1 טופולוגיית הקשתות הפתוחות, הנתונה על-ידי $f(t)=\langle\cos(2\pi t),\sin(2\pi t)\rangle$, היא רציפה וחח"ע, אבל לא פתוחה.

תרגיל 2.2.23. נניח ש-$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ רציפה וחח"ע. הוכיחו ש-f פתוחה. בפרט, אם f גם על, אז f הומאומורפיזם. אפשר להשתמש בשלבים הבאים:

1. מספיק להראות ש-$I=f((-1,1))$ פתוחה
2. I חסומה
3. I קטע
4. I קטע פתוח

2.3 פנקטורים

הפילוסופיה של תורת הקטגוריות מכתיבה שמבנה מתמטי מקודד על ידי העתקות. מהן, אם כן, ההעתקות בין קטגוריות?

הגדרה 2.3.1. נניח ש-$\mathcal{C}$ ו-$\mathcal{D}$ שתי קטגוריות. *פנקטור* מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$ מורכב מהמידע הבא: פנקטור

1. פונקציה $f:\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}\to\mathbf{Ob}_{\mathcal{D}}$
2. לכל $x,y\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ ולכל $t\in\mathcal{C}(x,y)$, מורפיזם $f(t):f(x)\to f(y)$.

כך ש-

1. לכל $x\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ מתקיים $f(\mathbf{1}_x)=\mathbf{1}_{f(x)}$
2. לכל $t\in\mathcal{C}(x,y)$ ו-$s\in\mathcal{C}(y,z)$ מתקיים $f(s\circ t)=f(s)\circ f(t)$

פנקטור קונטראוריאנטי

פנקטור קונטראוריאנטי מוגדר באותו אופן, פרט לכך ש-$f(t): f(y) \to f(x)$, ובמקום התנאי האחרון דורשים: $f(s \circ t) = f(t) \circ f(s)$.

אינטואיטיבית, פנקטור מתאים באופן "טבעי" או "קאנוני" אובייקט מסוג $\mathcal{D}$ לכל אובייקט מסוג $\mathcal{C}$. הטבעיות מתבטאת בעובדה שהוא מתאים גם העתקות. ננסה להשתכנע בזה באמצעות מספר דוגמאות.

דוגמא 2.3.2. נניח ש-$\Bbbk$ שדה. לכל קבוצה A נסמן ב-$\Bbbk\langle A\rangle$ את המרחב הוקטורי שנוצר על-ידי A: זהו מרחב וקטורי שמכיל את A כבסיס. ההתאמה הזו היא (חלק מ-) פנקטור מ-$\mathcal{S}et$ ל-$\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$, קטגורית המרחבים הלינאריים מעל $\Bbbk$, ששולח פונקציה של קבוצות $s: A \to B$ להעתקה הלינארית היחידה $f(s): \Bbbk\langle A\rangle \to \Bbbk\langle B\rangle$ עבורה $f(s)(a) = s(a) \in B \subseteq \Bbbk\langle B\rangle$ לכל $a \in A \subseteq \Bbbk\langle A\rangle$. על מנת להראות שזה פנקטור, יש להראות את התנאי על היחידה (תרגיל), וכן ש-$f(t \circ s) = f(t) \circ f(s)$ לכל $t: B \to C$. על מנת להראות זאת, מספיק להראות שההעתקות מסכימות על הבסיס A, וזה ברור.

דוגמא 2.3.3. נסמן ב-$\mathcal{M}et$ את הקטגוריה של מרחבים מטריים והעתקות רציפות ביניהם (במובן המטרי). נסמן ב-$f(X)$ לכל מרחב מטרי X את המרחב הטופולוגי עם הטופולוגיה המטרית המתאימה. זהו פנקטור כאשר לכל העתקה רציפה s מתאימים את עצמה כהעתקה של מרחבים טופולוגיים. כיוון שההרכבה בשתי הקטגוריות היא פשוט הרכבה של פונקציות, זהו פנקטור.

תרגיל 2.3.4. נסמן ב-$\mathcal{L}os$ את הקטגוריה של קבוצות סדורות קווית (עם העתקות שומרות סדר). האם ההתאמה שמתאימה לכל קבוצה סדורה כזו את המרחב עם טופולוגיית הסדר היא פנקטור?

פנקטור נאמן

פנקטור $f: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ הוא *פנקטור נאמן* אם הוא חח"ע על המורפיזמים: אם $f(t) = f(s)$ עבור $t, s: x \to y$ ב-$\mathcal{C}$, אז $t = s$.

תרגיל 2.3.5. לכל זוג קטגוריות $\mathcal{C}$ ו-$\mathcal{D}$, מיצאו פנקטור נאמן מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$.

1. $\mathcal{C} = \mathcal{S}et$ (קטגוריית הקבוצות), ו-$\mathcal{D} = \mathcal{T}op$ (מרחבים טופולוגיים).
2. עבור $\Bbbk$ שדה נתון, $\mathcal{C} = \mathcal{M}at_{\Bbbk}$ מדוגמא 1.3.4, $\mathcal{D} = \mathcal{V}ec_{\Bbbk}$.
3. $\mathcal{C} = \mathcal{S}et_p$, הקטגוריה בה האובייקטים הם קבוצות, והמורפיזמים מ-A ל-B הם פונקציות חלקיות מ-A ל-B, ו-$\mathcal{D} = \mathcal{S}et_*$, קטגוריית הזוגות $\langle X, x\rangle$ כאשר X קבוצה, ו-$x \in X$. מורפיזם מ-$\langle X, x\rangle$ ל-$\langle Y, y\rangle$ הוא פונקציה $f: X \to Y$ (של קבוצות) כך ש-$f(x) = y$.

סוף הרצאה 4, 25 במרץ