


# KUANTUM FİZİĞİ



Mesut Karakoç

*“...Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile rabbinin bilgisi dışında kalmaz;  
bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır.”*

Yûnus, 10/61

Milyarlarca ışık yılından tek bir elektronun izine —  
bu ölçeklerin tamamı fiziğin konusudur.

# İçindekiler

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı</b>                                        | <b>4</b>  |
| 1.1      | Karacisim Işması . . . . .                                                    | 4         |
| 1.1.1    | Klasik Fiziğe Göre . . . . .                                                  | 4         |
| 1.1.2    | Planck Dağılımı ve Kuantumlu Enerji Kavramı . . . . .                         | 7         |
| 1.2      | Fotoelektrik Etki . . . . .                                                   | 9         |
| 1.3      | Compton Etkisi . . . . .                                                      | 13        |
| 1.4      | Elektron: Parçacık mı, Dalga mı? . . . . .                                    | 15        |
| 1.5      | Rutherford ve Bohr Atom Modelleri . . . . .                                   | 17        |
| 1.6      | Franck-Hertz Deneyi . . . . .                                                 | 21        |
| 1.7      | Uygunluk İlkesi . . . . .                                                     | 22        |
|          | Kaynaklar . . . . .                                                           | 23        |
| <b>2</b> | <b>Dalga-Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi</b>                         | <b>25</b> |
| 2.1      | Dalga-Parçacık İkilemi . . . . .                                              | 25        |
| 2.2      | Düzlem Dalgalar ve Dalga Paketleri . . . . .                                  | 27        |
| 2.3      | Dalga Fonksiyonunun Olasılık Yorumu . . . . .                                 | 30        |
| 2.4      | Schrödinger Denklemi . . . . .                                                | 31        |
| 2.5      | Heisenberg'in Belirsizlik Bağlantıları . . . . .                              | 32        |
| 2.5.1    | Bir Foton Demetinin Kırınımı . . . . .                                        | 33        |
| 2.5.2    | Bohr Yörüngelerinin Yerelleşememesi . . . . .                                 | 34        |
| 2.6      | Dalga Fonksiyonun ve Olasılığın Normalizasyonu . . . . .                      | 35        |
| 2.6.1    | Olasılık Akısının Tanımı ve Önemi . . . . .                                   | 35        |
| 2.7      | Konum ve Momentum Beklenen Değerleri . . . . .                                | 36        |
| 2.7.1    | $\phi(p)$ ve $\psi(x, 0)$ Arasındaki İlişki . . . . .                         | 40        |
| 2.7.2    | Momentum Uzayında Beklenen Değer . . . . .                                    | 40        |
|          | Kaynaklar . . . . .                                                           | 41        |
| <b>3</b> | <b>Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması, Özdeğerleri ve Özfonksiyonları</b> | <b>42</b> |
| 3.1      | Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi . . . . .                              | 42        |
| 3.1.1    | Özdeğer Denklemleri . . . . .                                                 | 43        |
| 3.2      | Sonsuz Kuyudaki Parçacık için Enerji Özdeğer Problemi . . . . .               | 44        |
| 3.3      | Açılım Varsayımı ve Fiziksel Yorumu . . . . .                                 | 48        |
| 3.3.1    | Açılım Katsayılarının Fiziksel Yorumu . . . . .                               | 49        |
| 3.4      | Serbest Parçacık ve Momentum Özfonksiyonu . . . . .                           | 50        |
| 3.4.1    | Serbest Parçacık Dalga Fonksiyonunun Normalizasyonu . . . . .                 | 51        |
| 3.4.2    | Yozlaşmış (Dejenere) Durumlar . . . . .                                       | 54        |
| 3.4.3    | Parite . . . . .                                                              | 55        |
|          | Kaynaklar . . . . .                                                           | 58        |
| <b>4</b> | <b>Bir Boyutlu Potansiyeller</b>                                              | <b>59</b> |
| 4.1      | Basamak Potansiyeli . . . . .                                                 | 59        |
| 4.2      | Sonlu Potansiyel Kuyusu . . . . .                                             | 64        |
| 4.3      | Bariyer Potansiyeli . . . . .                                                 | 67        |
| 4.4      | Kuantum Tünellemenin Uygulamaları . . . . .                                   | 69        |
| 4.5      | Sonlu Potansiyel Kuyusunda Bağlı Durumlar . . . . .                           | 70        |
|          | Kaynaklar . . . . .                                                           | 72        |

## Şekil Listesi

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Kara cisim, küre şeklindeki kovukta açılan deliktir. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 1.2  | Yalıtılmış, kapalı ve açık sistemlerin temsili. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 1.3  | Denk. 1.2'deki fonksiyonun varlığını gösteren spektrum. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| 1.4  | 3000, 4000 ve 5000 Kelvin sıcaklıklarındaki sistemlerin kara cisim spektrumları. . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| 1.5  | Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının frekansa göre davranışı. . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
| 1.6  | Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının dalga boyuna göre davranışı. . . . .                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| 1.7  | $+z$ yönünde ilerleyen düzlem EM dalgalar. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |
| 1.8  | Hertz tarafından kullanılan deney düzeneğinin şeması [3]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |
| 1.9  | Fotoelektronların (fotoelektrik etkiyle koparılan elektron) sahip olabileceği en büyük kinetik enerjinin ölçümü [3]. . . . .                                                                                                                                                                                             | 12 |
| 1.10 | Işık gönderilen plakanın cinsine bağlı olarak belirli bir frekans değerinin altındaki değerlerde fotoelektron koparılamaz [3]. Dolayısıyla $\nu_0$ frekansının altındaki frekanslar için durdurucu potansiyelin büyüklüğü 0 V'tur. . . . .                                                                               | 12 |
| 1.11 | Compton'un deney sonuçları [3, 10, 11]. $0^\circ$ 'den $135^\circ$ dereceye kadar çizilen çizgi gelen fotonun (aslında neredeyse kinetik enerji ve momentumunu hiç kaybetmeden saçılan fotonun [11]) dalga boyunu ( $\lambda$ ) , diğer çizgiler ise saçılan fotonun dalga boyunu ( $\lambda'$ ) göstermektedir. . . . . | 14 |
| 1.12 | Serbest (veya zayıf bağlı) ve durgun bir elektrona gelen bir fotonun saçılmasının parçacık modeline göre temsili. . . . .                                                                                                                                                                                                | 14 |
| 1.13 | Davisson ve Germer'in deney düzeneğinin şeması[13]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 |
| 1.14 | Davisson ve Germer'in anısına düzenlenen deneyin gerçekleştirildiği Bell laboratuvarındaki anı tablosu[13]. . . . .                                                                                                                                                                                                      | 15 |
| 1.15 | Davisson ve Germer'in deney sonuçları[14]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 |
| 1.16 | Deneyde kullanılan hedefin geometrik yapısı [15]. Kalın ok gelen elektron demetlerini temsil etmektedir. . . . .                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 1.17 | Deney sonuçlarının Bragg yasası ile ilişkisi [14]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 |
| 1.18 | Tonomura [16]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| 1.19 | Tonomura [16]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| 1.20 | <i>Solda:</i> Thomson tarafından önerilen atom modeli ve bu modele göre alfa saçılım deneyinin beklenen sonucu. <i>Sağda:</i> Gerçekleştirilen deneydeki sonuç ve bu sonuca göre Rutherford'un önerdiği gezegen atom modeli. . . . .                                                                                     | 17 |
| 1.21 | Bohr ve Rutherford atom modeline göre tek elektronlu bir atomik yapının temsili. . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 19 |
| 1.22 | Hidrojen atomu için; elektron geçişleri sırasındaki yayınlanan fotonların dalga boyları [18]. . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 19 |
| 1.23 | Franck-Hertz deney düzeneğinin şeması. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 1.24 | Franck-Hertz deneyinde kullanılan civa dolu tüp. Şekilde Katot (C), Izgara (G) ve Anot (A) işaretlenmiştir. . . . .                                                                                                                                                                                                      | 21 |
| 1.25 | Franck-Hertz deneyinde Katot ve Izgara arasına uygulanan elektrik potansiyeline karşı Anotta oluşan akımın grafiği. Şekildeki çukurlar arası uzaklık 4.9 Volt'tur. . . . .                                                                                                                                               | 22 |
| 1.26 | Şeklin sol tarafında civa (Hg) atomlarının uyarılmış atomlarının taban duruma dönebilmek için yayınladıkları fotonların dalga boyu spektrumu verilmiştir. Sağ tarafta ise Franck-Hertz deneyinde gözlenen (254 nm) fotonların dalga boyu verilmiştir. . . . .                                                            | 22 |
| 2.1  | Işık bir dalgadır!?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 |
| 2.2  | Buraya benzeri bir başka şekil konacak!                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3  | $+x$ yönünde ilerleyen ve $y - z$ düzleminde sabit değerli olan düzlem dalganın temsili çizimi. . . . .                                                                                                                                                         | 28 |
| 2.4  | $A(k)$ gaussian dağılım fonksiyonu. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 29 |
| 2.5  | $\omega(k)/k$ sabitken ve $k$ 'nın bir fonksiyonu iken Denk. 2.19 ile hesaplanan $ \psi(x, t) ^2$ 'nin değişimi. . . . .                                                                                                                                        | 30 |
| 2.6  | Tek yarıktan geçen ve kırınımına uğrayan foton demeti . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 33 |
| 3.1  | Sonsuz kuyu . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | 45 |
| 3.2  | Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonları. Dikkat edilirse genlikler sabit ve artan $n$ değerinden bağımsızdır. . . . .                                                                                                                                        | 47 |
| 3.3  | Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonlarının türevlerinin kareleri. Dikkat edilirse artan $n$ ile genlikler de büyümektedir. . . . .                                                                                                                           | 47 |
| 3.4  | Dirac dağılımı. . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | 53 |
| 3.5  | $\alpha \rightarrow 0$ için Dirac dağılımına yaklaşan bir gausyen fonksiyon. . . . .                                                                                                                                                                            | 53 |
| 3.6  | Parçacıkların akısı ve hızları arasındaki bağıntının temsili resmi. <b>Akı:</b> birim zamanda ilgili parçacıkların hızına dik olan birim alandan geçen parçacık sayısıdır. . . . .                                                                              | 54 |
| 3.7  | Yansıma (ayna) simetrisi içermeyen bir potansiyel örneği. . . . .                                                                                                                                                                                               | 57 |
| 4.1  | Basamak potansiyeli. . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 59 |
| 4.2  | Yansıma ve geçiş katsayılarının $E/V_0$ 'a göre davranışları. . . . .                                                                                                                                                                                           | 63 |
| 4.3  | Dalga fonksiyonu genliklerinin $E/V_0$ 'a göre davranışları. . . . .                                                                                                                                                                                            | 63 |
| 4.4  | Sonlu kuyu potansiyeli, $E > 0$ durumu. . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 64 |
| 4.5  | $E/V_0 \leq 1$ durumunda $E \rightarrow 0$ oldukça $T \rightarrow 0$ ve $R \rightarrow 1$ davranışları göstermelerine karşın, bazı özel enerji değerlerinde ( $T = 1, R = 0$ olan yerlerde) " <i>geçiş rezonansları</i> " vardır. . . . .                       | 66 |
| 4.6  | $E/V_0 \geq 1$ durumunda $T \rightarrow 1$ ve $R \rightarrow 0$ davranışlarını göstermektedir. Çünkü enerji arttıkça beklendiği gibi kuyunun yansıtma etkisi zayıflamaktadır. . . . .                                                                           | 66 |
| 4.7  | Şekil 4.5'teki $E/V_0 = 0.885$ değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların sanal kısımlarının davranışları görülmektedir. . . . .                                                             | 66 |
| 4.8  | Şekil 4.5'teki $E/V_0 = 0.885$ değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların karelerinin (olasılık yoğunluklarının) davranışları görülmektedir. . . . .                                         | 66 |
| 4.9  | Bariyer potansiyeli, $E < V_0$ durumu. . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 67 |
| 4.10 | Bir kuantum dalganın sanal kısmının bir bariyer potansiyelinden tünellemesi. Bu örnek için keyfi birimlerde: $a = 0.045, E = 14, V_0 = 20$ ve $\hbar = m = 1$ alınmıştır. $E/V_0 = 14/20 = 0.7$ için $T > 0.8$ olduğu Şekil 4.11'den görülebilir. . . . .       | 68 |
| 4.11 | Bu şekilde, Şekil 4.10'daki örnek için, $0 < E/V_0 < 1$ aralığında $R$ yansıma ve $T$ geçiş katsayılarının davranışları gösterilmektedir. Klasik fizik açısından yasaklı olan ikinci bölge için geçiş katsayısının sıfır olmadığı açıkça görülmektedir. . . . . | 68 |
| 4.12 | Yavaş değişen bir bariyer potansiyelinin kalın dikdörtgen bariyerler olarak yaklaşık halinin temsili. . . . .                                                                                                                                                   | 69 |
| 4.13 | Tek ve çift çözümler. . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 71 |
| 4.14 | Transandantal denklemlerin tek ve çift çözümleri. . . . .                                                                                                                                                                                                       | 72 |
| 4.15 | Sonlu kuyu için $\hbar = m = 2$ ve $a = 2, V_0 = 35$ keyfi birimlerdeki değerleri için yukarıdaki enerji özdeğerleri bulunmuştur. . . . .                                                                                                                       | 72 |

## Tablo Listesi

- 1.1 Wien kayma yasası ile elde edilen dalga boyu değerleri. Şekil 1.4’de spektrum eğrileri üzerinde içi dolu noktalar olarak işaretlenmişlerdir. . . . . 6

Bir zamanlar denildiği gibi; "Araştırmak, herkesin gördüğünü görmek ama hiç kimsenin düşünmediğini düşünmektir." Ama iş işten geçtikten sonra herkes bilge kesilir! [1]

## 1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı

Kuantum fiziğinin doğum sürecinin 14 Aralık 1900 tarihinde başladığı kabul edilebilir. O gün Max Planck Alman Fizik Topluluğu'nun bir toplantısında "Normal Spektrumda Enerjinin Dağılımı Yasası Üzerine" [2] başlıklı makalesini sunmuştu [3]. Bu makale çok ilgi görmemesine rağmen, bir elektronun enerjisinin kuantumlu olabileceğini ilk defa öne sürdüğü için önemlidir.

Kuantum fiziğinin bütünüyle sadece bu makaleyle başladığını söylemek pek doğru olmaz. On dokuzuncu yüzyılın başlarında gerçekleştirilen bazı deneyleri klasik fizik açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu ilk bölümde bu deneyleri ve bu deneylerin açıklanması için ortaya çıkan yeni kavramları (ışığın parçacık özelliği, maddenin dalga davranışı, fiziksel niceliklerin kuantumlanması) anlamaya çalışacağız.

### 1.1 Karacisim Işması

#### 1.1.1 Klasik Fiziğe Göre

On dokuzuncu yüzyılın başlarında fizikçilerin en çok ilgilendikleri konulardan birisi: ısıtılmış cisimlerin nasıl ışıma yaptıklarıdır? Bu nedenle ısıtılmış cisimlerin ışması üzerine bir çok deney yapılmıştır ve teorik olarak açıklanması gereken bir çok deneysel veri ortaya çıkmıştır [4]. Termal ışımlarla ilgili teorik çalışmalar Gustav Kirchhoff'un 1859 yılındaki çalışmaları ile başlar [5].


Kirchhoff "Işık ve ısıнын yayılımı ve soğurulması arasındaki ilişki" [1, 6] adlı makalesinde etrafları mükemmel yansıtıcılarla sarılmış iki yayıcı ve soğurucu sonsuz paralel plakanın ısı dengede durumdaki ışıının alış verişlerini inceledi. Plakaların ışıın yayma, soğurma ve yansıtma özellikleri için sırasıyla  $E(\lambda, T)$ ,  $A$  ve  $R$  ifadelerini aşağıdaki gibi tanımladı:

- $E(\lambda, T)$  (yayınlanma gücü): herhangi bir  $T$  sıcaklığında birim dalga boyu başına ışımanın birim alan ve birim zaman başına şiddetini tanımlar ve birimi  $\text{W/m}^3 \equiv \frac{\text{J}}{\text{s m}^3}$ 'dir.
- $A$  plakanın kendi üzerine gelen ışıının plaka tarafından soğurulma oranıdır.
- $R$  plakanın kendi üzerine gelen ışıının plaka tarafından yansıtılma oranıdır.
- Bu tanımlara göre  $A + R = 1$ 'dir.


Kirchhoff ortaya attığı problemdeki termal dengedeki levhalardan birinden yayınlanan ışıının enerjisinin diğeri tarafından soğurulanın enerjiye eşit olması gerektiğini gösterdi ve böylece her iki plaka içinde  $E/A$  oranının eşit olacağını gösterdi.

Daha sonra Kirchhoff "kara cisim" diye adlandırdığı bütün ışık spektrumunu soğurabilen bir nesne kavramını ortaya attı ve bu nesne için  $A = 1$  olması gerektiğini fark etti. Bu durumda "kara cisim" davranışına sahip cisimler için  $E(\lambda, T)$  evrensel bir fonksiyon halini almaktadır.

Böyle bir karacisim şeklindeki gibi bir küresel kovukta açılan delikle temsil edilir. Bu deliğe gelen neredeyse bütün elektromanyetik ışıınlar kovuktan tekrar çıkamazlar ve kovuk duvarları tarafından soğurulurlar. Böylece kovuğun bu çok küçük deliği bütün elektromanyetik spektrumunu soğuran bir kara cisim halini alır.



Şekil 1.1: Kara cisim, küre şeklindeki kovukta açılan deliktir.



Şekil 1.2: Yalıtılmış, kapalı ve açık sistemlerin temsili.

- Termodinamiğin ikinci yasasına göre yalıtılmış bir sistemin entropisi ya artar ya da ideal bir denge durumunda sabit kalır.

Kara cismin yalıtılmış (izole) bir sistem içerisinde bulunduğunu düşünürsek ve cismin yalıtılmış sistemdeki bütün enerjiyi soğurabileceğini kabul edersek bu yalıtılmış sistemin entropisinin azalacağı anlamına gelir ki; bu durum termodinamiğin ikinci yasasının ihlali anlamına gelir. Bu nedenle kara cisim kendisini çevreleyen yalıtılmış bu sistemle termal ışıma yaparak dengeye gelmek zorundadır.

Kirchhoff bu yasaya dayanarak kovuğun içinde termal ışımının homojen olması gerektiğini ve ışıma akısının yönden bağımsız olması gerektiğini ve aynı sıcaklığa sahip herhangi bir kovuk sistemi için bu durumun geçerli olduğunu gösterdi.

Kovuğun içinde  $\lambda$  ile  $\lambda + d\lambda$  dalga boyları aralığındaki ışımlar için enerji yoğunluğu  $w(\lambda, T)d\lambda$ 'dır ve yayınlama gücü  $E(\lambda, T)$  ile olan ilişkisi aşağıdaki gibidir,

$$w(\lambda, T) = \frac{4E(\lambda, T)}{c}. \quad (1.1)$$


burada  $c$  ışığın boşluktaki hızıdır ve  $w(\lambda, T)d\lambda$ 'nin birimi  $\text{J/m}^3$ 'tür. Wilhelm Wien 1894 yılında enerji yoğunluğunun (deneysel verilerin bir sonucu olarak),

$$w(\lambda, T) = \lambda^{-5} f(\lambda T) \quad (1.2)$$

gibi bir fonksiyon cinsinden yazılabileceğini gösterdi. Bu fonksiyonun bir benzerini frekansa bağlı olarak aşağıdaki gibi yazmak da mümkündür. Eğer  $\lambda = c/\nu$  olduğu hatırlanırsa,  $\lambda$  ile  $\lambda + d\lambda$  dalgaboyları aralığındaki ışımların enerji yoğunluğu için frekansa bağlı ifadenin,

$$w(\lambda, T)|d\lambda| = w(c/\nu, T) \frac{c}{\nu^2} |d\nu| \quad (1.3)$$

şeklinde olacağı açıktır. Bu durumda frekansa bağlı olarak aşağıdaki gibi yeni bir enerji yoğunluğu fonksiyonu tanımlanabilir,



Şekil 1.3: Denk. 1.2'deki fonksiyonun varlığını gösteren spektrum.

$$u(\nu, T) \equiv w(c/\nu, T) \frac{c}{\nu^2}. \quad (1.4)$$

Tanımlanan yeni ifade ile önceki ifade arasında (SI birimleri:  $[w(\lambda, T)] = \text{J/m}^4$  ve  $[u(\nu, T)] = \text{J s/m}^3$ ),

$$u(\nu, T)|d\nu| = w(\lambda, T)|d\lambda| \quad (1.5)$$

bağıntısı ortaya çıkar. Böylece Wien'in önerdiği tek parametrelili bilinmeyen fonksiyon,

$$u(\nu, T) = \nu^3 g\left(\frac{\nu}{T}\right) \quad (1.6)$$

olarak da önerilebilir. Wien bilinmeyen bu fonksiyon için Lummer ve Pringsheim'in deneylerine dayanarak,

$$g(\nu/T) = C e^{-\beta \nu/T} \quad (1.7)$$


formunu önermiştir ve ısıma spektrumunun yüksek frekanslı (düşük dalga boyu) kısımlarını açıklamayı başarmıştır. Yine aynı fonksiyondan faydalananarak,

$$\lambda_{enb} = b/T \quad (1.8)$$

Wien kayma yasası olarak bilinen eşitliği bulmuştur. Burada  $b = 2.8977729(17) \times 10^{-3} \text{ m K}$  değerindedir ve biraz önce bahsedilen deneyden elde edilen bir sabittir. Bütün kara cisim spektrumları için geçerlidir. Bu yasa ile belirli bir sıcaklıkta hangi dalga boyunda en büyük ısıma şiddetinin gerçekleşeceği belirlenebilir. Örneğin Şekil 1.4'teki spektrumlar için Wien yasasından faydalanılarak Tablo 1.1'deki değerler bulunur.

| T (°K) | $\lambda_{enb} (\mu\text{m})$ |
|--------|-------------------------------|
| 3000   | 0.966                         |
| 4000   | 0.724                         |
| 5000   | 0.580                         |

Tablo 1.1: Wien kayma yasası ile elde edilen dalga boyu değerleri. Şekil 1.4'de spektrum eğrileri üzerinde içi dolu noktalar olarak işaretlenmişlerdir.



Şekil 1.4: 3000, 4000 ve 5000 Kelvin sıcaklıklarındaki sistemlerin kara cisim spektrumları.

Wien'in modeli yüksek frekanslarda deneyle uyumlu olmasına karşın düşük frekanslarda bu başarıyı yakalayamamıştır. Ek olarak Wien'in modeli klasik fiziğin temel bazı varsayımlarını göz önüne almamıştır.

J. W. S. Rayleigh klasik fizikteki enerjinin eş bölüşümü teoremini ve elektromanyetik dalgaların kovuk içerisindeki normal modlarını hesaba katarak,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \quad (1.9)$$

sonucuna ulaşmıştır. Burada  $k_B = 1.38064852 \times 10^{-23}$  J/K, Boltzmann sabitidir ve enerjinin eş bölüşüm teoremine göre  $k_B T$  serbestlik derecesi başına ortalama enerjidir. Elde edilen bu dağılım Rayleigh-Jeans dağılımı olarak bilinir. Jeans'in katkısı Rayleigh'in hesaplarında yaptığı bir düzeltmeden kaynaklanmaktadır. Rayleigh-Jeans dağılımı Wien dağılımının aksine yüksek frekanslarda başarısızdır. Ek olarak bütün frekanslar üzerinden alınan integral sonucunda elde edilen kovuk içindeki toplam enerji yoğunluğu ıraksar ve sonsuz değer verir, böylece fiziksel açıdan doğru olmayan bir sonuç elde edilmiş olur.


### 1.1.2 Planck Dağılımı ve Kuantumlu Enerji Kavramı

Planck, Wien ve Rayleigh-Jeans dağılımlarını dikkate alarak deneysel eğriyi çok iyi açıklayan,


$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (1.10)$$

dağılım formülünü elde etmiştir. Burada  $h$  daha sonra çok ünlenen fakat Planck tarafından sadece deneysel ve teorik eğriyi birbirine uydurabilmek için eklenmiş bir serbest parametredir. Daha sonra serbest parametrenin(!) değerinin  $h = 6.626070040 \times 10^{-34}$  J s olduğu bulunmuş ve adına Planck sabiti denmiştir. Planck'ın elde ettiği dağılım ifadesi  $\frac{h\nu}{k_B T} \ll 1$  için Rayleigh-Jeans dağılımına indirgenirken,  $\frac{h\nu}{k_B T} \gg 1$  için Wien dağılımına indirgenmektedir.

Planck ilk önceleri bu ifade için teorik bir temel kuramasa da daha sonra, kovuğun duvarlarındaki ışımının yayılma ve soğurulma dinamik dengesini izah edebilmek için kovuğun duvarlarının basit salıncıklar (osilatör) gibi davrandığını ortaya atmıştır. Bu düşüncüyü ortaya



Şekil 1.5: Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının frekansa göre davranışı.



Şekil 1.6: Üç farklı modelle elde edilen kara cisim ışıma spektrumlarının dalga boyuna göre davranışı.

atarken önemli bir varsayımda bulunmuştur: "herhangi bir  $\nu$  frekanslı ışımanın sadece  $E = h\nu$  enerjili paketler (kuanta) halinde yayılabilir veya soğurabilir".

Boltzmann dağılımı ile kara cismin ortalama enerjisi klâsik fiziğe göre,

$$\overline{E} = \frac{\int_0^{\infty} EP(E)dE}{\int_0^{\infty} P(E)dE} = k_B T \quad (1.11)$$

olarak bulunur. Burada  $P(E)$  basit harmonik salıncıların  $E$  enerjisine sahip olma olasılığını tanımlayan Boltzmann dağılımıdır ve

$$P(E) = \frac{e^{-E/k_B T}}{k_B T} \quad (1.12)$$

olarak tanımlanır. İntegral sonucu elde edilen ortalama enerji  $k_B T$  eş bölüşüm teoremindeki enerjidir. Bulunan bu ortalama enerji Rayleigh-Jeans'in Denk. 1.9'daki dağılımını verir. Bu nedenle Planck  $E$ 'nin sürekli değerlere değilde izinli ve kesikli değerlere sahip olması gerektiğini düşünmüştür. Böylece  $n = 0, 1, 2, \dots$  olmak üzere, Denk. 1.11,

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n P(E_n)}{\sum_{n=0}^{\infty} P(E_n)} \quad (1.13)$$

olarak yeniden yazılabilir. Herhangi bir radyasyon yayılımı veya soğurulması  $E_n = nh\nu$  enerjili değerler alabildiğine göre,

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n \frac{e^{-E_n/k_B T}}{k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-E_n/k_B T}}{k_B T}} \quad (1.14)$$

sonucuna ulaşılır. Gerekli matematiksel işlemler tamamlandığında [3] kovuk içi basit salıncıların (harmonik osilatörlerin) ortalama enerjisi,

$$\overline{E} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (1.15)$$

olarak bulunur. Elde edilen bu sonuç birim hacimdeki harmonik osilatör sayısı ( $\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$ ) ile çarpıldığında Denk. 1.10'deki Planck dağılımı elde edilmiş olur.

Şekil 1.5’de ve 1.6’da sürekli çizgiyle çizilen eğriler Planck dağılımlarıdır ve deneysel verileri en iyi açıklayan dağılımlardır. Ek olarak Planck enerji yoğunluğu dağılımının bütün frekanslar üzerinden integrali alındığında Rayleigh-Jeans gibi ıraksamaz ve sonlu kalır. Integralin sonucunda toplam enerji yoğunluğu ( $[U(T)] = J/m^3$ ) aşağıdaki gibi olur.

$$U(T) = \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} = aT^4 \quad (1.16)$$

Eğer integral yayınım gücü yoğunluğu üzerinden alınmış olsaydı sonuçta toplam birim alan başına güç ( $[E(T)] = W/m^2$ ) ise,

$$E(T) = \sigma T^4 \quad (1.17)$$

olurdu. Her iki ifade de karacisim ışımasını için benzeri bir sonucu ifade etmektedir ve Stefan-Boltzman yasası olarak bilinmektedir: “bütün ışıma spektrumu üzerinden alınan integral sonucu elde edilen ışıma enerji yoğunluğu veya ışıma yayınım gücü sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle doğru orantılıdır”. Her iki ifadedeki sabitlerin değerleri,

$$\begin{aligned} \sigma &= 5.670367(13) \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \\ a &= 4 \frac{\sigma}{c} \end{aligned} \quad (1.18)$$

olarak verilir ve  $\sigma$  Stefan-Boltzmann sabiti [7] olarak adlandırılır.

Planck neden bu şekilde kesikli bir davranışın gerçekleştiğine bir açıklama getiremedi ve bilinmeyen bir nedenle kovuk duvarlarındaki atomların paketler (kuantlar) halinde kesikli enerjiler yayınladıklarını öne sürdü. “Bilinmeyen neden” fotoelektrik etkinin Einstein tarafından çalışılmasıyla açığa çıkarılmış oldu.

Günlük hayatımızda ışığın kesikli veya parçacıklı doğasını görememiz doğaldır. Örneğin, beyaz ışık yayan ve 5 Watt’lık tasarruflu bir ampulden gözümüze 400 nm (mor) ve 700 nm (kırmızı) dalga boyu aralığında bir çok ışık gelmektedir (*elektromanyetik spektrum web link*). Ampulden gelen bütün ışığın en küçük dalga boyuna yani en fazla enerjiye sahip olduğunu varsayalım. Bu durumda bir tek ışık paketinin sahip olacağı enerji,

$$h\nu = hc/\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} \cdot 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{400 \times 10^{-9} \text{ m}} \approx 5 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (1.19)$$

olur. Bu çok küçük bir enerji miktarıdır. 5 Watt’lık tasarruflu ampülün bir saniyede yayınlacağı ışık paketi sayısı ise,

$$N = \frac{5 \text{ J/s}}{5 \times 10^{-19} \text{ J}} \approx 10^{19} \text{ paket/s} \quad (1.20)$$

olur. Bu miktarda paketin insan gözü tarafından bir saniyede tek tek sayılması mümkün değildir!

## 1.2 Fotoelektrik Etki

1860’larda Maxwell ünlü Elektrik ve Manyetik alan denklemlerini yazdı, bu denklemler elektrik yükünün olmadığı bir yerde

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad (1.21)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \quad (1.22)$$


şeklini alırlar. Bu denklemlerden faydalanarak Elektrik ve Manyetik alanının zamanla davranışını Elektromanyetik (EM) dalga olarak aşağıdaki dalga denklemleriyle tanımladı.

$$\begin{aligned}\mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{E} &= 0 \\ \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} - \nabla^2\vec{B} &= 0\end{aligned}\quad (1.23)$$

Işığın da bu denklemlere uygun davranış gösteren EM dalgaları olduğu biliniyordu. Denk. 1.23'teki dalga denklemlerinin çözülmesiyle belirlenen bu EM dalgaları boşlukta,

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(kz - \omega t), \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \sin(kz - \omega t), \quad (1.24)$$

yukarıdaki dalga fonksiyonları ile tanımlanırlar. Burada  $k = 2\pi/\lambda$  dalga sayısı ve  $\omega = 2\pi\nu$  açısal frekanstır. EM dalgaları temsili olarak aşağıdaki şekildeki gibi ilerler ve enerji taşırlar. EM



Şekil 1.7:  $+z$  yönünde ilerleyen düzlem EM dalgalar.

dalgalarının taşıdığı enerjinin akışı matematiksel olarak ise Poynting vektörü ile tanımlanır. Yukarıdaki düzlem dalgalar için,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \quad (1.25)$$

genel tanımından yola çıkarak,

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} E_0 B_0 \sin^2(kz - \omega t) \hat{z} \quad (1.26)$$

olarak bulunur. Poynting vektörü birim alan başına aktarılan gücü ( $W/m^2$ ) veya birim alan başına birim zamanda aktarılan enerjiyi ( $J/s/m^2$ ) tanımlar. Eğer  $x - y$  düzlemine paralel  $z$  eksenine dik  $A$  alanına sahip bir dedektör yüzeyine aktarılabilecek gücü hesaplamak istersek,


$$P = SA \quad (1.27)$$

ile hesaplayabiliriz. EM dalgasının elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin genlikleri arasında  $B_0 = E_0/c$  bağıntısı olduğunu da hatırlayarak,

$$P = \frac{1}{\mu_0 c} E_0^2 A \sin^2(kz - \omega t) \quad (1.28)$$

ile dedektöre aktarılan gücü hesaplayabiliriz. Böylece klasik olarak ışığın bir yüzeye aktarabileceği gücün (veya şiddetin  $I = P/A$ ) elektrik veya manyetik alanın genliğinin karesiyle orantılı olduğu görülür.

Fakat, 1887’de Heinrich Hertz ve daha sonra diğerleri tarafından da gerçekleştirilen fotoelektrik etki deneyleri ışığın EM dalga gibi bir davranış göstermediği durumlarında varlığını ortaya koydu. Deneyde basitçe, A metal plakasına gelen tek renkli ışık eğer elektron koparabi-




Şekil 1.8: Hertz tarafından kullanılan deney düzenine şeması [3].

lirse ve bu koparılan elektron B plakasına ulaşabilirse G ampermetresinde bir akım okunmaktadır. Böyle bir deney düzenine göre klasik EM teoremine göre elektronların koparılabilirliği ve dolayısıyla fotoelektrik etkinin izah edileceği düşünülebilir. Buna göre klasik fiziğin fotoelektrik etki için tahminleri [8] aşağıdaki gibi özetlenebilir.


- **Koparılan elektronların sahip olabileceği en büyük kinetik enerji ( $KE$ ) ışığın şiddetiyle orantılı olmalıdır:** Işığın şiddeti  $I = P/A$  arttıkça  $KE$ 'de artmalıdır. Böylece bir elektrona aktarılan enerjinin artmış olması beklenmelidir.
- **Fotoelektrik etki ışığın frekansından veya dalga boyundan bağımsızdır:** Işığın şiddeti yeterliyse frekansı ne olursa olsun elektron koparılabilir.
- **Işık A plakasına vardıktan sonra saniye mertebesindeki sürelerde plakadan elektron yayınlanır:**  $\Delta E/\Delta t = P_{ort}$  ifadesinden bir elektrona koparmak için ne kadar süre harcanması gerektiği hesaplanabilir. Burada  $\Delta E$  elektron koparmak için gerekli enerji,  $P_{ort}$  gönderilen ışığın ortalama gücü ve  $\Delta t$  elektronun koparılma süresidir. Gecikme süresi beklentisinin nedeni; eğer ışık dalga gibi davranıyorsa bu dalga her bir dalga cephesinin bir elektrona yavaş yavaş enerjisini aktarması ve sonunda yeterli miktarda enerji aktarıncaya elektronun metal yüzeyden kopacağı düşünülmesidir.

Klasik EM teorisinin önerilerine rağmen deneylerde gözlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

- **Belirli bir frekanstaki (veya dalga boyundaki) ışık ile koparılan bir elektronun en büyük kinetik enerjisinin ışığın şiddetiyle bağlantısı yoktur:** Şekil 1.9'a göre  $i$  akım ekseni ışığın şiddeti arttıkça yayınlanan elektron sayısının arttığının bir ölçüsüdür. Fakat her iki farklı şiddetteki ışığın ortak noktası frekanslarının aynı olmasıdır ve bir elektrona aktarabildikleri enerji aynıdır.



Şekil 1.9: Fotoelektronların (fotoelektrik etkiyle koparılan elektron) sahip olabileceği en büyük kinetik enerjinin ölçümü [3].



Şekil 1.10: Işık gönderilen plakanın cinsine bağlı olarak belirli bir frekans değerinin altındaki değerlerde fotoelektron koparılamaz [3]. Dolayısıyla  $\nu_0$  frekansının altındaki frekanslar için durdurucu potansiyelin büyüklüğü 0 V'tur.

- **Eğer ışığın frekansı belirli bir değerin altındaysa fotoelektrik etki gerçekleşmez:** Deney düzeneğindeki metal plakanın cinsine bağlı olarak ışığın frekansı yetersizse, şiddeti ne olursa olsun ışık elektron yayınlanmasını sağlayamaz (bkz. Şekil 1.10).
- **Işık metal plakaya ulaştıktan  $10^{-9}$  s sonra, neredeyse hiç zaman geçmeden, fotoelektron salınımı gerçekleşir:** Bu durum klasik EM dalga teorisinin tahmin ettiği saniye mertebesiyle çelişmektedir.

Einstein 1905 yılında Planck'ında fikirlerinden faydalanarak ışığın dalga paketleri halinde,

$$E = h\nu \quad (1.29)$$

var olabileceklerini ortaya attı. Planck'da kesikli enerjili ışımaları önermişti fakat Planck'a göre siyah cismin duvarlarından salınan termal ışımlar  $h\nu$  enerjisiyle salındıktan sonra tekrar bir su dalgası gibi yayılmaktaydılar. Einstein ise salınan bu ışık paketlerinin (light quanta) dalga gibi yayılmak yerine birer parçacık gibi davrandıklarını iddia etmiştir. Bu parçacığa daha sonraları foton adı verilmiştir.

Foton adlı bu parçacıklar  $h\nu$  enerjisi taşımakla beraber boşlukta ışık hızında hareket ederler. Işık hızına yakın hareket eden cisimler için çoğu zaman Einstein'ın özel görelilik teoremi geçerlidir. Bu teoriye uyduklarına göre kütle sahibi olamazlar aksi takdirde ışık hızına ulaştıklarında sonsuz enerjili olmaları gerekir. Bu teoreme göre fotonlar aynı zamanda  $p = E/c$  momentumu taşırlar. Böylece kütleli parçacıklara benzer davranışlar göstermiş olurlar.

Einstein metal plakaya gelen fotonlardan fotoelektron koparanların enerjilerinin fotoelektronlar tarafından tamamen soğurulduğunu varsaydı ve bunun denklemini enerji korunumundan,

$$E = h\nu = \frac{1}{2}m_e v^2 + W \quad (1.30)$$

olarak tanımladı. Bu formülden anlaşıldığı üzere  $\nu$  frekanslı fotonun enerjisinin bir kısmı fotoelektronu metal yüzeyden koparmak için harcamır ve iş fonksiyonu ( $W$ ) olarak adlandırılır. Geri kalanı ise fotoelektronun kinetik enerjisini oluşturur. Bu kinetik enerji sayesinde fotoelektron diğer plakaya ulaşır ve fotoelektrik etki kaynaklı elektrik akımı oluşur.

Bu denklem ile Einstein fotoelektrik etkinin üç sonucunu da izah etmiş oldu.

- Denklem 1.30 ışığın şiddetinden bağımsızdır, böylece Şekil 1.9'daki  $V_0$  durdurma potansiyelinin  $K_{enb} = -eV_0 = h\nu - W$  eşitliğinden en büyük kinetik enerjiyi vereceği açıktır.
- Aynı denklem  $\frac{1}{2}m_e v^2 = h\nu - W$  olarak yeniden yazılırsa bir metal yüzeyden fotoelektron koparabilecek bir fotonun frekansının, Şekil 1.10'daki gibi,  $\nu_0$  frekansına eşit veya daha büyük olması gerektiği daha açık görülebilir. Bu frekansın değerinin en az  $\nu_0 = W/h$  olması gerektiği açıktır çünkü daha küçük bir frekans değeri için elektronun kinetik enerji sahibi olması mümkün değildir.
- Fotonlar  $E = h\nu$  enerjili ve  $p = E/c = h\nu/c = h/\lambda$  momentumlu bir parçacık gibi davranışlarından, metal yüzeyindeki bir elektronla etkileşimleri ve elektronu metal yüzeyden koparmaları neredeyse anında gerçekleşir.

### 1.3 Compton Etkisi

Planck ve Einstein'ın katkı sunduğu ışık kuantumlarının (fotonların) enerji taşıyan parçacıklar olduğu kavramını destekler nitelikte Einstein 1916 yılında yaptığı çalışmayla fotonların momentum taşımaları gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu ulaşılan teorik sonuç Arthur H. Compton tarafından gerçekleştirilen deneyle doğrulanmıştır.

Compton etkisi (saçılması veya olayı) olarak bilinen bu deneyde  $X$ -ışınları metalik bir yüzeye gönderilmiş ve bu metalden saçılan fotonların dalga boyları, saçılma açıları ve şiddetleri kaydedilmiştir. Şekil 1.11'de verilen deneysel verilere göre metal plakaya gönderilen fotonların bir kısmının dalga boyu değişmezken bir kısmının fark edilir miktarda değiştiği anlaşılmaktadır.

Klasik EM teorisinin temelleri üzerine bu tür deneylerin açıklanması için J. J. Thomson [9] tarafından geliştirilen teoriye göre saçılan ışığın enerjisi gelen ışığın dalga boyundan bağımsızdır. Fakat, Compton, Planck ve Einstein'ın yolunu takip ederek, ışığın bir parçacık gibi davranması gerektiği varsayımıyla yaptığı deneyin verilerini açıklamayı başaramamıştır.

Parçacık modeline göre enerji ve momentum korunumu için,

$$E_\gamma + E_e = E_{\gamma'} + E_{e'} \quad (1.31)$$

$$\vec{p}_\gamma = \vec{p}_{\gamma'} + \vec{p}_{e'} \quad (1.32)$$

eşitlikleri yazılabilir. Burada  $E_\gamma = h\nu$  ve  $E_{\gamma'} = h\nu'$  gelen ve saçılan fotonların enerjileridir. Saçılmadan önce elektron neredeyse durgun kabul edildiğinden  $E_e = m_e c^2$  enerjisine sahiptir, saçıldıktan sonra ise  $E_{e'} = \sqrt{(p_{e'} c)^2 + (m_e c^2)^2}$  enerjisine sahip olabilir (eğer yeterince momentum kazanırsa görelî fiziğin sınırları içine girer). Bu ifadeler enerji korunumunu tanımlayan Denk. 1.31'da kullanılırsa,

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{(p_{e'} c)^2 + (m_e c^2)^2} \quad (1.33)$$

denklemini elde edilir. Bu denklem yeniden düzenlenerek saçılan elektronun momentumu bulunabilir,

$$p_{e'}^2 c^2 = (h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4. \quad (1.34)$$

Momentumun korunumunu belirleyen Denk. 1.32 yeniden düzenlenirse,


$$\vec{p}_{e'} = \vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'} \quad (1.35)$$

halini alır. Saçılan elektronun momentumunun kendisiyle iç (skaler) çarpımı sonucunda,


$$p_{e'}^2 = \vec{p}_{e'} \cdot \vec{p}_{e'} = (\vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'}) \cdot (\vec{p}_\gamma - \vec{p}_{\gamma'}) \quad (1.36)$$

$$= p_\gamma^2 + p_{\gamma'}^2 - 2p_\gamma p_{\gamma'} \cos \theta. \quad (1.37)$$

elde edilir. Elde edilen son eşitliğin her iki tarafı  $c^2$  ile çarpılır ve foton momentumları yerine  $p = E/c = h\nu/c$  yazılabileceği hatırlanırsa,



Şekil 1.11: Compton'un deney sonuçları [3, 10, 11].  $0^\circ$ 'den  $135^\circ$  dereceye kadar çizilen çizgi gelen fotonun (aslında neredeyse kinetik enerji ve momentumunu hiç kaybetmeden saçılan fotonun [11]) dalga boyunu ( $\lambda$ ), diğer çizgiler ise saçılan fotonun dalga boyunu ( $\lambda'$ ) göstermektedir.



Şekil 1.12: Serbest (veya zayıf bağlı) ve durgun bir elektrona gelen bir fotonun saçılmasının parçacık modeline göre temsili.

$$p_e^2 c^2 = p_\gamma^2 c^2 + p_{\gamma'}^2 c^2 - 2c^2 p_\gamma p_{\gamma'} \cos \theta$$

$$p_e^2 c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2(h\nu)(h\nu') \cos \theta \quad (1.38)$$

eşitlikleri elde edilir. Denk. 1.34 ve 1.38'nin sol tarafları eşit olduğuna göre sağ tarafları da birbirine eşit olmalıdır. Bu durumda,

$$(h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4 =$$

$$= (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \theta \quad (1.39)$$

olur. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$2h\nu m_e c^2 - 2h\nu' m_e c^2 = 2h^2 \nu \nu' (1 - \cos \theta) \quad (1.40)$$

olur. Her iki taraf  $2h\nu\nu' m_e c$  ile sadeleştirilirse ve  $\nu = c/\lambda$  olduğu hatırlanırsa,

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) \quad (1.41)$$

dalga boyundaki kaymayı veren denklem elde edilmiş olur.  $h/m_e c \approx 2.4 \times 10^{-10} \text{ cm}$  değerindedir ve elektronun Compton dalga boyu olarak adlandırılır.

## 1.4 Elektron: Parçacık mı, Dalga mı?

1923'te *Louis de Broglie* "Işık paketinin geçici teorisi" adlı çalışmasında her ışık paketinin eylemsiz kütesinin  $m_0$  olması gerektiğini ve bu kütle çok küçük olduğundan ışık paketinin (fotonun) hızının neredeyse ışık hızı  $c$ 'ye çok yakın olması gerektiğini öne sürmüştür. Böylece bir fotonun bütün enerjisi için,


$$h\nu = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.42)$$

eşitliğini önermiştir [12]. Bu eşitlikten yola çıkarak hafif kütleli bütün parçacıklar için,

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (1.43)$$

olacağını öne sürdü. de Broglie fotonu hafif de olsa kütleli kabul etmiştir, fakat günümüzde fotonun kütesinin sıfır olduğu kabul edilmektedir. de Broglie'nin asıl katkısı bu formülüne getirdiği yeni yorumdur. Bu yoruma göre ışık paketi *dalga-parçacık* ikilik (dualite) doğasına sahipse kütleli parçacıklar da *parçacık-dalga* ikilik doğasına sahip olmalıydı.

Örneğin elektron parçacığı de Broglie'nin önerdiği ifadeyle hesaplanan bir dalga boyuna sahip bir dalga gibi davranabilirdi. Bu öneriye ilk deneysel destek C. J. Davisson ve L. H. Germer tarafından gerçekleştirilen elektron kırınımı (difraksiyonu) deneyinden gelmiştir.



Şekil 1.13: Davisson ve Germer'in deney düzeneğinin şeması[13].



Şekil 1.14: Davisson ve Germer'in anısına düzenlenen deneyin gerçekleştirildiği Bell laboratuvarındaki anı tablosu[13].

Davisson ve Germer Şekil 1.13'teki deney düzeneğinde hızlarını belirledikleri elektron demetlerini Nikel kristal hedefe göndererek deneylerini gerçekleştirmişlerdir. Bu hedef Şekil 1.16'daki gibi bir geometrik yapıya ve Şekil 1.15'teki bir kristal yapıya sahiptir. Uygun momentuma sahip elektronlar şekildeki gibi bir kristal yapıdan saçıldıklarında eğer dalga özelliğine sahiplerse yıkıcı ve yapıcı girişimler yapacaklardır. Bu durumda kısmen Bragg yasasına uyarlar. Böylece Şekil 1.17'de verilen denklemlere göre kırınım uğrayıp yapıcı girişim yapan elektronların dalga boyları bulunabilir. Davisson ve Germer'in deneyinde elde edilen sonuçlar Şekil 1.16'nın alt kısmında görülmektedir. Bragg yasasının dalgaların yapıcı veya yıkıcı girişimlerini izah eden formülüyle (Denk. 1.44) ilişkili olarak elektronların spektrumlarındaki tepe ve çukur değerlerinin varlığı anlaşılabilir.


$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.44)$$

Davisson ve Germer'den sonra ise moleküler hidrojen, helyum ve yavaş nötronlarla da benzeri deneyler gerçekleştirilmiş ve parçacıkların dalga yapısındaki davranışları tekrar tekrar gözlenmiştir [5].


Çok küçüklerin dünyasında (mikroskopik seviyede) parçacıkların dalga davranışını gözlemek mümkünken, büyüklerin dünyasında (makroskopik seviyede) parçacıkların dalga davranışını gözlemek mümkün değildir. Örneğin, 0.1 mm yarıçaplı,  $4 \times 10^{-3}$  mg kütleli ve 10 cm/s ile ilerleyen bir su damlası için De Broglie dalga boyu,

$$\lambda = h/p = 6.6 \times 10^{-27} [\text{erg s}] / (4 \times 10^{-5} [\text{g cm/s}]) \approx 1.6 \times 10^{-22} \text{ cm}$$

iken, Proton'un yarı çapı  $10^{-13}$  cm'dir. Bu nedenle günlük yaşantımızda ve deneylerimizde makroskopik seviyede dalga etkilerini gözleyemeyiz [5].



Şekil 1.15: Davisson ve Germer'in deney sonuçları[14].



Şekil 1.16: Deneyde kullanılan hedefin geometrik yapısı [15]. Kalın ok gelen elektron demetlerini temsil etmektedir.

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{n}{2d \sin \theta} = \frac{p}{h} = \frac{\sqrt{2mE}}{h} = \frac{\sqrt{2meV}}{h}$$

*Electron wavelength*
*Bragg law*
*deBroglie relationship*
*Acceleration through voltage V*

Şekil 1.17: Deney sonuçlarının Bragg yasası ile ilişkisi [14].


Çift yarık deneyi sonra yazılacak...

## YAZILACAK


Bu linkten okunabilir.

Çift yarık animasyonu

Parçacık/Dalga?




Şekil 1.18: Tonomura [16].



Şekil 1.19: Tonomura [16].

## 1.5 Rutherford ve Bohr Atom Modelleri



Şekil 1.20: *Solda:* Thomson tarafından önerilen atom modeli ve bu modele göre alfa saçılım deneyinin beklenen sonucu. *Sağda:* Gerçekleştirilen deneydeki sonuç ve bu sonuca göre Rutherford'un önerdiği gezegen atom modeli.

Henri Becquerel ve Marie Cruie'nin öncülüğüne yaptığı radyoaktivite çalışmaları sonucunda, atomun iç yapısını çalışmak için gerekli araçlar ortaya çıkmış oldu. Bunlardan birisi ilk önceleri  $\alpha$  (alfa) parçacıkları olarak adlandırılmış parçacıklardır, çok daha sonra helyum atomunun çekirdeği olduğu anlaşılmıştır.

Ernest Rutherford'un gözetiminde H. W. Geiger ve E. Marsden tarafından 1908'de altın bir plakadan alfa parçacıklarının saçılımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 1.20 temsili gösterilen Thomson atom modeline göre gerçekleştirilen deneylerin sonucunda alfaların çok küçük açılarla saçılacakları öngörülebilir. Çünkü elektronun kütlesi alfa gibi büyük kütleli bir parçacığın büyük açılı saçılmaları uğraması için yeterli değildir. Modele göre elektronları çevreleyen pozitif bulut (!) ise gerekli saçılmayı sağlayacak kadar yoğun değildir.

Thomson modelinin öngörülerine karşın deneylerde nadiren de olsa, Şekil 1.20'da görüldüğü üzere, büyük açılı saçılmaların gerçekleştiği gözlenmiştir. Deneylerin ayrıntılı tarihçesine *Alpha Particles and the Atom* başlıklı web sayfasından ulaşılabilir [17]. Rutherford deney sonuçlarına göre gezegen atom modeli olarak da isimlendirilen atom modelini önermiştir. Bu modele

göre pozitif yükler atomun merkezinde ve çok küçük bir hacimde toplanmış olmalıdır. Böylece alfa parçacıkları büyük kütleli bir merkezden daha büyük bir itici potansiyelle saçılırlar. Bu atom modeline göre elektronlar büyük kütleli ve pozitif yüklü bu merkez etrafında  $1/r^2$  ile orantılı çekici bir kuvvet etkisinde dairesel veya eliptik yörüngeler izlerler.

Rutherford atom modeliyle büyük açılı alfa saçılmaları açıklanabilmiş, fakat yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Elektronlar atom çekirdeği etrafında dairesel yörüngede dönerken, merkezci bir ivmeyle, ivmeli hareket yaparlar. Klasik elektrodinamik (KED) teoriye göre ivmeli hareket yapan herhangi bir elektrik yüklü parçacık ışıma yapar. Bu durumda elektronların nasıl kararlı yörüngelere sahip oldukları açıklanamaz. Çünkü ışıma yapan elektronların enerji kaybederek ve **spiral bir yörünge izleyerek  $10^{-10}$  s 'de çekirdeğe düşmeleri beklenir.**

Dahası KED'eye göre yayınlanan ışımının frekansı elektronun periyodik hareketinin frekansı ile aynı olmalıydı. Fakat, o zamana kadar elde edilen atomik spektrum bilgileriyle bu sonuç çelişmekteydi. Anders Jonas Ångström ve diğerlerinin sonuçlarını inceleyen Johann Jakob Balmer 1885'de ışımaların dalga boyunu veren,

$$\frac{1}{\lambda} = R_y \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (1.45)$$

formülünü keşfetti. Burada  $n_1$  ve  $n_2$  tam sayı,  $R_y$  bir sabittir [5].

Neils Bohr 1913 yılında, Rutherford'dan iki yıl sonra, bu çelişkileri ortadan kaldırmak için kendi varsayımlarını fizik topluluğu ile paylaştı. Bu varsayımlar klasik fiziğin sınırları dışında kalmakla beraber belli ölçüde Rutherford atom modelindeki çelişkilere cevap verdiği düşünülebilir. Çünkü spektrumu açıklarken, kararlılık problemi üzerinde durmamıştır.

- Bir atomik sistemin varlığı ancak *kesikli durağan seviyeler* ile izah edilebilir. Buna göre sistemdeki herhangi bir enerji değişikliği böyle iki seviye arasındaki tam geçişlerle mümkün olabilir.
- İki durağan seviye arasındaki geçişler sırasında yayınlanan veya soğurulan elektromanyetik ışımının frekansı seviyelerin enerjileri  $E_1$  ve  $E_2$  ile,

$$h\nu = E_2 - E_1 \quad (1.46)$$

şeklinde doğrudan ilişkilidir.

- Bu durağan seviyeler Rutherford atom modelindeki izinli yörüngelere (orbitlere) karşılık gelirler. Bu yörüngelerde elektronlar klasik fizikteki gibi herhangi bir açısal momentum değerini alamazlar, bunun yerine açısal momentumları

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi}; \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1.47)$$


ifadesine uyan ve tam sayılarla ifade edilen yörüngelerinde bulunabilirler.

Bu varsayımlardan elde edilen teorik sonuçlar hidrojen gibi tek elektronlu ve dairesel yörüngeli atomları izah etmede başarılı olmuştur. Şekil 1.21'deki temsile göre elektron üzerinde Coulomb yasası gereğince,


$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \quad (1.48)$$

çekici kuvveti oluşur. Klasik olarak Newton mekaniğinde bir cisme dışarıdan uygulanan merkezci kuvvetler için,

$$\sum F_{dış} = m_e a = m_e v^2 / r \quad (1.49)$$



Şekil 1.21: Bohr ve Rutherford atom modeline göre tek elektronlu bir atomik yapının temsili.



Şekil 1.22: Hidrojen atomu için; elektron geçişleri sırasında yayınlanan fotonların dalga boyları [18].

yazılabilir. Elektronu uygulanan tek merkezci ve dış kuvvet Coulomb kuvveti olduğuna göre elektronun hareketini betimlemek için,

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad (1.50)$$

yazılabilir. Bohr'un açısal momentum ile ilgili varsayımı (Denklem 1.47) elde edilen bu son eşitlikte kullanılırsa, sırasıyla elektronun yörünge sürati ve yörünge yarı çapı,

$$v = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi}{nh} \quad (1.51)$$

ve

$$r = \left(\frac{nh}{2\pi}\right)^2 \frac{1}{m_e} \frac{1}{(Ze^2/4\pi\epsilon_0)} \quad (1.52)$$

olur. Klasik olarak elektronun toplam enerjisi,

$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.53)$$

ifadesi ile tanımlanır. Bohr'un modelinden elde edilen sürat ve yarıçap bu denklemde yerine konursa,

$$E = -\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\right) \frac{1}{n^2} \quad (1.54)$$

elektronun toplam enerjisi olarak bulunur. Bu sonuç, Bohr'un elektronların yörünge geçişlerinde yayınlanan elektromanyetik dalganın enerjisini tanımlayan varsayımı ile birleştirildiğinde, Balmer tarafından önerilen (Denk. 1.45) seviye geçişleri denkleminde ulaşılır.

Elektronun enerjisi, sürati ve yarıçapı için yukarıda elde edilen ifadeler bir kaç yeni tanımla daha pratik yazılabilirler. İndirgenmiş Plank sabiti

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054571800 \times 10^{-34} \text{ J s/rad} \quad (1.55)$$

olarak tanımlanırsa ve  $\nu$  (frekans) yerine  $\omega = 2\pi\nu$  (açısal frekans) kullanılırsa Denk. 1.46,

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} \quad (1.56)$$

halini alır. Benzer şekilde, elektromanyetik ışıma paketinin (fotonun) enerjisi,

$$E = \hbar\omega \quad (1.57)$$

olarak yazılabilir. Bohr'un açısal momentum varsayımı,

$$mvr = n\hbar \quad (1.58)$$

şeklinde yeniden yazılabilir. Ayrıca "ince yapı sabiti" adı verilen pratik bir sabit de çok sık kullanılır. Bu sabit ise,

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \frac{1}{137.036} \quad (1.59)$$

olarak tanımlanmıştır. Bu yeni tanımlarla sürat, yarı çap ve enerji ifadeleri sırasıyla,

$$v = \frac{Z\alpha c}{n} \quad r = \frac{\hbar}{m_e c Z \alpha} n^2 \quad (1.60)$$

ve

$$E = -\frac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2 \frac{1}{n^2} \quad (1.61)$$

olarak yazılırlar. Bu ifadelerle Şekil 1.21'deki gibi herhangi bir tek elektronlu atom için,

- en düşük yörüngenin (n=1) yarı çapı (Bohr yarı çapı olarak da adlandırılır),

$$a_0 = \frac{\hbar}{m_e c Z \alpha} 1^2 \approx \frac{137\hbar}{m_e c Z} = \frac{0.053}{Z} \times 10^{-9}\text{m} = \frac{0.053}{Z}\text{nm} = \frac{0.53}{Z}\text{\AA} \quad (1.62)$$

- en düşük Bohr yörüngesindeki elektronun bağlanma enerjisi ve koparma enerjisi (elektro-  
nun serbest hale gelmesi için gerekli enerji),

$$\text{Bağlanma Enerjisi} \equiv E(n=1) = -\frac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2 \frac{1}{1^2} \approx -13.6Z^2\text{eV} \quad (1.63)$$

$$\text{Koparma Enerjisi} \equiv E(n \rightarrow \infty) - E(n=1) = 0 - (-13.6Z^2) = 13.6Z^2\text{eV} \quad (1.64)$$

olarak bulunur. Böyle bir atoma hidrojen (Z=1) örnek verilebilir, hidrojenin atomunun elekt-  
ronu n=2 seviyesinden n=1 seviyesine geçişi sırasında elektromanyetik ışıyım (foton) yayınl-  
yarak enerji kaybeder. Elektronun kaybettiği enerji veya yayınlanan ışıyımın enerjisi,

$$\begin{aligned} \text{Fotonun Enerjisi} &\equiv E(n=2) - E(n=1) = -\frac{13.6}{2^2} - \left(-\frac{13.6}{1^2}\right) \\ &= 13.6\left(1 - \frac{1}{4}\right) \text{eV} = 10.2 \text{eV} \end{aligned} \quad (1.65)$$

olacaktır. Yayınlanan fotonun açısal frekansı ise Denk. 1.56'e göre,

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = \frac{10.2 \text{eV}}{6.58 \times 10^{-16} \text{eV s/rad}} \approx 1.6 \times 10^{16} \text{rad/s}$$

dir. Aynı fotonun dalga boyu ise,


$$\begin{aligned} E &= \hbar\omega = \hbar 2\pi\nu = \hbar 2\pi c/\lambda, \\ \lambda &= \frac{\hbar 2\pi c}{E} = \frac{6.58 \times 10^{-16} \text{eV s/rad} \cdot 2\pi \cdot 3 \times 10^8 \text{m/s}}{10.2 \text{eV}} \approx 1.2 \times 10^{-7} \text{m} \\ \lambda &= 120 \text{ nm} = 1200 \text{\AA} \end{aligned}$$

olarak bulunur. Bu değer Lynman serisi olarak adlandırılan ve fotonların seviyeler arası geçişlerini tanımlayan spektrumdaki bir değerdir (bkz. Şekil 1.22).


Bu ışınım elektromanyetik spektrumun morötesi kısmında yer alır ve deneysel verilerle uyumludur. Böylece daha önce anlaşılamayan deneysel bazı sonuçlar Bohr atom modeli ile aydınlatılabilmektedir. Bohr modeli önemli bir başarı gösterse de, elektronlar ne zaman bir yörüngeden sıçrama yapmalı veya yayınlanan fotonun yönü ne olmalı gibi sorulara yanıt verememiştir. Ayrıca açısal momentumun ve seviyelerin kuantumlanma kuralı sadece dairesel yörüngeli durumlar için geçerlidir. Eliptik yörüngeler için A. Sommerfeld ve W. Wilson başka bir kuantumlanma şartı tanımlamışlardır [3, 5].

## 1.6 Franck-Hertz Deneyi

Thompson'ın modelinden Rutherford'unkine ve sonra 1913'te Bohr'un atom modeline ulaşmakla beraber Bohr'un modelinde önerdiği gibi elektronlar için kesikli yörüngelerin varlığına dair kanıt sunan bir deney daha ortaya çıkmamıştı. James Franck ve Gustav Hertz Bohr'un modelinin farkında olmadan 1914'te Franck-Hertz deneyi olarak adlandırılacak olan deneylerini gerçekleştirdiler. Bohr 1915'te bu deneyin sonuçlarının kendi modelini izah ettiğini ve desteklediğini açıkladı. Fakat Franck ve Hertz bunu 1917 yılına kadar farketmediler [19]. Her iki deneyci de 1925'te bu deneylerinin katkısı dolayısıyla 1925'te Nobel Fizik Ödülünü aldılar.



Şekil 1.23: Franck-Hertz deney düzeninin şeması.




Şekil 1.24: Franck-Hertz deneyinde kullanılan civa dolu tüp. Şekilde Katot (C), Izgara (G) ve Anot (A) işaretlenmiştir.


Franck-Hertz deneyinin şeması ve deneyde kullanılan civa dolu tüpün bir resmi Şekil 1.23 ve 1.24'te görülmektedir. Bu deneyde ısıtılan katottan (C) ortaya çıkan elektronlar içi civa dolu tüpteki artı yüklü ızgaraya (G) doğru hızlanmaktadır. Izgarayı geçtikten sonra ise anota (A) doğru giderken 1.5 Volt gibi daha düşük fakat ters kutuplu bir potansiyelle yavaşlatılmaktadır. Izgaraya gelirken civa atomlarının elektronlarıyla çeşitli çarpışmalar gerçekleştiren elektronların yeterince kinetik enerjisi kalmıyorsa anota ulaşabilirler. Anot'a elektronların ulaşip ulaşmadığı ise anot çıkışına bağlanan ampermetrede okunun akımın artması ve azalmasıyla gözlenir. Eğer akım artıyorsa elektronların çoğunluğunun ulaşmış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Deneyinde sonunda ortaya çıkan akım artış ve azalışlarının grafiği elektronlara kinetik enerjisini kazandıran elektrik potansiyeline karşı Şekil 1.25'te gösterilmiştir.

Şekil 1.25 incelendiğinde elektronlar enerji kazandıkça anota ulaşan elektron sayısı artmaktadır. Fakat 4.9 V civarına gelindiğinde ilginç bir şekilde anottan okunan akım büyük miktarda azalmaktadır ve benzeri davranış 4.9 Voltun tam katları şeklinde devam etmektedir. Bohr'un yorumuna göre; bu değer civa atomunun kesikli yörüngelerinden birine denk gelmektedir ve bir

elektron bu kinetik enerjiye ulaşınca 4.9 eV'luk enerjisini bir civa atomunun iç yörüngelerinden birindeki bir elektrona aktarmaktadır. Şekilde anot akımının değerinin düşüşünün birden çok görülmesinin nedeni elektronların birden çok civa atomuyla çarpışması olarak yorumlanabilir. Elektronları inelastik olarak uyarılan bu civa atomları tekrar taban durumuna dönmek için 4.9 eV'luk bu uyarılma enerjisini foton paketleri halinde yayınlamak durumunda olmalıydılar. Franck ve Hertz bu fotonu da gözlediklerini ve dalga boyunun 254 nm olduğunu rapor ettiler. Böylece Bohr'un atom modeli büyük bir deneysel desteğe kavuşmuş oldu ve *eski kuantum teorisinin* bir parçası haline geldi.



Şekil 1.25: Franck-Hertz deneyinde Katot ve Izgara arasına uygulanan elektrik potansiye-line karşı Anotta oluşan akımın grafiği. Şekildeki çukurlar arası uzaklık 4.9 Volt'tur.



Şekil 1.26: Şeklin sol tarafında civa (Hg) atomlarının uyarılmış atomlarının taban duruma dönebilmek için yayınladıkları fotonların dalga boyu spektrumu verilmiştir. Sağ tarafta ise Franck-Hertz deneyinde gözlenen (254 nm) fotonların dalga boyu verilmiştir.

## 1.7 Uygunluk İlkesi

### The Correspondence Principle and the Quantum Oscillator

Niels Bohr kuantum teorisinin klasik fiziğin alanına giren bölgelerde klasik fizikle aynı sonuçları vermesi gerektiğini önerdi. Bu fikir *uygunluk ilkesi* [*correspondence principle*] olarak adlandırıldı. Buna göre bir kuantum sisteminin "*kuantum sayıları*" çok büyük değerlere ulaştığında bu sistemin asimtotik davranışı klasik fizikle uyumlu olmalıdır.

Bir elektronun klasik olarak dairesel yörüngede yapacağı ışımanın frekansı:

$$\nu_{cl} = \frac{v}{2\pi r} = \frac{Z\alpha c}{n} \frac{Z\alpha m_e c}{2\pi n^2 \hbar} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi \hbar} \frac{1}{n^3} \quad (1.66)$$

$n \gg 1$  durumunda bir elektronun  $n+1 \rightarrow n$  seviye geçişinde yapacağı ışımanın frekansı:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \hbar} \frac{m_e c^2 (Z\alpha)^2}{2} \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \quad (1.67)$$

**YAZILACAK**

## Kaynaklar

- [1] M. Jammer, *The Conceptual Development of Quantum Mechanics* (McGraw-Hill, New York, 1966).
- [2] M. Planck, “Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum”, *Annalen der Physik* **309**, 553–563 (1901).
- [3] R. M. Eisberg ve R. Resnick, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles*, 2. bs., Assisted by David O. Caldwell and J. Richard Christman (John Wiley & Sons, New York, 1985).
- [4] E. A. Sharkov, *Passive Microwave Remote Sensing of the Earth, Physical Foundations*, 1. bs., Springer Praxis Books (Springer, Berlin ve Heidelberg, 2003).
- [5] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003).
- [6] G. R. Kirchhoff, “Ueber den Zusammenhang zwischen Emission und Absorption von Licht und Wärme”, Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Reprinted in G. Kirchhoff, *Gesammelte Abhandlungen* (Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1882), pp. 566–571; reprinted again as section II in *Abhandlungen über Emission und Absorption*, ed. Max Planck, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, no. 100 (Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1898), pp. 6–10, 783–787 (1859).
- [7] National Institute of Standards and Technology, *Fundamental Physical Constants — Extensive Listing: 2014 CODATA Recommended Values*, Includes the 2014 CODATA recommended value of the Stefan–Boltzmann constant, [https://physics.nist.gov/cuu/pdf/all\\_2014.pdf](https://physics.nist.gov/cuu/pdf/all_2014.pdf) (erişim tarihi 25/09/2015).
- [8] K. S. Krane, *Modern Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, 2012).
- [9] J. J. Thomson, *Conduction of Electricity through Gases*, 2. bs., Cambridge Physical Series, See especially pp. 321–330 for the theory of secondary radiation (Cambridge University Press, Cambridge, 1906), 678 ss.
- [10] A. H. Compton, “A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements”, *Physical Review* **21**, 483–502 (1923).
- [11] HyperPhysics, *Compton Scattering Data*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/compdat.html> (erişim tarihi 22/09/2019).
- [12] A. P. French ve E. F. Taylor, *An Introduction to Quantum Physics*, MIT Introductory Physics Series (W. W. Norton, New York, 1978).
- [13] Wikipedia contributors, *Davisson–Germer Experiment*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Davisson-Germer\\_experiment](https://en.wikipedia.org/wiki/Davisson-Germer_experiment) (erişim tarihi 06/10/2018).
- [14] HyperPhysics, *Davisson–Germer Experiment*, Department of Physics ve Astronomy, Georgia State University, <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/DavGer2.html> (erişim tarihi 06/10/2018).
- [15] C. J. Davisson ve L. H. Germer, “Reflection of Electrons by a Crystal of Nickel”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **14**, 317–322 (1928).
- [16] Wikipedia contributors, *Double-Slit Experiment*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit\\_experiment](https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment) (erişim tarihi 06/10/2018).
- [17] American Institute of Physics, *Alpha Particles and the Atom*, Center for History of Physics, <https://history.aip.org/exhibits/rutherford/sections/alpha-particles-atom.html> (erişim tarihi 08/10/2018).

- [18] Wikipedia contributors, *Hydrogen Spectral Series*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen\\_spectral\\_series](https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_spectral_series) (erişim tarihi 27/09/2019).
- [19] D. Greenberger, K. Hentschel ve F. Weinert, ed., *Compendium of Quantum Physics, Concepts, Experiments, History and Philosophy*, 1. bs. (Springer, Berlin ve Heidelberg, 2009).


If all this damned quantum jumps were really  
to stay, I should be sorry I ever got involved  
with quantum theory.  
—Erwin Schrödinger [1]

## 2 Dalga-Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi

Kuantum fiziğinin doğum sürecini anlattığımız bir önceki bölümün içeriği genellikle *Eski Kuantum Teorisi* olarak adlandırılır. Çünkü, gerçekleştirilen keşifleri açıklamak için kullanılan veya ortaya konan kuralların tam olarak birbirleriyle sağlam bir bağlantısının olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Daha iyi bir açıklama için ortaya konan “Kuantum Mekaniği” iki defa keşfedilmiştir denebilir, ilki 1925’te matris mekaniği formalizmiyle Werner Heisenberg tarafından ve ikincisi 1926’da dalga mekaniği ile Erwin Schrödinger tarafından. Her ikisinin eş değeri olduğu sonradan gösterilmiş olmasına rağmen Schrödinger’in yöntemi daha çok kullanılır hale gelmiştir. Çünkü dalga mekaniğinin matematiği fizikçiler arasında daha yaygındır [2].

### 2.1 Dalga-Parçacık İkilemi

Kuantum fiziğini başlatan deneyler ve deneyleri açıklamak için geliştirilen teori ve modeller; klasik fizikte parçacık olarak bilinen (elektron, proton, nötron vb.) fiziksel varlıkların dalga özellikleri gösterdiklerini, benzeri şekilde dalga özelliği gösteren elektromanyetik dalganın parçacık (foton) özelliği gösterdiğini doğrulamıştır.




Şekil 2.1: Işık bir dalgadır!?

Bu durumda kuantum fiziğinin sınırları içine giren herhangi bir fiziksel varlık, hem dalga hem de parçacık davranışı gösterebilmektedir. Dalga özelliği gösteriyorsa; kutuplanma, girişim ve kırınım gibi davranışlar göstermesi beklenirken, parçacık özelliği gösterdiğindeyse; klasik fizikteki gibi enerji ve momentum taşınması beklenmektedir. Belirli şartlar altında ışığın veya herhangi bir elektromanyetik dalganın enerji ve momentum taşıdıkları fotoelektrik etkisi, Compton saçılması ve karacisim ışıması deneylerinde gözlenmiştir. İnsan gözüyle fotonlar tek tek seçilemese de, fotonları tek tek seçebilen ve fotoçoklayıcı [2] olarak adlandırılan cihazlar mevcuttur.

Dirac’ın kuantum mekaniği üzerine yazdığı bir kitabında ilginç bir düşünce deneyi vardır. Belirli bir kutuplanmaya sahip ışık fotoelektrik etkide olduğu gibi elektron elde etmek için kullanılırsa, yayınlanan elektronların açısal dağılımı fotonların kutuplanmasıyla ilişkilidir. Fotoelektrik etkiye göre bir foton bir elektron koparabildiğine göre, fotonların enerji ve momentuma ek olarak kutuplanmaya da sahip oldukları söylenebilir. Buna göre başlangıçta  $I_0$  şiddetine sahip ve kutuplanmış bir ışık demetini sadece belli bir kutuplanma eksenindeki ışığın geçmesine izin veren bir kristalden geçirdiğimizi düşünelim. Eğer gelen ışığın tamamı kristalden geçecek kutuplanmaya sahipse geçen ışığın şiddeti de  $I_0$  olacaktır. Eğer kutuplanma vektörü kristalin kutuplandırma eksenini ile  $\theta$  açısı kadar farka sahipse, geçen ışık şiddeti  $I_0 \cos^2 \theta$ ’a kadar olur. Bu

durumu her bir foton için tek tek ele alalım. Eğer ışık demeti tamamen kristalin kutuplanma eksenini ile aynı yönde kutuplanmışsa demeti oluşturan bütün fotonların hepsi aynı yöndeki kutuplanmaya sahiptir. Fakat farklı bir polarizasyona (kutuplanmaya) sahip bir ışık demetinde ise demetin şiddeti  $\cos^2 \theta$  ile belirlenen oran kadar azalacaktır. Bunun anlamı bu oran kadar fotonun kristalden geçebilmesidir. Fakat, *fotonlar bölünemezler* bu durumda bir foton kristalden ya geçer ya da geçemez. Bireysel olarak hangi fotonun geçtiğini bilmemiz mümkün değildir. Bütün söyleyebileceğimiz  $N$  tane foton geldiyse, bunun  $N \cos^2 \theta$  kadarının geçtiğidir. Böyle bir fotonun bu kristalden geçebilme olasılığı  $\cos^2 \theta$  olur.

Klasik optik fiziğine göre bir çok foton içeren bir ışık demeti girişim ve kırınım gibi dalga özellikleri gösterecektir. Fakat ışığın dalga özelliğinin tek bir foton için de geçerli olduğunu gösteren deneyler de gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birisi de **G. I. Taylor** tarafından 1909 yılında yapılmıştır. Bu deneyde bir iğne ucu etrafında çok düşük şiddetteki (bir kerede bir fotonun geçtiği) ışığın bile kırınımına uğradığı gösterilmiştir(!) Bu bize ışığın dalga davranışının fotonların toplu (kollektif) bir davranışı sonucunda değil de, bireysel özelliklerinin bir sonucu olarak var olduğunu göstermiştir. Bu durumda yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. **(Taylor'ın deneyinden sonra gerçekleştirilen bir başka deney için bkz. [3].)** [Taylor'ın deneyi üzerinde bazı şüpheler mevcut, ders notunun ileriki güncellemelerinden birinde bu şüphelerin giderilmesi iyi olur.]



**Figure 1.9** The double-slit experiment:  $S$  is a source of waves,  $I_1$  and  $I_2$  are the intensities recorded on the screen when only  $S_1$  is open, and then when only  $S_2$  is open, respectively. When both slits are open, the total intensity is no longer equal to the sum of  $I_1$  and  $I_2$ ; an oscillating term has to be added.

Şekil 2.2: Buraya benzeri bir başka şekil konacak!

Taylor'un deneyinin bir benzeri olan çift yarık deneyini düşünelim. Diğer deneydeki gibi her defasında bir foton gelsin ve Şekil 2.2'deki gibi yarıklardan birinden geçtikten sonra arkadaki ekranda yakalansın. Her iki yarıktan açıkken, yeterince sayıda foton geçtikten sonra klasik olarak beklendiği üzere (ışık dalga olduğundan) Şekil 2.2'in en solundaki gibi bir girişim deseni gözlenir. Klasik olarak bu durum çok rahat açıklanabilir. Eğer yarık 1 ve yarık 2'den geçen elektromanyetik dalgalar  $\vec{E}_1(\vec{r}, t)$  ve  $\vec{E}_2(\vec{r}, t)$  ile temsil edilirlse, arkadaki ekrandaki bir  $\vec{r}$  konumunda  $t$  anında toplam dalga bu iki dalganın toplamı olacaktır. Bu klasik elektromanyetik teoremin bir parçası olan Maxwell denkleminin lineer olması dolayısıyla üst üste binme (süperpozisyon) ilkesine uymasının sonucudur. Arkadaki ekranda gözlenecek olan ışığın toplam şiddeti ise,

$$I \propto E^2 = \vec{E} \cdot \vec{E} = |\vec{E}_1 + \vec{E}_2|^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \quad (2.1)$$

denklemini ile belirlenir. Oluşan girişim deseninin matematiksel kaynağı  $\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2$ 'dir. Eğer iki yarıktan sadece birisi açık olsaydı, sadece  $|\vec{E}_1|^2$  veya  $|\vec{E}_2|^2$  ile orantılı şiddetler gözlenebilirdi. Eğer bu şiddetleri polarizasyon deneyinde olduğu gibi olasıkla ilişkilendirirsek, sadece birinci

veya ikinci yarıktan geçme olasılıkları sırasıyla  $P_1(r, t)$  ve  $P_2(r, t)$  olurken, her iki delik açıkken geçme olasılıkları bu iki olasılığın doğrudan toplamı olmaz.

Fotonlar bölünemez olduklarına göre ve bu davranış tek bir foton için de geçerli olduğuna göre, bu durum ancak *bir fotonun kendi kendisiyle girişim* yapabileceğini varsaymakla çözülebilir. Böyle bir fotonun iki yarık açıkken sahip olacağı klasik elektromanyetik dalga alanı,

$$\vec{e} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \quad (2.2)$$

şeklinde olacaktır ve Maxwell'in çizgisel klasik elektromanyetik dalga denklemlerine uygun olacaktır. Polarizasyon deneyinde olduğu gibi bu deneyde de tek bir fotonun hangi yarıktan geçtiğini bilmek mümkün değildir.

İlk keşfedildiklerinde elektronların parçacık yönüyle karşılaşmıştır. Klasik olarak hareketlerinin yörüngesi üzerlerine etki eden manyetik ve elektrik alanlar ile belirlenebilir, kütlelidirler, enerji ve momentum taşırlar. Daha sonraları elektron kırınımı ve elektron için çift yarık deneyleriyle elektronların da dalga davranışı gösterdikleri gösterilmiştir. Elektron için gerçekleştirilen çift yarık deneyinde de, yukarıda foton için gerçekleştirdiğimiz düşünce deneyine benzer şekilde, elektronların çift yarıktan geçtikten sonra arkadaki ekranda girişim desenleri oluşturdıkları gözlenmiştir. Fotonlarda girişim desenin oluşma nedeni toplu bir davranışın değil bireysel davranışların sonucuydu, elektronların girişim deseni de aynı şekilde bireysel bir davranışın sonucudur. Foton için tanımladığımız gibi elektronun kendi kendisiyle girişimini ifade eden bir dalga fonksiyonu tanımlamak mümkündür. Böylece çift yarık deneyindeki bir elektronun dalga fonksiyonu,

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_1(\vec{r}, t) + \psi_2(\vec{r}, t) \quad (2.3)$$

olarak yazılabilir. Bu dalga fonksiyonunun elektronun girişimini izah eden çizgisel bir denkleme uyması beklenir. Böylece elektronun yarıklardan birisi açık olduğundaki dalga fonksiyonlarının toplamı, üst üste binme ilkesi gereğince, her iki yarık açık olduğundaki dalga fonksiyonunu vermedir. Böyle bir dalga fonksiyonunu kullanan ünlü bir çizgisel denklem **Schrödinger denklemi**'dir. Bu denklemde  $\psi(\vec{r}, t)$  elektronun  $\vec{r}$  konumunda ve  $t$  anında ikinci ekranda bulunma olasılığıyla ilişkilidir.

## 2.2 Düzlem Dalgalar ve Dalga Paketleri

Bu bölümde sıradan düzlem dalgalardan yola çıkarak elektron gibi bir parçacığın parçacık özelliklerini de içerecek olan *dalga paketi* kavramını inceleyeceğiz. Bu dalga paketleri parçacıkları temsil etmekle beraber, sanki gerçekten bir parçacık gibi davranan dalga paketleri varmış gibi düşünmek doğru değildir [2].

Basit harmonik bir hareketi tanımlayan  $k$  dalga sayısına sahip ve  $+x$  yönünde ilerleyen bir dalga,

$$\psi_k(x, t) = A_1 \cos(kx - \omega t) + A_2 \sin(kx - \omega t) \quad (2.4)$$

olarak veya,

$$\psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{-i(kx - \omega t)} \quad (2.5)$$


şeklinde yazılabilir. Dalga sayısı ve dalga boyu arasında, açısal frekans ve periyot arasında ve açısal frekans ile frekans arasında sırasıyla aşağıdaki bağıntılar vardır;

$$k = 2\pi/\lambda, \quad \omega = 2\pi/T, \quad \text{ve} \quad \omega = 2\pi\nu. \quad (2.6)$$

Klasik dalgalardan hatırlanacağı üzere  $\omega$  ve  $k$  arasındaki bağıntı, bir dalganın dağınımlı bir ortamda mı, yoksa dağınımsız bir ortamda mı bulunduğunu belirlemektedir. Örneğin boşlukta ilerleyen ışık (veya elektromanyetik dalga) için  $\omega$  ve  $k$  arasındaki bağıntı,

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi c/\lambda, \text{ olduğundan } \omega = ck \quad (2.7)$$

olur. Çünkü dağınımsız ortamlarda  $\omega$  ve  $k$  doğru orantılıdır. Dağınımlı bir ortam da ise açısal frekans dalga sayısının ( $\omega(k)$ ) bir fonksiyonu olarak yazılabilir. Örneğin, dağınımlı ortamda ışığın frekansı ortamın kırılma indeksine bağlı olarak  $\nu = c/n\lambda$  şeklinde yazılabilir.  $n$  ise genellikle  $\lambda$ 'nın bir fonksiyonudur. Doğal olarak  $\omega$  ve  $k$  arasındaki doğru orantının kaybolacağı açıktır. Şimdi yukarıdaki bilgilere göre dalga paketi kavramını tanımlamaya çalışalım.  $\psi_k(x, t)$   $y$  ve



Şekil 2.3:  $+x$  yönünde ilerleyen ve  $y - z$  düzleminde sabit değerli olan düzlem dalganın temsili çizimi.

$z$ 'den bağımsız olduğu için Şekil 2.3'deki gibi bir davranışa sahip düzlem dalgadır.  $\psi_k(x, t)$  ile bir kuantum davranışlı varlığın (elektron, foton v.b.) bütün sahip olabileceği  $k$  değerli dalga fonksiyonlarını tanımlamak mümkündür. Çift yarık deneyinde elektron veya foton için sadece iki dalga fonksiyonunun süperpozisyonu söz konusuysa bu durumda bütün olası durumları göz önüne alabilmek için genliği  $k$ 'ye bağlı  $A(k)$  genlikli,

$$\psi_k(x, t) = A(k)e^{i(kx - \omega t)} \quad (2.8)$$

bir ilerleyen düzlem dalga yazmak mümkündür. Bu düzlem dalgaların süperpozisyonu ise,

$$\psi(x, t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} dk \psi_k(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dk A(k)e^{i(kx - \omega t)} \quad (2.9)$$


ile elde edilir. Süperpozisyon sonucu elde edilen bu dalga fonksiyonu, *dalga paketi* olarak adlandırılır. Dalga paketi  $t = 0$ 'da

$$\psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} dk A(k)e^{i(kx)} \quad (2.10)$$

olur. Klasik parçacıklar dalgalardan farklı olarak belirli bir konuma sahip olduklarından ve bir dalga paketi ile parçacık özelliklerini tanımlamak istediğimizden, dalga paketinin erişimi de sonlu bir dağılım olmalıdır. Bu nedenle  $A(k)$ ,

$$A(k) = e^{-\alpha(k - k_0)^2/2} \quad (2.11)$$

gibi, gausyen (gaussian) dağılım olarak adlandırılan, bir dağılım tercih edilebilir. Bu dağılımın merkezi  $k_0$  civarındadır ve merkezden uzaklaşırken hızla değeri azalır. Daha sonra bir parçacığın momentumunun belirli bir aralıkta olma özelliğini tanımlayan bu fonksiyonun karesinin önemli olduğunu göreceğiz. Bu fonksiyonun karesinin tepe değerinden  $\frac{1}{e}$  değerine  $\alpha(k - k_0)^2 = 1$  olduğunda düşer. Buna göre  $k - k_0 = \pm 1/\sqrt{\alpha}$  olarak bulunur. Böylece  $k = k_0 \pm 1/\sqrt{\alpha}$  olur.  $k$ 'nin iki farklı değeri  $k_+$  ve  $k_-$  olarak adlandırılırsa ve dağılımın genişliği  $\Delta k \equiv k_+ - k_-$  olarak tanımlanırsa,  $\Delta k = 2/\sqrt{\alpha}$  olarak bulunur. Şekil 2.4'de  $A(k)$  ve onun dağılım genişliği  $\Delta k$  gösterilmiştir.

Şekil 2.4:  $A(k)$  gaussian dağılım fonksiyonu.

$t = 0$ 'daki dalga paketini tanımlayan integral önce  $q' = k - k_0$  değişken dönüşümü yapılarak,

$$\psi(x, 0) = e^{ik_0x} e^{-x^2/2\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} dq' e^{-\alpha q'^2/2} = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}} e^{ik_0x} e^{-x^2/2\alpha} \quad (2.12)$$

şeklinde çözümlenebilir. Sabitleri göz önüne almazsak elde ettiğimiz dalga paketi sanki yeni bir dağılım fonksiyonuyla düzlem dalganın çarpımı gibi durmaktadır. Bu yeni dağılım fonksiyonu parçacığı  $x = 0$  civarında yerleştirmeye çalışmaktadır.  $A(k)$  dağılım fonksiyonuna benzer şekilde bu dağılım fonksiyonun genişliği ise  $\Delta x \equiv x_+ - x_- = 2\sqrt{\alpha}$ 'dır. İlginç bir şekilde dalga paketinin şeklini belirleyen  $\Delta k$  ve  $\Delta x$  genişliklerinin çarpımı,

$$\Delta k \Delta x = 4 \quad (2.13)$$

değerine sahiptir ve  $\alpha$ 'dan bağımsızdır. Bu ilişki Fourier türü integrallerin genel bir özelliğidir.

Bir dalga paketinin  $t = 0$  anında sahip olabileceği formunu ve bu formun genişliğini sınırlayan bir bağlantı elde etmiş olduk. Bu dalga paketinin zamanla nasıl ilerleyeceğini ise (şimdilik) yaklaşık olarak çalışmak yeterlidir. Bu yaklaşıklıkta  $k_0$  etrafında çok dar bir dağılıma sahip bir dalga paketini düşünelim, böyle bir dağılım için çok geniş bir  $x$  dağılımına sahip olacaktır. Bu özelliklere sahip dalga paketi aşağıdaki gibi tanımlanan grup hızı ile hareket eder ([grup hızını ve faz hızını karşılaştıran bir video bağlantısı](#)).

$$v_g = \left. \frac{\partial \omega(k)}{\partial k} \right|_{k=k_0} \quad (2.14)$$

Denk. 2.9'e göre  $A(k)$  ve  $\omega(k)$ 'nin davranışı bilinirse dalga paketinin zamanla değişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Dalga paketi  $k_0$  etrafında dar bir dağılıma sahip olduğundan  $A(k)$  çok keskin artan bir tepe şeklinde olacaktır.  $\omega(k)$ 'nin ise  $k$ 'nın yavaş değişen bir fonksiyonu olduğunu kabul edersek  $\omega$  için yaklaşık olarak,

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + (k - k_0) \left. \frac{\partial \omega(k)}{\partial k} \right|_{k=k_0} + \frac{1}{2} (k - k_0)^2 \left. \frac{\partial^2 \omega(k)}{\partial k^2} \right|_{k=k_0} \quad (2.15)$$

ifadesi yazılabilir. Böylece  $(kx - \omega t)$  için de,

$$(kx - \omega(k)t) \approx (k_0x - t\omega(k_0)) + (k - k_0) \left[ x - t \left. \frac{\partial \omega(k)}{\partial k} \right|_{k=k_0} \right] - \frac{t}{2} (k - k_0)^2 \left. \frac{\partial^2 \omega(k)}{\partial k^2} \right|_{k=k_0}$$

eşitliği elde edilir. Bu ifade Denk. 2.9'te yerine konursa ve  $q = k - k_0$  değişken dönüşümü yapılırsa,

$$\psi(x, t) \approx e^{i(k_0x - \omega(k_0)t)} \int_{-\infty}^{\infty} dq A(q + k_0) e^{iq(x - v_g t)} e^{-iq^2 \beta t/2} \quad (2.16)$$

dalga paketi integraline ulaşılır, burada  $\beta$  sembolü

$$\beta = \left. \frac{\partial^2 \omega(k)}{\partial k^2} \right|_{k=k_0}$$

olarak integrali kısaltmak için tercih edilmiştir. İntegral çözülünce,

$$\psi(x, t) \approx \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha + 2i\beta t}} e^{i(k_0 x - w_0 t)} e^{-\frac{(x - v_g t)^2}{2\alpha + 4i\beta t}} \quad (2.17)$$


dalga paketi fonksiyonu elde edilir. Dalga fonksiyonu içinde sanal bir kısım da içerdiğinden pek açık değildir. Fizikçiler arasında daha çok anlamlı bulunan dalga fonksiyonunun mutlak değeridir. Karmaşık sayı yapısına sahip bir dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesi ise,

$$|\psi(x, t)|^2 = \psi^*(x, t)\psi(x, t) \quad (2.18)$$

dalga fonksiyonunun kendi eşleniği ile çarpılması işlemiyle hesaplanır. Böylece ilgilenilen dalga paketinin mutlak değerinin karesi,

$$|\psi(x, t)|^2 \approx \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2 + 4\beta^2 t^2}} e^{-\frac{(x - v_g t)^2}{\alpha^2 + 4\beta^2 t^2}} \quad (2.19)$$

olur. Eğer integrale  $\omega$ 'nın ikinci dereceden türevinden gelen terim de diğer yüksek dereceli terimler gibi sıfır olsaydı. Dalga paketi hiç değişmeden  $v_g$  hızı ilerlerdi. Örneğin, boşlukta ilerleyen ışık için  $\omega = kc$  ve  $v_g = c$  olur ve ışık  $v_g$  hızlı bir dalga paketi olarak ilerler.  $\beta$  sembolü ile temsil edilen ikinci dereceden bu terim sıfırdan farklı olursa, bu durumda  $e^{-iq^2 \beta t/2}$  ifadesinden dolayı dalga paketinin şekli (genişliği ve yüksekliği) değişir.



Şekil 2.5:  $\omega(k)/k$  sabitken ve  $k$ 'nın bir fonksiyonu iken Denk. 2.19 ile hesaplanan  $|\psi(x, t)|^2$ 'nin değişimi.

## 2.3 Dalga Fonksiyonunun Olasılık Yorumu

Çift yarık deneyinde bir fotonun kendi kendisiyle girişimini de izah eden toplam dalga fonksiyonunun karesinin fotonun, arka plandaki ekranda, belirli bir konum ve zamanda bulunma olasılığıyla orantılı olduğunu belirtmiştik. Benzetim yaparak  $\psi(r, t)$  dalga fonksiyonuyla tanımlanan bir kuantum nesne için  $|\psi(r, t)|^2$ 'nin bu nesnenin belirli bir konumda ve zamanda bulunma olasılığıyla ilişkili olduğunu iddia edebiliriz. Dalga fonksiyonunun olasılık yorumunu

ilk ortaya koyan Max Born'dur. Max Born'a göre tek (iki, üç) boyutlu bir uzayda bir kuantum nesnenin (örneğin elektronun)  $x$  ile  $x + dx$  konumları arasında bulunma olasılığı,

$$P(x, t)dx \equiv |\psi(x, t)|^2 dx \quad (2.20)$$

ile tanımlanır. Bu yoruma göre  $|\psi(x, t)|^2$ 'nin zamanla yayılımı ilgili kuantum nesnenin (elektron, foton v.b.) ilerleyen zamanla birlikte ve artan bir ihtimalle başlangıçta bulunduğu bölgenin dışında bulunabileceği anlamına gelir (bkz. Şekil 2.5).

Kuantum fiziğinde olasılık kavramı klasik fiziktekinden farklıdır. Örneğin bir madeni paranın fırlatılmasıyla yazı mı, tura mı geleceğini bilememizin nedeni klasik fizikte sistem hakkındaki bilginizin yetersizliği olarak belirtilir (ortamdaki hava moleküllerinin tek tek bireysel olarak para yüzeyi ile etkileşmesini ölçmek (bilmek) zordur v.b. gibi). Fakat kuantum fiziğinde ihtimaliyet bilgi eksikliğinden değil, dalga fonksiyonu hakkında bilebileceklerimizin temel bir sınırlamasından kaynaklanır.

Olasılık yoğunluğu yorumu çift yarık deneyindeki elektron girişiminin izahı için kullanılırsa,  $\psi_1$  ve  $\psi_2$  sırasıyla birinci yarık açıkken ikinci yarık kapalıyken (veya tersi durumdaki) dalga fonksiyoları olmak üzere, arkadaki ekranda elektronların bulunma ihtimaliyetleri,

$$P(x, t) = |\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\text{Re}(\psi_1\psi_2^*) \quad (2.21)$$

ile orantılıdır. Çünkü en sondaki terim olmadan girişim deseni izah edilemez. Bu nedenle  $\psi_1$  ve  $\psi_2$  için kurulacak olan diferansiyel denklem çizgisel olmalıdır ve dalga fonksiyonlarının üst üste gelmesi kuralına uygun olmalıdır.

Girişim desenini izah eden bu sonuç her zaman gözlenemeyebilir. Eğer yarıklardan birini kapatarak elektronları sadece bir yarıktan geçmeye zorlarsak ve böylece bir elektronun hangi yarıktan geçtiğini bilirsek elde edeceğimiz olasılık dağılımı,

$$P(x, t) = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 \quad (2.22)$$

olur. Bu durumda girişim deseni gözlenemez. Demek ki; girişim desenini gözleyebilmek için, elektronların geçtikleri yarıkların bilinmemesi gerekmektedir. Böylece şöyle bir sonuca varılabilir, *eğer elektronların hangi yarıktan geçtiği biliniyorsa dalga fonksiyonlarının kareleri toplanarak, aksine hangi yarıktan geçtikleri bilinmiyorsa dalga fonksiyonlarının toplamalarının karesi alınarak olasılık dağılımları bulunur.*

## 2.4 Schrödinger Denklemi

Buraya kadar serbest hareket eden bir elektronun  $x$  konumunda ve  $t$  anında bulunma olasılığını tanımlayan bir dalga fonksiyonu tanımladık. Planck'ın  $E = \hbar\omega$  ve de Broglie'nin  $p = \hbar k$  ( $\lambda = h/p$ ) bağlantılarını kullanarak dalga fonksiyonunun kuantum fiziği ile bağıntı kurabiliriz. Bu tanımlamalar ile dalga paketini,

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) e^{i(px - Et)/\hbar} \quad (2.23)$$

şeklinde yeniden yazabiliriz. Burada  $A(k)$ 'nin yerini  $\frac{\phi(p)}{2\pi\hbar}$  almıştır. Serbest bir parçacığın toplam enerjisi

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (2.24)$$

ile tanımlanır. Enerji ifadesi, Momentum ve grup hızı arasında

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{\hbar \partial \omega}{\hbar \partial k} = \frac{\partial \hbar \omega}{\partial \hbar k} = \frac{\partial E}{\partial p} = \frac{p}{m}$$

bağıntısı ortaya çıkar. Böylece  $E = \hbar\omega$  seçimimizin doğru olduğunu iddia edebiliriz.

Eğer ilgilendiğimiz parçacık serbest olmasaydı toplam enerji

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (2.25)$$

olurdu. Eğer bu ifadeyi doğrudan Denk.2.23'de yerine koyarsak çok anlamlı bir sonuç elde edemeyiz. Çünkü dalga paketine sadece,

$$e^{iV(x)/\hbar}$$

katkısı gelir. Bu durumda  $V(x)$ 'in tanımladığı potansiyelin parçacık üzerindeki etkisini göremeyiz. Çünkü

$$|\psi(x, t)|^2 \sim e^{iV(x)/\hbar} e^{-iV(x)/\hbar} = 1$$

olur. Bu sonuca göre elektron  $V(x)$  potansiyelinden etkilenmeden serbestçe hareket eder ki, bu doğru bir sonuç değildir. Yapılması gereken  $V(x)$ 'in etkisini de hesaba katacak bir denklem geliştirmektir.

Eğer Denk. 2.23 ile tanımlanan dalga paketinin zamana göre türevini alırsak,

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) E(p) e^{i(px-Et)/\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) \frac{p^2}{2m} e^{i(px-Et)/\hbar} \end{aligned} \quad (2.26)$$

elde ederiz. Konuma göre birinci ve ikinci dereceden türevlerini alırsak,

$$\begin{aligned} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) p e^{i(px-Et)/\hbar} \\ \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) p^2 e^{i(px-Et)/\hbar} \end{aligned} \quad (2.27)$$

elde ederiz. Zamana ve konuma göre türevlerden elde ettiğimiz bu sonuçları birleştirirsek,

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} \quad (2.28)$$

serbest bir parçacığın *Schrödinger denklemi* olarak adlandırılan diferansiyel denkleme ulaşırız. Denklemi serbest parçacığın klasik enerjisi (Denk. 2.24) ile kıyaslırsak  $E$  ve  $p$ 'nin yerini sırasıyla  $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$  ve  $\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$  ifadelerinin aldığını söyleyebiliriz. Bu benzetmeyi serbest olmayan bir parçacığın klasik enerji ifadesi (Denk. 2.25) ile de yaparsak,

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x, t) \quad (2.29)$$

serbest ve serbest olmayan parçacıkları tanımlayabileceğimiz, daha genel bir Schrödinger denklemi yazmış oluruz.

## 2.5 Heisenberg'in Belirsizlik Bağıntıları

Hatırlanırsa dalga paketinin konuma ve dalga sayısına göre dağılımlarının genişliklerinin çarpımından Denk. 2.13'i elde etmiştik. Bu bağıntı Fourier türü integrallerin daha genel bir sonucu olan,

$$\Delta k \Delta x > \frac{1}{2} \quad (2.30)$$


ifadesinin özel bir halidir.  $p = \hbar k$  bağıntısı ve dalga paketinin momentum uzayında da bir karşılığı olduğu hatırlanırsa yukarıdaki ifade,

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.31)$$

halini alır ve Heisenberg belirsizlik bağıntısı olarak adlandırılır. Dalga paketlerinin incelenmesi sonucu elde ettiğimiz bu eşitliğin sayesinde anlıyoruz ki; dalga fonksiyonu hem konumu hem de momentumu çok keskin bir doğrulukla veremez. Klasik mekanikteki anlayışımıza ters bir durumdur. Bu eşitlik klasik kavramlar olan konum ve momentumun doğru ölçülmesinde kuantum sistemlerin doğasından kaynaklanan bir sınırlama olduğunu göstermektedir. Klasik fizikteki gibi konum ve momentumun birbirinden bağımsız olacağını söylemek artık mümkün değildir. Bu nedenle bu tür fiziksel nicelikler tümleyen değişkenler olarak adlandırılır. Kuantum fiziğinin doğasındaki bu sınırlamalar ile ilgili aşağıda örnekler verilmiştir.

### 2.5.1 Bir Foton Demetinin Kırınımı

#### Tek yarık kırınımı



Şekil 2.6: Tek yarıktan geçen ve kırınımına uğrayan foton demeti

Şekil 2.6’teki gibi bir tek yarıklı filtreye foton demeti gönderdiğimizizi düşünelim. Foton demetinin dalga davranışı gösterdiğini düşünecek olursak, şekildeki gibi bir kırınım deseni oluşturarak dağılacaktır. Bu dağılmanın miktarını,

$$\theta \approx \frac{\lambda}{a}$$

ifadesi belirler. Dalga parçacık ikileminin bir sonucu olarak foton demetini aynı yarıktan geçen parçacıklar olarak da düşünmek mümkündür. Eğer foton parçacıklarının momentumlarını ve konumlarını kesin bir doğrulukla bilebilseydik, foton (parçacık) demetinin dağılmadan tek yarıktan geçmesi sağlanabilirdi. Fakat, fotonu parçacık olarak da düşünelim, dalga olarak da düşünelim yapılan deneylerde bu dağılım ortaya çıkmaktadır.

Burada bir paradoks varmış gibi görünmekle beraber, bizi bu sözde paradokstan kurtaran Heisenberg’in belirsizlik bağıntısıdır. Fotonlar  $x$  doğrultusunda  $p_x = h/\lambda$  momentumuna sahip olacak şekilde bir kaynaktan çıkıyor olsunlar.  $y$  doğrultusundaki konumlarını,

$$\Delta y \leq a$$

aralığıyla sınırlı bir belirsizliği içerecek kadar bilebiliriz. Bu durumda yarıktan geçtikten sonraki  $y$  doğrultusundaki momentumları Heisenberg'in bağıntısına göre,

$$\Delta p_y \geq \frac{h}{\Delta y} > \frac{h}{a}$$

civarında bir belirsizliğe sahip olur. Yarıktan geçmeden önce fotonlar sadece  $p_x$  momentumlu iken sonrasında  $\Delta p_y$  belirsizliği civarındaki ve  $y$  doğrultusundaki momentumlara sahip olacaklardır.  $\Delta p_y$ 'yi başlangıçtaki  $p_x$  momentumundan sapma miktarı gibi düşünersek ve  $p$ 'yi yarıktan sonraki toplam momentum olarak tanımlarsak, her iki doğrultudaki momentumların bir birine oranı demetin dağılma miktarı hakkında bilgi verecektir. Buna göre,

$$\frac{\Delta p_y}{p_x} = \frac{p \sin \theta}{p \cos \theta} \approx \theta \quad (\text{çok küçük açılar için}) \quad (2.32)$$

$$\frac{\Delta p_y}{p_x} \approx \frac{h/a}{h/\lambda} \approx \frac{\lambda}{a} \quad (2.33)$$

olur. Böylece foton demetini elektromanyetik dalga olarak incelediğimiz durumdaki dağılımın parçacık durumu içinde geçerli olduğunu göstermiş oluruz.

## 2.5.2 Bohr Yörüngelerinin Yerelleşememesi

Kuantum fiziğine göre; bir elektronun bağlı bulunduğu atom etrafındaki klasik bir kapalı yörüngede hareket etmesi kavramı anlamını yitirmiştir. Çünkü bir elektronun bir kapalı yörüngeyi izlediğini söyleyebilmek için o yörünge üzerinde elektron yörüngeyi tamamlayana kadar elektronu izlemek gerekir. Böyle bir izlemenin yapılabilmesi için elektronun yörünge üzerindeki herhangi bir andaki konumunun büyük bir kesinlikle bilinmesi gerekir.

Geçici olarak, Bohr'un varsayımlarına göre bir dairesel yörüngeyi izlediğini iddia ettiğimiz bir elektronu düşünelim. Böyle bir elektronun yörünge üzerinde hangi konumda bulunduğu ölçebilmek için üzerine bir foton göndermeliyiz. Böyle bir fotonun dalga boyunun atomun klasik yörüngelerini çözme gücüne sahip olması gerekir, diğer bir deyişle fotonun dalga boyu iki klasik yörünge arası mesafeden küçük olması gerekir. Bohr'un varsayımlarından yola çıkarak elde ettiğimiz yörünge yarıçapı ifadesini iki yörünge arasındaki uzaklığı bulmak için,

$$r_{n+1} - r_n = \frac{\hbar}{m_e c \alpha} [(n+1)^2 - n^2] = \frac{\hbar}{m_e c \alpha} (2n+1) \approx \frac{\hbar}{m_e c \alpha} n$$

kullanabiliriz. Aradığımız çözünürlüğe ulaşabilmek için fotonun dalga boyu bu uzaklıktan küçük olmalıdır,

$$\lambda \ll r_{n+1} - r_n.$$

Böyle bir fotonun momentumu ise,

$$p_\gamma \approx \frac{h}{\lambda} \gg \frac{m_e c \alpha}{2\pi n}$$

olur ki, bu momentumun tamamının konumunu bilmek istediğimiz elektrona aktarıldığını düşünelim. Elektronun enerjisindeki değişim veya elektrona aktarılan enerji yaklaşık olarak,

$$\begin{aligned} E = \frac{p^2}{2m_e} \Rightarrow \Delta E &\approx \frac{p \Delta p}{m_e} \approx \frac{p p_\gamma}{m_e} = \frac{(m_e c)(m_e c \alpha / 2\pi n)}{m_e} \\ &\approx \frac{m_e c^2 \alpha}{2\pi n} \gg \frac{m_e (c \alpha)^2}{n^2} \end{aligned}$$

hesaplamalarıyla bulunur ki, bu enerji yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere elektronun bağlanma enerjisinden çok daha büyüktür. Böyle bir enerji ile konumunu bilmek istediğimiz elektronu yörüngesinden çıkarmış oluruz. Ortaya çıkan sonuca göre konumunu yüksek kesinlikle bilmek istediğimiz sistemin, momentumu hakkındaki bilgi edinme kabiliyetimizi büyük ölçüde zayıflatmış oluruz. Böylece Heisenberg'in belirsizlik bağıntısının bir kere daha doğrulandığını söyleyebiliriz.

## 2.6 Dalga Fonksiyonun ve Olasılığın Normalizasyonu

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx P(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x, t)|^2 = 1 \quad (2.34)$$

Olasılık yorumuna göre toplam olasılığı veren yukarıdaki integralin sonucu sonlu bir değer vermelidir. Elde edilen integral sonucu birim değere sahip değilse, gelenek olduğu üzere toplam olasılık 1'e normalize edilir. Normalizasyon sonucu elde edilen katsayı ile dalga fonksiyonu çarpılır, böylece elde edilen yeni dalga fonksiyonu da Schrödinger denkleminin bir çözümüdür. Çünkü dalga denklemi çizgiseldir. Yeni dalga fonksiyonuna normalize edilmiş dalga fonksiyonu denir.

Böylece bir kuantum durumu izah edecek başlangıç durumu dalga fonksiyonunun "*karesi integrallenebilir*" bir fonksiyon olması gerekir.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x, 0)|^2 < \infty \quad (2.35)$$

Karesi integrallenebilir olma şartının matematiksel ifadesi yukarıdaki gibidir. İleride konum ( $x$ ) ve konuma göre türev ( $\partial/\partial x$ ) içeren bir çok integrale karşılaşacağız. Örneğin,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) x^n \psi(x, t)$$

ve

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \left( \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x, t)$$

gibi, bu integrallerin karesi integrallenebilir olması için  $\psi(x, 0)$  başlangıç durumu dalga fonksiyonunun  $x \rightarrow \pm\infty$  ile hızlıca sifıra gitmesi gerekir. Ayrıca  $\psi(x, t)$   $x$ 'in sürekli bir fonksiyonu olmalıdır.

### 2.6.1 Olasılık Akısının Tanımı ve Önemi

Dalga fonksiyonunu  $t = 0$  anında normalize etmekle, herhangi bir  $t$  anında da dalga fonksiyonunu normalize etmiş olur muyuz? Soruyu olumlu cevaplayabilmek için

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} dx P(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x, t)|^2 = \frac{\partial}{\partial t} N(t) \stackrel{?}{=} 0 \quad (2.36)$$

Denk. 2.34'in zamana göre kısmi türevi olan yukarıdaki ifadenin belli şartlarda sifıra eşit olabileceğini göstermek gerekir. Eğer eşitlik sağlanırsa  $N(t) = \text{sabit}$  olur. Böylece dalga fonksiyonu herhangi bir  $t$  anında normalize edilebilir. Yukarıdaki eşitliği sorgulamak için öncelikle  $P(x, t)$  olasılık yoğunluğunun  $t$ 'ye göre kısmi türevi alınır,

$$\frac{\partial}{\partial t} P(x, t) = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (2.37)$$

elde edilir. Elde edilen bu eşitliğin sağ tarafında Schrödinger denklemi ve onun karmaşık eşleniği olan,

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi^*(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \psi^*(x, t) \quad (2.38)$$

hali kullanılırsa ve  $V(x)$ 'in reel bir fonksiyon olduğu kabul edilirse,

$$\frac{\partial}{\partial t} P(x, t) = \frac{1}{i\hbar} \left( \frac{\hbar^2}{2m} \right) \left( \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \psi - \psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) \quad (2.39)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{\hbar}{2im} \left( \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right) \right] \quad (2.40)$$

sonucuna ulaşılır. Burada eşitliğin sağında türevin içinde kalan kısmı *olasılık akısı* olarak tanımlanır,

$$j(x, t) \equiv \frac{\hbar}{2im} \left( \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right). \quad (2.41)$$

Bu tanımla olasılık yoğunluğunun zamana göre değişimini veren denklem,

$$\frac{\partial}{\partial t} P(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = 0 \quad (2.42)$$

halini alır. Süreklilik denklemi olarak da adlandırılan denklemin  $x$ 'e göre integrali alınırsa,

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} dx P(x, t) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = -j(x, t) \Big|_{-\infty}^{\infty} \quad (2.43)$$

sonucu elde edilir. Bu son eşitliğin en sağ tarafı sıfıra eşit olursa, aradığımız sonuca ulaşmış oluruz. Aranılan sıfırın elde edilmesi için *olasılık akısının* denklemini incelemek gerekir: denklemde dalga fonksiyonunun (ve eşleniğinin) kendisi ve birinci türevi vardır. Eğer  $x \rightarrow \pm\infty$  durumunda dalga fonksiyonu ve eşleniği sıfıra giderse ve birinci türevleri de sabit değerli kalırsa aranılan sonuca ulaşılabilir. Böylece Denk. 2.36'nın bu şartlar altında sağlanacağı ve bu şartlara uyan dalga fonksiyonlarının herhangi bir  $t$  anında normalize edilebileceği gösterilmiş olur.

**“MIT Açık Dersler”den güzel bir video dersi kaynağı:**

**Lecture 6: Probability density and current. Hermitian conjugation.**

## 2.7 Konum ve Momentum Beklenen Değerleri

Heisenberg'in belirsizlik bağıntıları kavramını incelerken anladığımız üzere bir parçacığın konum veya momentumunu kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Bunun yerine belirli olasılıklarla hangi değerler civarında konuma ve momentuma sahip olabileceği hakkında konuşabiliriz. Böyle bir olasılığı hesaplamak için, bir sınavda alınan notların standart sapmasını belirlemek için kullandığımız yöntemle benzer bir yöntem geliştirmeliyiz [4].

Genellikle sınavlarda bilinmek istenen ilk şey: Sınavın not ortalaması nedir? Bütün sınavın not toplamını sınavı giren toplam kişi sayısına bölersek bu ortalamayı rahatça buluruz. Eş değer olarak aşağıdaki gibi bir olasılık dağılımı oluşturabiliriz,

$$P(n) = \frac{N(n)}{N} \quad (2.44)$$

Burada  $N(n)$ ,  $n$  notunu alanların sayısı ve  $N$  sınıf mevcududur. Eğer not aralığı  $0 \leq n \leq 100$  ile tanımlanmışsa  $P(n)$ ,

$$\sum_{n=0}^{100} P(n) = \sum_{n=0}^{100} \frac{N(n)}{N} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{100} N(n) = 1 \quad (2.45)$$

normalizasyon şartını sağlamalıdır. Böylece sınavın ortalaması,

$$\langle n \rangle = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{100} n N(n) = \sum_{n=0}^{100} n P(n) \quad (2.46)$$

olur. Ortalamanın yanında ortalama etrafındaki dağılım bilgisini veren *standart sapmayı* da bilmek sınavın not dağılımı hakkında daha çok bilgi edinilmesini sağlar. Tek bir sınav notu için standart sapma,

$$\sigma_n^2 \equiv (n - \langle n \rangle)^2 \quad (2.47)$$

ile tanımlanır. Bütün sınavın standart sapması ise bireysel standart sapmaların ortalamasıdır ve,

$$\sigma^2 \equiv \langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle = \sum_{n=0}^{100} \sigma_n^2 P(n) \quad (2.48)$$

ile tanımlanır. Aşağıdaki gibi bir kaç düzenleme ile,

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sum_{n=0}^{100} \sigma_n^2 P(n) = \sum_{n=0}^{100} (n - \langle n \rangle)^2 P(n) \\ &= \sum_{n=0}^{100} (n^2 P(n) - 2n\langle n \rangle P(n) + \langle n \rangle^2 P(n)) \\ &= \sum_{n=0}^{100} n^2 P(n) - 2\langle n \rangle \sum_{n=0}^{100} n P(n) + \langle n \rangle^2 \sum_{n=0}^{100} P(n) \\ &= \langle n^2 \rangle - 2\langle n \rangle \langle n \rangle + \langle n \rangle^2 \end{aligned}$$

kısaca,

$$\sigma^2 = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 \quad (2.49)$$

olarak yazılabilir. Böylece sınavdaki notların,

$$\langle n \rangle - \sigma \leq n \leq \langle n \rangle + \sigma$$

ifadesine göre  $\langle n \rangle$  ortalaması etrafında dağılım gösterdiklerini söyleyebiliriz. Notların az bir kısmı bu aralık dışında kalabilir.

Benzeri bir uygulamayı ilgilendiğimiz parçacığın konumu ve momentumu için de yapabiliriz. Örneğin konum ( $x$ ) veya konumun bir fonksiyonu ( $f(x)$ ) için ortalama değer,

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) P(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) f(x) \psi(x, t) \quad (2.50)$$

olarak yazılabilir. Bu ortalama değer genellikle *beklenen değer* olarak adlandırılır. Beklenen değer ifadesinden aynı fiziksel olayın gerçekleştirilen bir dizi deneyinde ölçüm sonuçlarının her zaman  $\langle f(x) \rangle$  sonucunu vereceği anlaşılmamalıdır. Ölçümlerin sonuçlarının beklenen değer etrafında  $\Delta f(x) = \sqrt{\langle f(x)^2 \rangle - \langle f(x) \rangle^2}$  standart sapmasına göre dağılımları beklenir. Kuantum fiziğindeki standart sapmanın integral formu aşağıdaki gibidir.

$$\Delta f(x)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) f(x)^2 \psi(x, t) - \left( \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) f(x) \psi(x, t) \right)^2 \quad (2.51)$$

Bir parçacığın konumu için beklenen değeri ve standart sapmayı bulmak kolaydır,  $f(x)$  yerine  $\hat{x}$  (konum operatörünü) koymak yeterlidir.

Parçacığın momentumunun beklenen değeri için nasıl bir yol izleyeceğimiz çok açık değildir. P. Ehrenfest *uygunluk prensibinden* faydalanarak,

$$p = mv = m \frac{dx}{dt}$$

klasik ifadesinin,

$$\langle \hat{p} \rangle = m \frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt}$$

olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Buradan yola çıkarak,

$$\begin{aligned} \langle \hat{p} \rangle &= m \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \hat{x} \psi(x, t) \\ &= m \int_{-\infty}^{\infty} dx \left( \frac{\partial \psi^*(x, t)}{\partial t} \hat{x} \psi(x, t) + \psi^*(x, t) \hat{x} \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (2.52)$$

yazılabilir. Schrödinger resminde operatörler sabit olduğundan bu hesapta  $d\hat{x}/dt$  türev ifadesinin yer almadığına dikkat edilmelidir. Zamanla değişen operatörlerin beklenen değerleridir çünkü zamana bağlı olan ifade  $\psi(x, t)$  ve onun eşleniğidir. Dalga fonksiyonunun zamanla değişimi  $\langle \hat{x} \rangle$ 'deki zamana bağlı değişimi belirler. Olasılık akısını hesaplarken yaptığımız gibi yukarıdaki denklemde Schrödinger denklemini ve eşleniğini kullanarak,

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left( \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) \quad (2.53)$$

sonucuna ulaşırız. Bu ifadeyi üzerinde biraz daha matematiksel çalışma yapmalıyız.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi \right) &= \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi + \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi + \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left( \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) &= \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \end{aligned}$$

Yukarıdaki iki eşitlikten alttaki üsttekinden çıkarılırsa,

$$\left( \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi$$

elde edilir. Eşitliğin sol tarafındaki son iki terim için de,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi^* \psi}{\partial x} &= \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi &= \frac{\partial \psi^* \psi}{\partial x} - \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{aligned}$$

bu matematiksel işlemin sonucu kullanılırsa,  $\langle p \rangle$  için,

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left( \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) = \frac{\hbar}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[ \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \psi \right) + 2\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$$

sonucuna ulaşılır. Bu ifadeyi biraz daha açarsak,

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{\hbar}{2i} \left( \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \hat{x} \psi - \psi^* \hat{x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \psi \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi$$

momentumun beklenen değerini bulmaya daha da yakınlaşmış oluruz. Bu son ifadedeki ilk terimdeki dalga fonksiyonları ve eşlenikleri  $\pm\infty$  durumları için sifıra gideceklerinden ilk terim kaybolur ve momentumun beklenen değeri,

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x, t)^* \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) \quad (2.54)$$

olarak bulunur. Burada klasik momentumun kuantum fiziğinde bir diferansiyel operatörle (işlemci) ile temsil edildiğini kabul ederiz ve bu operatörün,

$$\hat{p} \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \quad (2.55)$$

ile tanımlarız. Bu tanımlı kabullendiğimiz takdirde serbest bir parçacığın enerjisi için

$$\hat{E} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (2.56)$$

yazılabilir. Böylece bir serbest parçacığın enerjisinin beklenen değeri,

$$\langle \hat{E} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x, t)^* \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi(x, t) \quad (2.57)$$

integrali ile hesaplanabilir. Dikkat edilirse yeni tanımlandığımız bu operatörleri klasik ifadelerden ayırmak için üzerine şapka sembolü ekliyoruz.

Momentum operatörünün  $i$  sanal sayısını içeriyor olması beklenen değer de bazen sanal sayı içerebileceğini düşünödürebilir. Beklenen değerin sanal olup olmayacağını,

$$\langle \hat{p} \rangle - \langle \hat{p} \rangle^* = 0 \quad (2.58)$$

ifadesi ile test edebiliriz. Eğer eşitlik sağlanırsa  $\langle \hat{p} \rangle$  reeldir. Çünkü, reel bir sayının eşleniği kendisine eşittir. Şimdi bu eşitliği test edelim.

$$\begin{aligned} \langle \hat{p} \rangle - \langle \hat{p} \rangle^* &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi - \left( \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi \right)^* \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \left( \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi - \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi \left( -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi^* \\ &= \frac{\hbar}{i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[ \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \psi + \psi \frac{\partial}{\partial x} \psi^* \right] = \frac{\hbar}{i} \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\partial}{\partial x} (\psi^* \psi) \\ &= \psi^* \psi \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0 \end{aligned}$$

Bu teste göre eşitlik sağlanır, çünkü son elde edilen terimdeki dalga fonksiyonu ve eşleniği sonsuzda sifıra gidecektir. Böylece momentumun beklenen değerinin daima reel olacağını söyleyebiliriz. Bu tür reel değerli beklenen değer üreten operatörlere *hermityen operatörler* denir.

Elde ettiğimiz bu hermityen momentum operatörünü kullanarak Schrödinger denklemini,

$$\hat{H} \psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) \quad (2.59)$$

operatör formunda yazabiliriz, burada  $\hat{H}$  *Hamiltonyen işlemcisi* olarak adlandırılır ve,

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x) \quad (2.60)$$

olarak tanımlanır.

### 2.7.1 $\phi(p)$ ve $\psi(x, 0)$ Arasındaki İlişki

Serbest parçacık durumunu düşünecek olursak, Schrödinger denkleminin en genel çözümü  $\phi(p)$ 'nin şekline (davranışına) bağlıdır.  $\phi(p)$ 'nin şeklini ise  $t = 0$  anındaki dalga paketi  $\psi(x, 0)$ ,

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) e^{ipx/\hbar} \quad (2.61)$$

integrali ile belirler. Bu integral aslında bir Fourier dönüşümü integralidir ve aşağıdaki yöntemle ters Fourier dönüşümü yapılırsa,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x, 0) e^{-ip'x/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) e^{i(p-p')x/\hbar} \quad (2.62)$$

ve  $\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p-p')x/\hbar} = 2\pi\hbar \delta(p-p')$  olduğundan faydalanılırsa eşitliğin sol tarafı  $\sqrt{2\pi\hbar} \phi(p')$  olur. Böylece,

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x, 0) e^{-ipx/\hbar} \quad (2.63)$$

sonucuna ulaşılır.

### 2.7.2 Momentum Uzayında Beklenen Değer

Daha önce dalga paketini yerelleştirmek için kullandığımız  $\phi(p)$  fonksiyonunun Fourier dönüşümü ile  $\psi(x, 0)$ 'dan aşağıdaki ifade ile elde edilebileceğini tartışmıştık.

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x, 0) e^{-ipx/\hbar} \quad (2.64)$$

$\phi(p)$ 'yi yerelleşmeyi sağlaması dışında bir başka şekilde anlamlandırabilir miyiz? Önceklikle, *Parseval teoremine* göre  $\psi(x)$  normalize ise  $\phi(p)$ 'de normalizedir. Aşağıdaki matematiksel işlem süreci her iki fonksiyondan birisi normalizeyse diğerinde normalize olacağını ispatlamaktadır.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p) \phi(p) &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p) e^{-ipx/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) \psi^*(x) = 1 \end{aligned} \quad (2.65)$$

Şimdi benzer şekilde, Fourier dönüşümlerinden faydalanarak,  $\langle \hat{p} \rangle$  beklenen değerini incelersek,

$$\begin{aligned} \langle \hat{p} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) e^{ipx/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) p \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) e^{ipx/\hbar} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p) p \phi(p) \end{aligned} \quad (2.66)$$

Denklem 2.65 ve 2.66'ya dayanarak  $\phi(p)$ 'yi dalga fonksiyonunun momentum uzayındaki temsili olarak veya kısaca momentum uzayındaki dalga fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Böylece  $|\phi(p)|^2$ 'yi de bir parçacığın p momentumuna sahip olma olasılık yoğunluğu olarak adlandırabiliriz. Konum uzayında konum operatörü basitçe  $\hat{x} \equiv x$  ve momentum operatörü  $\hat{p} \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$

ile tanımlanırken, momentum uzayında konum  $\hat{x} \equiv i\hbar \frac{\partial}{\partial p}$  ile momentum ise basitçe  $\hat{p} \equiv p$  ile tanımlanır. Böylece momentum uzayında konumun beklenen değeri,

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi^*(p) \left( i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \phi(p) \quad (2.67)$$

ifadesi ile hesaplanabilir.

## Kaynaklar

- [1] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016).
- [2] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003).
- [3] P. Grangier, G. Roger ve A. Aspect, “Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences”, *Europhysics Letters* **1**, 173–179 (1986).
- [4] J. S. Townsend, *Quantum Physics, A Fundamental Approach to Modern Physics* (University Science Books, Sausalito, CA, 2010).

If all this damned quantum jumps were really  
to stay, I should be sorry I ever got involved  
with quantum theory.  
—Erwin Schrödinger [1]

### 3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması, Özdeğerleri ve Özfonksiyonları

Bu bölümde bir parçacığın veya sistemin etkisinde olduğu potansiyelin  $V(x)$  zamandan bağımsız olması halinde, Schrödinger denkleminin sadece konum ve sadece zaman değişkenlerini içeren iki çiftlenmiş denklem seti halinde yazılabileceğini göreceğiz. Sadece konum değişkenine bağlı olarak yazılan yeni denklemi zamandan bağımsız Schrödinger denklemi olarak adlandırıyoruz. Devamında zamandan bağımsız denklem için özdeğer, özfonksiyon kavramlarını tartışacağız ve bazı potansiyeller için bu denklemin çözümlerini inceleyeceğiz.

#### 3.1 Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemini

Bir önceki bölümde elde ettiğimiz zamana bağlı Schrödinger denklemini *Hamilton* işlemcisini kullanarak,

$$\hat{H}\psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \quad (3.1)$$

şeklinde yazabileceğimizi ve dalga fonksiyonlarıyla açık halini de,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \quad (3.2)$$

şeklinde yazabileceğimizi görmüştük. Yukarıda tekrar yazdığımız zamana bağlı Schrödinger denklemi bir kısmi diferansiyel denklemdir. Kısmi diferansiyel denklemlerin birden çok bağımsız değişkenleri olur. Bu nedenle genellikle kısmi diferansiyel denklemleri çözmek kolay olmayabilir. Fakat bizim inceleyeceğimiz durumda  $V(x)$  potansiyeli zamandan bağımsız olduğundan denklemi sadece zamanı ve sadece konuma bağlı iki adi diferansiyel denkleme dönüştürebiliriz.

$$\psi(x, t) = T(t)u(x) \quad (3.3)$$

Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için  $\psi(x, t)$ 'nin yukarıdaki gibi iki fonksiyonun çarpımı şeklinde yazılabileceğini kabul edeceğiz. Dalga fonksiyonunun bu halin zamana bağlı Schrödinger denkleminde kullanırsak,

$$i\hbar u(x) \frac{dT(t)}{dt} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) \right\} T(t)$$

denklemine ulaşırız. Bu denklemin her iki tarafını  $T(t)u(x)$  ifadesine bölersek,

$$i\hbar \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{u(x)} \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) \right\} \quad (3.4)$$

her iki tarafı sadece bir bağımsız değişkene bağlı bir eşitlik elde ederiz. Eşitliğin sağlanabilmesi için her iki tarafında tek bir sabite eşit olması gerekir. Denklemin sol tarafındaki  $i\hbar \frac{1}{T(t)}$  ifadesi enerji boyutunda olduğundan eşitliği sağlayacak olan sabitte enerji boyutunda olmalıdır. Böyle bir sabit kapalı sistemlerde  $E$  sembolü ile gösterilen ve ilgili sistemin veya parçacığın hareket sabiti olan toplam enerji olabilir. Böylece ayrıştırılmış denklemin sol tarafı,

$$i\hbar \frac{dT(t)}{dt} = ET(t) \quad (3.5)$$

halini alır. Bu denklemin çözümü,

$$T(t) = T(0)e^{-iEt/\hbar} \quad (3.6)$$

olur, burada  $T(0)$  sistemin  $t = 0$  anındaki başlangıç durumunu temsil eder. Denk. 3.4'in sağ tarafı ise,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) = Eu(x) \quad (3.7)$$

halini alır ve *zamandan bağımsız Schrödinger denklemi* olarak adlandırılır. Zamana bağlı Schrödinger denklemi parçacığın zamanla davranışını betimlerken, yeni elde ettiğimiz zamandan bağımsız denklem ilgili parçacığın veya sistemin karakteristik özellikleri olan özdeğerlerini (eigenvalue) ve özfonksiyonlarını (eigenfunction) belirler.

Zamandan bağımsız  $V(x)$  potansiyel sayesinde ikiye ayırabildiğimiz zamana bağlı Schrödinger denkleminin çözümü, her iki denklemin çözümlerinin birleştirilmesiyle aşağıdaki gibi yazılabilir,

$$\psi(x, t) = u(x)e^{-iEt/\hbar}. \quad (3.8)$$

### 3.1.1 Özdeğer Denklemleri

Özdeğer denklemlerini daha iyi anlayabilmek için işlemci (operatör) kavramını anlamak gerekir. Basitçe bir operatör üzerine etki ettiği bir fonksiyonu bir başka fonksiyona dönüştürür veya bezer.

1.  $\hat{O}f(x) = f(x) + x^3$
2.  $\hat{O}f(x) = [f(x)]^4$
3.  $\hat{O}f(x) = f(5x^2 + 4)$
4.  $\hat{O}f(x) = [d^2 f(x)/dx^2]^2$
5.  $\hat{O}f(x) = df(x)/dx - 4f(x)$
6.  $\hat{O}f(x) = \lambda f(x)$

Yukarıda verilen örneklerin hepsinde  $f(x)$  gibi bir fonksiyon  $\hat{O}$  operatörleri tarafından belirlenen bir kural çerçevesinde eşitliğin sağındaki hallerini alırlar. Bizim çalışacağımız operatörler genellikle  $\hat{O}$  gibi genel bir operatör değil  $\hat{L}$  ile göstereceğimiz lineer operatörlerdir. Bu operatörlerin,  $c$  karmaşık bir sayı olmak üzere, aşağıdaki iki kurala uymaları beklenir.

$$\hat{L}[f_1(x) + f_2(x)] = \hat{L}f_1(x) + \hat{L}f_2(x) \quad (3.9)$$

$$\hat{L}cf(x) = c\hat{L}f(x) \quad (3.10)$$

Bu kurallara göre yukarıdaki örneklerden üçüncüsü, beşincisi ve altıncısı lineer operatörlerdir. Yukarıdaki örneklerden beşincinin,

$$\hat{L} \equiv \frac{d}{dx} - 4$$

bu kurallara uyan lineer  $\hat{L}$  bir işlemci olduğunu göstermek kolaydır:

$$\begin{aligned} \hat{L}(f(x) + g(x)) &= \left( \frac{d}{dx} - 4 \right) (f(x) + g(x)) \\ \hat{L}(f(x) + g(x)) &= \frac{df(x) + g(x)}{dx} - 4(f(x) + g(x)) \\ &= \frac{df(x)}{dx} - 4f(x) + \frac{dg(x)}{dx} - 4g(x) \\ &= \hat{L}(f(x)) + \hat{L}(g(x)) \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}
 \hat{L}(cf(x)) &= \left( \frac{d}{dx} - 4 \right) (cf(x)) \\
 \hat{L}(cf(x)) &= \frac{d(cf(x))}{dx} - 4(cf(x)) \\
 &= c \frac{df(x)}{dx} - 4cf(x) \\
 &= c \left( \frac{df(x)}{dx} - 4f(x) \right) \\
 &= c \hat{L}(f(x))
 \end{aligned}$$

ifadeleri ile gösterildiği üzere, her iki şartı da sağlamaktadır. Benzeri şekilde altıncı örneğinde lineer olduğu gösterilebilir. Bu örnekte verilen ifade aynı zamanda bir özdeğer denklemdir. Bu örneğe benzer şekilde Denk. 3.7’de

$$Hu_E(x) = Eu_E(x) \quad (3.11)$$

şeklinde bir özdeğer denklemi olarak yazılabilir. Burada  $H$  Hamiltonyen operatörü dalga fonksiyonlarına etki ettiğinde sabit bir sayı ve dalga fonksiyonunun kendisini tekrar üretirse; bu işlem sonucu üretilen bu tür sayılara *özdeğerler* ve dalga fonksiyonlarına da *özfonksiyonlar* denir. Denklemdaki dalga fonksiyonları özel olarak  $E$  özdeğerleriyle ilişkili özfonksiyonlar oldukları için  $E$  alt indisi ile etiketlenmişlerdir. Bir kuantum sisteminde özdeğerler kesikli veya sürekli olabilirler. Bizim ilgilendiğimiz zamandan bağımsız Schrödinger denkleminde  $H$  operatörü,

$$H \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \quad (3.12)$$

şeklinde olduğundan. Denklemin çözümü sonucu ortaya çıkan özdeğerler *enerji özdeğerleri* ve özfonksiyonlar da *enerji özfonksiyonları* olarak adlandırılırlar.

Denk. 3.2’deki zamana bağlı Schrödinger denkleminin çözümü  $u_E(x)e^{-iEt/\hbar}$  şeklindedir, fakat Schrödinger denklemi lineer bir denklem olduğu için bütün izinli  $E$  enerji özdeğerlerine ait çözümlerin toplamı da bu denklemin çözümüdür. Eğer  $E$  ve  $u_E$  bu sistemin sürekli çözümleriyse ve aynı sistemin kesikli çözümleri de mevcutsa ve bu çözümler  $E_n$  ve  $u_n$  ( $n=1,2,3, \dots$ ) ile temsil edilirse; bu sistemin en genel çözümü,

$$\psi(x, t) = \sum_n C_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} + \int dE C(E) u_E(x) e^{-iEt/\hbar} \quad (3.13)$$

olarak yazılabilir. Burada  $C_n$  ve  $C(E)$  karesi integrallenebilir ifadelerdir ve her bir özfonksiyonun toplam dalga fonksiyonuna katkı miktarını belirlemektedirler.


### 3.2 Sonsuz Kuyudaki Parçacık için Enerji Özdeğer Problemi

Sonsuz bir kuyu (Şekil 3.1) içinde hapsolmuş bir parçacığın davranışı Denk. 3.7’de verilen zamandan bağımsız Schrödinger denklemiyle tanımlanabilir. Tek boyutlu böyle bir kuyu Schrödinger denkleminde,

$$V(x) = \begin{cases} \infty & \Leftarrow x \leq 0, x \geq a \\ 0 & \Leftarrow 0 < x < a \end{cases} \quad (3.14)$$

potansiyelinin konmasıyla tanımlanabilir. Parçacık  $0 < x < a$  aralığında hapsoldüğünden parçacığın dalga fonksiyonu kuyu sınırlarında ve dışında sıfır olmalıdır,

$$\begin{aligned}
 u(x) &= 0 & x \leq 0 \\
 u(x) &= 0 & x \geq a.
 \end{aligned}$$



Şekil 3.1: Sonsuz kuyu

Problemın doğasından ortaya çıkan bu şartlar *sınır şartları* olarak adlandırılır. Kutu dışındaki her yerde dalga fonksiyonu sıfır olduğundan kutunun dışı için Schrödinger denklemini yazılamaz. Kutunun içindeyse  $V(x) = 0$  olduğundan, birazcık matematiksel düzenlemeyle, Schrödinger denklemini,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}u(x) = 0 \quad (3.15)$$

olarak yazılır. Eğer parçacığın enerjisi ( $E < 0$ ) negatif ise,  $\kappa^2 = 2m|E|/\hbar^2$  olmak üzere,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - \kappa^2u(x) = 0 \quad (3.16)$$

denkleminin ulaşılır. Bu denklemin en genel çözümü  $e^{-\kappa x}$  ve  $e^{\kappa x}$  ifadelerinin lineer bir kombinasyonu olur. Elde edilen çözüm  $x = 0$ 'da sınır şartlarını sağlasa da  $x = a$ 'da sınır şartlarını sağlamaz. Böylece  $E < 0$  seçeneği anlamsızlaşır.

Eğer parçacığın enerjisi ( $E > 0$ ) pozitif ise,

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (3.17)$$

olmak üzere,

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2u(x) = 0 \quad (3.18)$$

denklemini elde edilir. Bu denklemin en genel çözümlerinden birisi aşağıdaki gibidir.

$$u(x) = A \sin kx + B \cos kx \quad (3.19)$$

$u(0) = 0$  sınır şartı gereğince,

$$u(0) = A \cdot 0 + B = 0$$

olduğundan  $B = 0$  olur ve birinci sınır şartını sağlayan genel çözüm,

$$u(x) = A \sin kx \quad (3.20)$$

olarak bulunur. Diğer sınır şartına göre  $u(a) = 0$  olmalıdır, bu şartın sağlanması ancak,

$$ka = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.21)$$

olması ile mümkündür. Böylece,  $E = p^2/2m = (\hbar k)^2/2m$  olduğu da hatırlanırsa parçacığın sahip olabileceği izinli enerji değerlerinin veya yeni adıyla enerji özdeğerlerinin,

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.22)$$

olacağı açıktır. Özfonksiyonlar ise normalize edildiklerinde  $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$  olacağından,

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (3.23)$$

halinde elde edilirler. Çözümlerin ilginç bir sonucu vardır; farklı enerji özdeğerlerine ortaya çıkaran farklı özfonksiyonlar birbirlerine *diktir*. Ayrıca birbirine dik olan bu özfonksiyonlar normalize edilmişler ise *ortonormal* özfonksiyonlar olarak adlandırılırlar. Çalıştığımız problemdeki özfonksiyonlar ortonormaldir, aşağıdaki matematiksel işlem süreciyle bu gösterilmiştir.

$$\begin{aligned} \int_0^a dx u_n^*(x) u_m(x) &= \int_0^a dx \frac{2}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a dx \left\{ \cos \frac{(n-m)\pi x}{a} - \cos \frac{(n+m)\pi x}{a} \right\} \\ &= \begin{cases} \frac{\sin(n-m)\pi}{(n-m)\pi} - \frac{\sin(n+m)\pi}{(n+m)\pi} = 0 & \Leftarrow n \neq m \\ \frac{1}{a} \left[ x - \frac{a}{2n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi x}{a}\right) \right]_0^a = 1 & \Leftarrow n = m \end{cases} \end{aligned} \quad (3.24)$$

İntegrallerin herhangi bir  $n$  ve  $m$  için cevabı yukarıdaki gibidir,  $n$  ve  $m$  tam sayılar olduklarından integral sonucu aşağıdaki gibi özetlenebilir.

$$\int_0^a dx u_n^*(x) u_m(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow n \neq m \\ 1 & \Leftarrow n = m \end{cases} \quad (3.25)$$

En son olarak aşağıdaki gibi daha güzel bir şekilde Kronecker-Delta fonksiyonu kullanılarak yazılabilir.

$$\int_0^a dx u_n^*(x) u_m(x) = \delta_{mn} \quad (3.26)$$

Bu son eşitlik *ortonormalite şartı* olarak tanımlanır. Çalıştığımız problemlerde özfonksiyonlar reel olsa da başka problemler için böyle olmak zorunda değildir, bu nedenle yapılan tanımda özfonksiyonun eşleniği ve kendisi bulunmaktadır.

Enerji özdeğer ve özfonksiyon çözümlerinden bazı fiziksel yorumlar çıkarabiliriz.


1. En düşük enerji seviyesi durumu  $u_1(x)$  özfonksiyonu ile tanımlanır ve parçacığın sahip olduğu enerji *taban durum enerjisi* olarak adlandırılır,

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \quad (3.27)$$


Klasik durumda en düşük enerji seviyesi kinetik ve potansiyel enerjinin sıfır, yani toplam enerjinin sıfır olduğu durumdur. Kuantum fiziğinde ise minimumda olsa bir enerjinin varlığı söz konusudur.

2.  $\langle p \rangle$  beklenen değerini bu sistem için hesaplamak öncelikle özfonksiyonların reel olduğu hatırlanırsa  $u_n^* = u_n$  olur. Böylece,

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &= \int_0^a dx u_n(x) \left( -i\hbar \frac{du_n(x)}{dx} \right) = -i\hbar \int_0^a dx \frac{d}{dx} \frac{(u_n(x))^2}{2} \\ &= -\frac{i\hbar}{2} [u_n^2(a) - u_n^2(0)] = 0 \end{aligned} \quad (3.28)$$



Şekil 3.2: Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonları. Dikkat edilirse genlikler sabit ve artan  $n$  değerinden bağımsızdır.



Şekil 3.3: Sonsuz kuyudaki parçacığın özfonksiyonlarının türevlerinin kareleri. Dikkat edilirse artan  $n$  ile genlikler de büyümektedir.

sonucuna ulaşılır.  $\langle p \rangle = 0$  olması parçacığın  $-x$  ve  $+x$  yönlerinde eşit miktarda hareket etmiş olması olarak yorumlanabilir.

3. Diğer taraftan  $\langle p^2 \rangle$  sıfır olmaz ve herhangi bir  $u_n(x)$  özfonksiyonu için,

$$\langle p^2 \rangle = 2mE_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{a^2} \quad (3.29)$$

olarak bulunur.

4. Düğüm sayısı ( $N_D \equiv n - 1$ ) olarak tanımlanabilir, çünkü genellikle sınırlardaki sıfırlar sayılmaz. Bu tanıma göre  $n = 1$  için  $N_D = 0$  düğüm varken,  $n = 2$ 'de sadece  $N_D = 1$  düğüm vardır ve bu düğüm tam özfonksiyonun  $x = a/2$ 'de sıfır olduğu yerdir. Düğüm noktası sayısı ( $N_D$ ) arttıkça veya daha üst seviyelere ( $n$ ) çıkıldıkça kinetik enerji artmaktadır. Bunun sebebi aşağıda hesaplanan  $\langle K \rangle$  kinetik enerji beklenen değerinden açıkça görülmektedir. Çünkü  $\langle K \rangle = E_n$ 'dir. Ayrıca Şekil 3.3'ten görüleceği üzere integralin iç kısmının genliği  $n$  veya  $N_D$  arttıkça artmaktadır.

$$\begin{aligned} \langle K \rangle &= \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx u^*(x) \frac{d^2 u(x)}{dx^2} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left\{ \frac{d}{dx} \left( u^*(x) \frac{du(x)}{dx} \right) - \frac{du^*(x)}{dx} \frac{du(x)}{dx} \right\} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left| \frac{du(x)}{dx} \right|^2 \\ &= \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \end{aligned} \quad (3.30)$$

5. Şekil 3.2'deki özfonksiyonlar arasında ilginç bir davranış gözlenmektedir. Eğer tam orta noktaya ( $x = a/2$ ) bir ayna yerleştirdiğimizi düşünürsek; tek değerli  $n = 1, 3, 5 \dots$  özfonksiyonlar simetrikler, çift değerli  $n = 2, 4, 6 \dots$  olanlar ise anti-simetrikler (yani işaret değiştirmektedirler). Bu simetrinin bir benzerini,

$$x \rightarrow x - \frac{a}{2}$$

olacak şekilde kuyuyu kaydırarak ve sonra aynayı  $x = 0$ 'a taşıyarak da gözleyebiliriz. Böylece, ortaya çıkardığımız bu simetri kullanılarak, sınırları  $x = -a/2$  ve  $x = a/2$  olan sonsuz kuyu için de çözümler elde edilebilir. Yukarıda yaptığımız değişken dönüşümünü özfonksiyonda da işletirsek,

$$\sin \frac{n\pi x}{a} \rightarrow \sin \left( \frac{n\pi x}{a} - \frac{n\pi}{2} \right) = \sin \frac{n\pi x}{a} \cos \frac{n\pi}{2} - \cos \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (3.31)$$

sonucunu elde ederiz. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere  $x = \pm a/2$  sınırlarına sahip sonsuz kuyu için çift ve tek değerli durumların özfonksiyonları aşağıdaki gibi olacaktır;

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi x}{a} \quad \text{için } n = 1, 3, 5, \dots \quad (3.32)$$

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad \text{için } n = 2, 4, 6, \dots \quad (3.33)$$

Ayrıca,  $n = 1, 3, 5, \dots$  tek sayı şekliindenki kuantum sayılarına karşılık gelen özfonksiyonlar kosinüs fonksiyonları olduklarından  $x$ 'e göre *çift fonksiyon*durlar. Benzeri şekilde  $n = 2, 4, 6, \dots$  çift sayılarına karşılık gelen özfonksiyonlar ise sinüs fonksiyonları olduklarından  $x$ 'e göre *tek fonksiyon*durlar. Böylece, sonsuz kuyunun ortasında hayal edilen aynaya göre özfonksiyonların neden simetrik ve anti-simetrik davranışlar gösterdikleri daha iyi anlaşılabilir.

### 3.3 Açılım Varsayımı ve Fiziksel Yorumu

Fourier teoremine göre  $\psi(0) = 0$  ve  $\psi(a) = 0$  şartlarını sağlayan herhangi bir sürekli  $\psi(x)$  fonksiyonu,

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (3.34)$$

formunda yazılabilir. Sonsuz kuyu problemindeki  $u_n(x)$  özfonksiyonları sadece bir katsayı farkıyla  $\sin n\pi x/a$  ifadesi ile aynıdır. Böylece sonsuz kuyudaki parçacığın toplam dalga fonksiyonunu  $u_n(x)$ 'ler cinsinden,

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n u_n(x) \quad (3.35)$$

olarak elde edeceğimizi iddia edebiliriz.  $A_n$  katsayıları ortonormallik şartından aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$\begin{aligned} \int_0^a dx u_m^*(x) \psi(x) &= \int_0^a dx u_m^*(x) \sum_{n=1}^{\infty} A_n u_n(x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^a dx u_m^*(x) u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \delta_{mn} = A_m \end{aligned} \quad (3.36)$$

olduğundan,

$$A_m = \int_0^a dx u_m^*(x) \psi(x) \quad (3.37)$$

yazılabilir.

Daha önce serbest parçacığın dalga paketi için yaptığımız tartışmadaki gibi açılım yöntemiyle parçacığın dalga fonksiyonu  $\psi(x, t)$ 'nin zamana bağlı davranışını,

$$\psi(x, t) = \psi(x)T(t) = \sum A_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \quad (3.38)$$

olarak yazabiliriz. Hatırlanmalıdır ki, Schrödinger denkleminin kısmi değişkenlere ( $x$  ve  $t$ ) ayrıştırılmış halini eşitleyen sabit  $E_n$ 'dir, bu sayede yukarıdaki  $e^{-iE_n t/\hbar}$  ifadesinin varlığı anlaşılabilir. Bu kısım sadece zaman davranışını izah eden kısmın çözümüdür.

Burada gerçekleştirdiğimiz açılımın vektör analizinde de bir benzeri vardır.  $n$  boyutlu bir uzay düşünelim: bu uzayda  $\hat{i}_k$  dik birim vektörlerinin kümesi, özfonksiyonların tam kümesiyle benzer davranışı gösterir. Burada tamlık ile ifade edilmek istenen  $n$  boyutlu uzaydaki herhangi bir  $\vec{a}$  vektörü  $\hat{i}_k$  birim vektörlerine açılarak,

$$\vec{a} = \sum_{m=1}^n a_m \hat{i}_m \quad (3.39)$$

şeklinde yazılabilir. Bu birim vektörler dik bir baz oluşturduklarından herhangi iki birim vektör arasında,

$$\hat{i}_m \cdot \hat{i}_k = \delta_{mk} \quad (3.40)$$

bağıntısı vardır. Açılımdaki  $a_k$  katsayıları birim vektörler ve  $\vec{a}$  vektörünün iç çarpımı ile,

$$a_k = \hat{i}_k \cdot \vec{a} \quad (3.41)$$

bulunabilirler. Böylece anlıyoruz ki; vektörlerdeki iç çarpımın karşılığı özfonksiyonlar durumunda  $dx$  üzerinden bir integraldir, ayrıca  $\psi(x)$  ile  $\vec{a}$  ve  $u_n(x)$  ile  $\hat{i}_k$  benzer davranışları üstlenmişlerdir.

### 3.3.1 Açılım Katsayılarının Fiziksel Yorumu

$A_n$  katsayılarını yorumlayabilmek için enerjinin beklenen değerini keyfi bir  $\psi(x)$  durumunda hesaplayalım. Çalıştığımız örnekte, kuyu içinde  $H = p^2/2m$ , kuyu dışında  $\psi(x) = 0$  ve

$$Hu_n(x) = E_n u_n(x) \quad (3.42)$$

olduğuna göre,

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \int_0^a dx \psi^*(x) H \psi(x) = \int_0^a dx \psi^*(x) H \sum_n A_n u_n(x) \\ &= \sum_n A_n \int_0^a dx \psi^*(x) E_n u_n(x) \\ &= \sum_n E_n |A_n|^2 \end{aligned} \quad (3.43)$$

sonucuna ulaşırız. Ayrıca,

$$\int_0^a dx \psi^*(x) \psi(x) = 1 \quad (3.44)$$

olduğundan,

$$\int_0^a dx \psi^*(x) \sum_n A_n u_n(x) = \sum_n A_n A_n^* = \sum_n |A_n|^2 = 1 \quad (3.45)$$

olur.  $|A_n|^2$ 'yi anlamak için her bir enerji ölçümünün sadece bir enerji özdeğeri ortaya çıkaracağını kabul etmeliyiz. Bu önerme Bohr'un atom modelinde durağan durumlar için, üstü kapalı da

olsa, yapılmıştır. Önermeyi kuantum mekaniğine taşırsak; ölçülen bir enerji enerji operatörünün özdeğerlerinden birine karşılık gelir. Bu durumda ortalama enerji ölçümü,

$$E_{ort} = \langle \hat{H} \rangle = \sum_n E_n P_n \quad (3.46)$$

olur. Burada  $P_n$  elde edilen her bir ölçümde  $E_n$  enerji özdeğerini ölçme olasılığıdır. Olasılıkların toplamı,

$$\sum_n P_n = 1 \quad (3.47)$$

olacaktır. Bu sonuçlardan,

$$P_n = |A_n|^2 \quad (3.48)$$

olduğu ve “ $|A_n|^2$  yapılan bir enerji ölçümünde  $\psi(x)$  durumunun  $E_n$  enerji özdeğeri üretme olasılığıdır” yorumlarını yapabiliriz. Daha önce de gösterdiğimiz üzere  $A_n$  katsayıları,

$$A_n = \int_0^a dx u_n^*(x) \psi(x) \quad (3.49)$$

ile elde edilirler.

### 3.4 Serbest Parçacık ve Momentum Özfonksiyonu

Enerji operatörü  $\hat{H}$  dışında da özfonksiyon ve özdeğerleri olan operatörler vardır. Bunlardan birisi  $\hat{p}$  momentum operatörüdür: bu operatör dalga fonksiyonuna işletildiğinde,

$$\hat{p}u_p(x) = pu_p(x), \quad \hat{p} \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \quad (3.50)$$

özfonksiyon ve özdeğerleri ortaya çıkar. Operatörün açık hali yazılır ve dalga fonksiyonuna uygulanırsa,

$$\frac{du_p(x)}{dx} = \frac{ip}{\hbar} u_p(x) \quad (3.51)$$

birinci dereceden adi bir diferansiyel denklem ortaya çıkar. Bu denklemin genel çözümü,

$$u_p(x) = Ce^{ipx/\hbar} \quad (3.52)$$

şeklinde. Burada  $C$  belirsiz bir sabittir ve normalizasyon ile hesaplanabilir.  $p$  özdeğeri reel değerlidir böylece  $u_p(x)$  özfonksiyonu  $x \rightarrow \pm\infty$  durumunda patlamaz ve sonlu kalır. Serbest bir parçacık için  $\hat{p}$  operatörünün davranışını incelediğimizden,  $p$  özdeğeri kesikli değerler değil sürekli değerler alır. Diğer bir ifadeyle  $\hat{p}$ 'nin sürekli bir spektrumu vardır, denebilir. Enerji özfonksiyonları gibi momentum özfonksiyonları da,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_{p'}^*(x) u_p(x) = \delta(p - p') = \begin{cases} \infty & \Leftarrow p = p' \\ 0 & \Leftarrow p \neq p' \end{cases} \quad (3.53)$$

yukarıda verilen ortonormalite (dik ve birim olma) şartına uyuyorlarsa,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx u_{p'}^*(x) u_p(x) &= |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p-p')x/\hbar} \\ &= 2\pi |C|^2 \hbar \delta(p - p') \end{aligned} \quad (3.54)$$

olacaktır.  $C$ 'nin değeri Denklem 3.54'deki integralin sonucunun Denklem 3.53'teki normalizasyon integralinin sonucu ile aynı olmasını sağlayacak şekilde seçilir. Böylece momentum özfonksiyonu,

$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \quad (3.55)$$

olarak bulunur. Enerji özfonksiyonlarının tam bir setiyle seriye açtığımız  $\psi(x)$ 'i momentum özfonksiyonlarının tam bir setiyle de seriye açabiliriz. Tek fark enerji özdeğerleri kesikli iken, momentum özdeğerleri sürekli. Eğer momentum özdeğerleri kesikli olsaydı,  $\psi(x)$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_{p_n} u_{p_n}(x) \quad (3.56)$$

ifadesine benzer şekilde kesikli özfonksiyonların açılımı şeklinde yazılabilirdi. Fakat  $\hat{p}$  sürekli bir spektruma sahip olduğundan,

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) u_p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \quad (3.57)$$

$\psi(x)$   $u_p(x)$  özfonksiyonlarının tam bir setiyle yukarıdaki gibi yazılmalıdır. Burada,

$$\begin{aligned} \phi(p) &\leftrightarrow A_n \\ u_p(x) &\leftrightarrow u_n(x) \end{aligned}$$

benzerliklerinin varlığına dikkat edilmelidir.  $A_n$ 'lerin bulunmasına benzer şekilde  $\phi(p)$ 'lerde

$$\phi(p) = \int_{-\infty}^{\infty} dx u_p^*(x) \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left( \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \right)^* \psi(x) \quad (3.58)$$

integraliyle (iç çarpımıyla) hesaplanabilirler. Aslında Denk. 3.57 ve 3.58 karşılaştırmalı olarak incelenirse; Denk. 3.57'te  $\psi(x)$ 'in momentum özfonksiyonlarının ve  $\phi(p)$  katsayılarının bir açılımı olarak, Denk. 3.58'da ise  $\phi(p)$ 'nin momentum özfonksiyonlarının ve  $\psi(x)$  katsayılarının bir açılımı olarak yazıldığı düşünülebilir. Böylece daha önce de bahsettiğimiz gibi  $\psi(x)$  konum uzayındaki dalga fonksiyonu iken,  $\phi(p)$  momentum uzayındaki dalga fonksiyonudur önermesi daha kuvvetli bir dayanak kazanmış olur.

### 3.4.1 Serbest Parçacık Dalga Fonksiyonunun Normalizasyonu

Serbest parçacık durumunu incelemeye devam edelim. Serbest parçacık için potansiyel  $V(x)$  her yerde sıfır olacaktır, bu nedenle Hamiltonyen işlemcisi sadece kinetik enerji kısmını içerecek şekilde,

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} u(x) = \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + k^2 u(x) = 0 \quad (3.59)$$

olarak yazılır. Bu diferansiyel denklemin çözümleri  $e^{ikx}$ ,  $e^{-ikx}$  veya  $\sin kx$ ,  $\cos kx$  fonksiyonlarının lineer kombinasyonları olacaktır. Örneğin,  $+x$  yönünde ilerleyen bir parçacık için

$$\psi(x, t) = u(x)T(t) = Ae^{(ikx - \omega t)} \quad (3.60)$$

şeklinde bir serbest dalga fonksiyonu önerilebilir. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin çözümü ise,

$$u(x) = Ae^{ikx} \quad (3.61)$$

olacaktır. Fakat bu çözümün problemi karesi integrallenebilir olmamasıdır.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx |u(x)|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx |Ae^{ikx}|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx A^2 |e^{ikx}|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx A^2 \\ &= A^2 x \Big|_{-\infty}^{\infty} \end{aligned} \quad (3.62)$$

Çünkü yukarıdaki işlemlerin sonucundan anlaşılacağı üzere integral ıraksar (patlar).

Bu sonuç, bir örnekle şöyle yorumlanabilir: Bir elektron tabancasından çıkan elektron demetinin momentumu çok iyi bilindiğinden ( $\Delta p \rightarrow 0$ ), Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre, konumu hakkındaki bilgi tamamen kaybolmuştur ( $\Delta x \rightarrow \infty$ ). Diğer bir ifadeyle  $|u(x)|^2 dx = A^2 dx$  parçacığın  $dx$  ve  $x+dx$  aralığında bulunma olasılığı bütün uzayda aynı değere sahiptir. Böyle bir durumu fiziksel olarak kabul etmek pek mümkün değildir. Çünkü elektron tabancasından çıkan elektron demetinin (veya bir başka parçacık hızlandırıcıdan çıkan parçacık demetinin) boyu bilinmektedir. Hızlandırılan parçacık ilk defa tabancadan çıktığında bu demet içinde bir yerde olmalıdır. Bu nedenle parçacığın serbest olma özelliğini kaybetmeden parçacığın konumunu yerelleştirebilecek normalizasyon yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla bu tür sistemlerin dalga fonksiyonlarını normalize etmenin farklı yolları önerilmiştir.

1. İlk yöntem sonsuz kuyu sınırları  $x = \pm a/2$ 'yi çok genişletmek ve çok daha geniş bir kuyu elde etmek. Fakat ne kadar genişletilse de  $e^{\pm i k x}$  şeklindeki dalga fonksiyonları sınırlarda yok (sıfır) olmayacaktır. Bu nedenle  $\psi(x = \pm a/2) = 0$  sınır şartı değiştirilerek,

$$\psi(x - a/2) = \psi(x + a/2) \quad (3.63)$$

şeklinde yeniden tanımlanır. Yeni tanımlanan bu şart parçacık serbest olduğu ve her yerde aynı olasılıkla bulunabileceği için,  $x = -a/2$  ve  $x = +a/2$ 'de dalga fonksiyonunun sürekli olmasının gerekliliğinden ortaya çıkar. Böylece,

$$\begin{aligned} e^{ik(x-a/2)} &= e^{ik(x+a/2)} \\ e^{ikx} e^{-ika/2} &= e^{ikx} e^{ika/2} \\ e^{ika} &= 1 \end{aligned}$$

sonucu ortaya çıkar. Genişletilmiş kuyudaki bu yeni sınır şartına uyan dalga için  $k = 2n\pi/a$  veya  $p = 2\hbar n\pi/a$  olur. Burada  $a$  kuyu genişliği ve  $n = 1, 2, 3, \dots$  bir tam sayıdır. Serbest parçacık için momentum herhangi bir değerde olabilir. Bu nedenle  $a$  ne kadar genişletilirse parçacığın momentumunu verecek olan  $n$  değeri de buna göre büyütülmelidir. Genişletilmiş bu kuyuda artık,

$$A^2 \int_{-a/2}^{a/2} dx |e^{ikx}|^2 = A^2 a = 1 \quad (3.64)$$

normalizasyonu yapılabilir. Böylece serbest parçacığı temsil eden düzlem dalgalar,

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} e^{\pm i k x} \quad (3.65)$$

şeklinde normalize edilmiş olarak yazılabilirler.

2. Elektron tabancasından çıkan elektron örneğiyle devam edersek, momentumu çok iyi bilindiğinden momentum uzayında,

$$\phi(p) = \sqrt{2\pi\hbar} \delta(p - p') \quad (3.66)$$

şeklinde bir dalga paketi fonksiyonu önerebiliriz. Bu dalga fonksiyonu sadece  $p = p'$  iken sıfırdan farklı diğer durumlarda sıfırdır, böylece momentumun değeri kesin olarak bilinmiş olmaktadır. Önerdiğimiz bu dalga paketi ile,


$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \quad (3.67)$$

olarak tanımlı serbest parçacık momentum özfonksiyonunu beraber kullanarak, serbest parçacığın  $\psi(x)$  dalga fonksiyonunu aşağıdaki gibi dalga paketi olarak yazabiliriz,


$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) u_p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \{ \sqrt{2\pi\hbar} \delta(p - p') \} \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \quad (3.68)$$

$$= e^{ipx/\hbar} = e^{ikx}. \quad (3.69)$$

Fakat, momentum çok iyi bilindiğinden ortaya bir dalga paketi değil düzlem dalga çıkmıştır. Bu normalizasyon yöntemi *Dirac normalizasyonu* olarak adlandırılır. Bir önceki normalizasyondaki gibi bir sonuç elde etmek için Dirac delta gibi çok keskin bir dalga paketi yerine yine keskin ama her noktada tanımlı bir dalga paketi tercih edilebilir. Böylece gerçek fiziksel demet daha iyi temsil edilmiş olur. Buradaki momentum dalga paketi fonksiyonu çok keskin olduğundan  $\Delta p = 0$ 'dir, fakat Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gereği,  $\Delta x \rightarrow \infty$  olur.  $\psi(x)$ 'i daha gerçekçi ve normalize edilebilir hale getirmek için dirac delta



Şekil 3.4: Dirac dağılımı.



Şekil 3.5:  $\alpha \rightarrow 0$  için Dirac dağılımına yaklaşan bir gaussian fonksiyon.

fonskiyonu yerine Şekil 3.5'teki gibi bir gaussian fonksiyon seçilebilir. Böylece  $q = p - p'$  olmak üzere  $\psi(x)$  için,

$$\psi(x) = e^{ip'x/\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dq \delta(q) e^{iqx/\hbar} \quad (3.70)$$

dalga paketi yazılabilir. Bu dalga paketi çok yavaş değişen ve ilgilenilen bölgede (örneğin demet uzunluğu) neredeyse sabit olan bir dağılım olacaktır. Böylece ıraksamayan, normalize edilebilen daha gerçekçi bir serbest dalga yazılmış olur.

3. Serbest parçacık dalga fonksiyonunun normalizasyonun ıraksamasına sebep olan parçacığın, sonsuz kuyuda olduğu gibi, uzayda herhangi bir yere hapsedilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer parçacığın sınırlı bir bölgede nerede olduğu sorusunun cevabını aramayı bırakırsak böyle bir sorun da ortaya çıkmamış olur. Bunun yerine olasılık akımı veya akısı ile ilgilenirsek,

$$j(x) = \frac{\hbar}{2im} \left[ \psi^*(x) \frac{d\psi(x)}{dx} - \frac{d\psi^*(x)}{dx} \psi(x) \right] \quad (3.71)$$

normalizasyon problemini daha rahat aşabiliriz. Yukarıdaki tanımına göre  $Ce^{\pm ipx/\hbar}$  gibi bir serbest dalga fonksiyonu için akı  $\pm |C|^2 p/m$  olur. Olasılık yoğunluğu ve dalga fonksiyonu arasındaki bağıntı hatırlanırsa,


$$P(x)dx = |\psi(x)|^2 dx = |C|^2 dx \quad \Rightarrow \quad [|C|^2] \equiv 1/m \quad (3.72)$$

serbest parçacığın düzlem dalgası için  $|C|^2$ 'nin bir boyutta  $1$  parçacık/m kadarlık bir parçacık olasılık yoğunluğunu tanımladığı ortaya çıkar. Böylece  $[\pm|C|^2 p/m] \equiv 1/s$  olacağı açıktır. Sonuçta bir boyutlu olasılık akısı ile birim uzunluktan ve birim zamanda geçebilecek parçacık olasılığı hesaplanmış olur. Bu sonuca göre, normalize etmeye çalıştığımız serbest parçacık dalga fonksiyonu (Denk. 3.67)  $|C|^2 = 1/2\pi\hbar$  (1/metre) yoğunluklu bir parçacık demetini temsil etmektedir.

Üç boyutlu durumdaysa serbest parçacık dalga fonksiyonu,

$$u_p(\vec{r}) = C e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} \quad (3.73)$$

halini alır ve akı yine  $|C|^2 p/m$  olur. Fakat birimi  $\frac{1/s}{m^2}$  olur, çünkü  $\vec{p}$  momentum vektörüne dik bir birim alandan geçen ve birim hacim başına  $|C|^2$  kadar yoğunluğa sahip parçacık demetini temsil eder.



Şekil 3.6: Parçacıkların akısı ve hızları arasındaki bağıntının temsili resmi. **Akı:** birim zamanda ilgili parçacıkların hızına dik olan birim alandan geçen parçacık sayısıdır.

### 3.4.2 Yozlaşmış (Dejenere) Durumlar

Enerji özdeğeri denkleminin (Denk. 3.59),  $u_1(x) = e^{ikx}$  ve  $u_2(x) = e^{-ikx}$  olmak üzere birbirinden bağımsız iki çözümü vardır. Benzer şekilde bu denklemin reel çözümleri  $u_1(x) = \cos(kx)$  ve  $u_2(x) = \sin(kx)$ 'te bağımsız çözümlerdir. Bu çözümlerden hangi  $u_1(x)$ ,  $u_2(x)$  ikilisi seçilirse seçilsin, sonsuz kuyudaki parçacık probleminden farklı olarak, her ikisinde aynı enerji özdeğerine sahip olacaktır. Serbest parçacık için Hamiltonyen işlemcisi her iki çözüme uygulandığında aşağıdaki sonuca ulaşılacağı rahatça gösterilebilir.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u_1(x)}{dx^2} = E u_1(x), \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u_2(x)}{dx^2} = E u_2(x) \quad (3.74)$$

Birden çok bağımsız özfonksiyonun bir hermityen işlemcinin aynı özdeğerine karşılık geldikleri durumlarla karşılaşılabilir, bu tür durumlara yozlaşmış (dejenere) durumlar denir.

Her iki dejenere özfonksiyon ikilisi de birbirlerine diktir (ortogonaldır). Aşağıdaki integ-raller  $k \neq 0$  ve  $a \rightarrow \infty$  (serbest parçacık olması için  $a$  sonsuza gitmelidir) olmak üzere dejenere özfonksiyonların birbirlerine dik olduklarının kanıtlarıdır.

$$\int_{-a}^a dx \left( \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-ikx} \right)^* \left( \frac{1}{\sqrt{a}} e^{ikx} \right) = 0 \quad \text{ve} \quad \int_{-a}^a dx \sin kx \cos kx = 0 \quad (3.75)$$

Aynı enerjiye  $E = \hbar^2 k^2 / 2m$  karşılık gelen kaç tane dejenere durum (özfonsiyon) olursa olsun, bu özfonsiyonlar *farklı enerjilere* ait özfonsiyonlara daima diktirler.

Enerji özdeğerine göre dejenere olan özfonsiyonlar başka bir operatörün de özfonsiyonları olabilirler ve bu diğer operatöre göre dejenere olmayabilirler. Örneğin momentum işlemcisi ( $\hat{p}$ ) için  $e^{\pm ikx}$  özfonsiyonları dejenere değildirler.

$$\begin{aligned}\hat{p}e^{ikx} &= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} e^{ikx} = \hbar k e^{ikx} \\ \hat{p}e^{-ikx} &= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} e^{-ikx} = -\hbar k e^{-ikx}\end{aligned}\quad (3.76)$$

$p = \hbar k$  olmak üzere  $\pm p$  her iki özfonsiyon için iki farklı özdeğer mevcuttur.

Eğer  $\cos(kx)$  ve  $\sin(kx)$  çiftini inceleyecek olsaydık, bu iki özfonsiyonu birbirinden ayırt edecek olan momentum işlemcisi olmazdı. Çünkü bu özfonsiyonlar momentum işlemcisinin özfonsiyonları değildirler. Bu özfonsiyonları ayırt etmemizi sağlayacak başka bir kavram vardır:  $x$ 'e göre  $\cos(kx)$  çift ve  $\sin(kx)$  tek fonksiyondur. *Çift* veya *tek* olma özdeğerleri olarak adlandırabileceğimiz bu durumları  $\hat{P}$  parite işlemcisi olarak adlandıracağımız işlemci vermektedir.

$$\begin{aligned}\hat{P} \cos(kx) &= \cos(-kx) = +1 \cos(kx) \\ \hat{P} \sin(kx) &= \sin(-kx) = -1 \sin(kx)\end{aligned}\quad (3.77)$$

Yukarıdaki işlemlerin sonucuna göre her iki özfonsiyon için  $\hat{P}$ 'nin  $\pm 1$  şeklinde farklı iki özdeğeri mevcuttur. Buna göre  $\cos(kx)$  *çift parite* ve  $\sin(kx)$  *tek parite* özdeğerlidir.

### 3.4.3 Parite

Bir serbest parçacığın veya ( $-a/2$  ve  $+a/2$  sınırlı ve  $x = 0$  etrafında simetrik olan) bir sonsuz kuyu içindeki parçacığın  $\sin(kx)$  ve  $\cos(kx)$  özfonsiyonlarıyla tanımlanabildiğini gördük. Bu özfonsiyonlar  $x \rightarrow -x$  dönüşümü altında *tek* veya *çift* fonksiyonlardır. Sonsuz kuyu içerisindeki örneği düşünecek olursak; bu sistemin (taban seviyesindeki) ilk durumu  $\psi(x)$   $x$ 'e göre çifttir. Bunun anlamı  $n = 1, 3, 5, \dots$  olmak üzere  $\psi(x)$ ,

$$\psi(x) = \sum_n A_n \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi x}{a} \quad (3.78)$$

şeklinde olmalıdır. Zamana göre değişimi ise,

$$\psi(x, t) = \sum_n A_n \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi x}{a} e^{-iE_n t/\hbar} \quad (3.79)$$

olacaktır. Zamana bağlı dalga fonksiyonunun da  $x$ 'e göre hala *çift* kalacağı açıktır. Aynı durum başlangıçta *tek* fonksiyon olan dalga fonksiyonları için de geçerlidir. Böylece  $x = 0$  civarında simetrik olan bu sistem için *çiftlik* veya *teklik* zamandan bağımsız bir özelliktir. Bu durumda *çift* ve *tek* olma durumlarına bu *hareketin sabitleridir*, denebilir.

Fizikte herhangi bir harekete ait sabitler daima önemlidir, çünkü sabitin temsil ettiği ilgili niceliğin zamanla (veya ilgili olduğu boyutla; zaman, konum, momentum vb.) korunduğunu gösterir. Bu tür sabitleri formüleştirmek faydalıdır; *çift* veya *tek* olma durumunu parite işlemcisi  $\hat{P}$  ile formüleştirebiliriz. İşlemcinin görevi basitçe  $x \rightarrow -x$  yansımasını gerçekleştirmektir. Parite işlemcisi herhangi bir dalga fonksiyonuna uygulandığında,

$$\hat{P}\psi(x) = \psi(-x) \quad (3.80)$$

işlemini gerçekleştirir. Çift ve tek fonksiyonlar için bu işlemin sonucu,

$$\hat{P}\psi^{(+)}(x) = \psi^{(+)}(x) \quad \text{ve} \quad \hat{P}\psi^{(-)}(x) = -\psi^{(-)}(x) \quad (3.81)$$

olarak bulunur. Bu iki denklem özdeğer denklemleridir;  $\hat{P}$ 'nin  $+1$  özdeğeri veren durumu için özfonksiyonlar çift fonksiyonlardır ve  $-1$  özdeğeri için ise tek fonksiyonlardır. Sonsuz kuyu durumundaki özfonksiyonlar sadece  $\hat{H}$ 'nin özfonksiyonu değildir, aynı zamanda  $\hat{P}$ 'nin de özfonksiyonlarıdır. Parite işlemcisinin sadece  $\pm 1$  özdeğerlerini alması mümkündür. Farz edelim ki;

$$\hat{P}u(x) = \lambda u(x) \quad (3.82)$$

olsun.  $\hat{P}$ 'yi bir kere daha uygularsak,

$$\hat{P}^2 u(x) = \hat{P}\lambda u(x) = \lambda^2 u(x) \quad \text{ve böylece} \quad \hat{P}^2 u(x) = u(x) \quad (3.83)$$

olur. Çünkü iki defa yansıma altında  $u(x)$  aynı kalır. Böylece  $\lambda^2 = 1$  olacağından  $\lambda = \pm 1$  olacağı açıktır. Herhangi bir  $\psi(x)$  fonksiyonu aşağıdaki gibi tek ve çift fonksiyonların toplamı olarak yazılabilir,

$$\psi(x) = \frac{\psi(x) + \psi(-x)}{2} + \frac{\psi(x) - \psi(-x)}{2}. \quad (3.84)$$

**İspat:**  $\psi(x)$  çift  $g$  ve tek  $h$  fonksiyonlarının toplamı olsun. Böylece  $\psi(x) = g(x) + h(x)$  yazılabilir. Bu durumda  $\psi(-x) = g(x) - h(x)$  olur. Sonrasında ise  $g(x) = \frac{\psi(x) + \psi(-x)}{2}$  ve  $h(x) = \frac{\psi(x) - \psi(-x)}{2}$  olarak bulunur.  $h(x)$  ve  $g(x)$  yerlerine konursa Denk. 3.84'e ulaşılır.

Böylece  $\hat{H}$  işlemcisinin buraya kadar bahsedilen özfonksiyonları için olduğu gibi herhangi bir dalga fonksiyonu da bu yeni işlemcinin özfonksiyonlarının açılımı olarak yazılabilir.

Çift ve tek olma durumlarının çok açık bir şekilde görünür olmasının nedeni sonsuz kuyunun merkezini  $x = 0$ 'da seçmiş olmamızdır. Eğer  $0$  ve  $a$  sınırlarına sahip sonsuz kuyu durumunu çalışsaydık bile, pek değişen bir şey olmazdı. İlkine göre bu durumda simetrisinin gözlenmesi daha açık olmasa da simetri ekseninin  $x = a/2$ 'de olacağı kestirilebilirdi. Buradan çıkarılabilecek önemli bir ders: kuantum mekaniği problemlerinde Hamiltonyen işlemcisinin mümkün olan simetrilerinin ortaya çıkarılmasının önemli olduğudur. Simetrileri daha açık hale getirecek koordinatların seçiminin de ayrıca önemli olduğu ortadadır.

Eğer Şekil 3.7'deki gibi bir potansiyel içeren bir kuantum sistemi çalışılıyor olsaydı, koordinat sistemi tercihiyle simetrik bir durum yaratmak mümkün olmazdı. Anlaşıyor ki; *simetri Hamiltonyenin* içinde olmalıdır. Bu durum hangi şartlar altında çift (veya tek) özfonksiyonlar zamanla değişmeden kalır sorusunun cevaplanmasıyla ortaya çıkarılabilir.

Şekil 3.7'deki gibi bir sistemin bir çift özfonksiyonu başlangıçta ( $t = 0$ 'da),

$$\psi(x, 0) = \psi(-x, 0) \equiv \psi^{(+)}(x) \quad (3.85)$$

olarak tanımlanabilir. Bu sistemin zamanla gelişimi,

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H}\psi(x, t) \quad (3.86)$$

ile tanımlanır. Bu denkleme  $\hat{P}$  işlemcisi uygulanırsa,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{P}\psi(x, t) = \hat{P}\hat{H}\psi(x, t) \quad (3.87)$$



## Kaynaklar


- [1] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016).

If all this damned quantum jumps were really  
to stay, I should be sorry I ever got involved  
with quantum theory.  
—Erwin Schrödinger [1]

## 4 Bir Boyutlu Potansiyeller

Üç boyutlu bir evrende yaşıyor olmamıza rağmen, bir çok fiziksel olayı (hareketi) bir boyutlu olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle bu bölümde klasik fiziğin sınırları dışına çıkan ve kuantum fiziğiyle çalışabildiğimiz bazı bir boyutlu sistemleri inceleyeceğiz.

### 4.1 Basamak Potansiyeli



Şekil 4.1: Basamak potansiyeli.

Bir boyutlu basamak potansiyelinin bir örneği yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere basamak potansiyeli; birbirinden farklı sabit potansiyellere sahip iki bölgeden oluşur. Bir boyutlu bu potansiyelin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow x < 0 \\ V_0 & \Leftarrow x \geq 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

Bu potansiyeli zamandan bağımsız Schrödinger denklemi ile çalışabiliriz. Öncelikle Schrödinger denklemini,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) = Eu(x) \quad (4.2)$$

aşağıdaki gibi,

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)]u(x) = 0 \quad (4.3)$$

yeniden yazabiliriz. Basamak potansiyelinin değerinin sıfır olduğu ve sıfırdan farklı olduğu bölgeler için, sırasıyla,

$$\frac{2m}{\hbar^2} E \equiv k^2 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) \equiv q^2 \quad (4.4)$$

tanımlarını yapabiliriz.  $x < 0$  ve  $V(x) = 0$  bölgesi için çözüm

$$u_1(x) \equiv u(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (4.5)$$

olarak yazılabilir. Burada  $Ae^{ikx}$ ,  $x = -\infty$ 'deki bir kaynaktan gelen serbest düzlem dalga olarak düşünülebilir,  $Be^{-ikx}$  ise  $x = 0$  noktasında ortam değişikliğinden dolayı yansıyan dalga olarak düşünülebilir. Bu bölgedeki toplam olasılık akısı,

$$\begin{aligned} j_1 &\equiv j = \frac{\hbar}{2im} \left( u^* \frac{du}{dx} - \frac{du^*}{dx} u \right) \\ &= \frac{\hbar}{2im} \left[ (A^* e^{-ikx} + B^* e^{ikx}) (ikAe^{ikx} - ikBe^{-ikx}) - (-ikA^* e^{-ikx} + ikB^* e^{ikx}) (Ae^{ikx} + Be^{-ikx}) \right] \\ &= \frac{\hbar k}{m} (|A|^2 - |B|^2) \end{aligned} \quad (4.6)$$

olur.  $x > 0$  ve  $V(x) = V_0$  için ise,

$$u_2(x) \equiv u(x) = Ce^{iqx} \quad (4.7)$$

çözümü elde edilir. Sadece  $Ce^{iqx}$  kısmı vardır, çünkü bu bölge  $x = +\infty$ 'a kadar uzanmaktadır ve potansiyel sabittir bu yüzden, yansıyan dalga söz konusu değildir. Sadece  $+x$  yönünde ilerleyen olasılık dalgası vardır. Bu olasılık dalgası için olasılık akısı,

$$j_2 \equiv j = \frac{\hbar q}{m} |C|^2 \quad (4.8)$$

bulunur. Her iki bölgedeki olasılık akıları ( $j_1 = j_2$ ) birbirine eşit olmalıdır. Eğer,

$$\frac{\partial}{\partial t} P(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = 0 \quad (4.9)$$

olduğu hatırlanırsa ve kısmi değişkenlere ayrılabilir dalga fonksiyonu ile çalıştığımızdan  $P(x, t) = \psi(x, t)\psi^*(x, t) = u(x)u^*(x)$  olacağına göre,

$$\frac{\partial}{\partial t} P(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} |u(x)|^2 = 0 \quad (4.10)$$

elde edilir. Buradan,

$$\frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = 0 \quad (4.11)$$

sonucuna ulaşırız.  $x = 0$  civarında  $x = \pm\epsilon \rightarrow 0$  aralığında yukarıdaki ifadenin integrali,

$$\int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx \frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = j(\epsilon, t) - j(-\epsilon, t) = 0 \quad (4.12)$$

sonucunu verir. Böylece  $j_1 = j_2$  olması gerektiği ortaya çıkar. Her iki bölgedeki olasılık akıları da  $x$ 'ten bağımsız olduklarından sınırdaki eşitlerse bütün tanımlı uzay boyunca birbirlerine eşit olmalıdırlar,

$$\frac{\hbar k}{m} (|A|^2 - |B|^2) = \frac{\hbar q}{m} |C|^2 \quad (4.13)$$

yukarıdaki eşitlikle bu sonuç ifade edilmiş olur. Dalga fonksiyonlarının  $x = 0$ 'daki sürekliliğinden ise,

$$u_1(0) = u_2(0) \quad (4.14)$$

$$A + B = C \quad (4.15)$$

elde edilir. Basamak potansiyeli  $x = 0$ 'da süreksiz olmasına rağmen, sistemin dalga fonksiyonu  $u(x)$  süreklidir, dalga fonksiyonun türevinin de  $x = 0$ 'da sürekli olacağı aşağıda verilen matematik süreçle gösterilmiş olur.

$$\begin{aligned} \left( \frac{du}{dx} \right)_{+\epsilon} - \left( \frac{du}{dx} \right)_{-\epsilon} &= \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx \frac{d}{dx} \frac{du}{dx} \\ &= \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} dx \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E] u(x) = 0 \end{aligned} \quad (4.16)$$

Burada  $\varepsilon$  sonsuz küçük bir pozitif reel sayıdır.  $x = 0$ 'ın  $-\varepsilon$  ve  $+\varepsilon$  civarında dalga fonksiyonlarının türevlerinin farkı yukarıdaki eşitliğin sol tarafındaki gibidir ve bu farkın integral formuda eşitliğin sağ tarafındaki gibidir. Eşitliğin sol tarafı Schrödinger denkleminde faydalanılarak  $V(X)$ ,  $E$  ve  $u(x)$ 'i içerecek şekilde yeniden yazılabilir. Bu problemde  $V(x)$  ve  $E$  birer sabit sayı olduklarından,  $\pm\varepsilon \rightarrow 0$  olduğundan ve böylece  $u(x)$ 'in sürekliliği gerçekleştiğinden bu integralin cevabı sıfır olacaktır. Böylece bu tür problemler için dalga fonksiyonlarının türevlerinin de sürekli oldukları kabul edilebilir.

Yeri geldiğinden ve daha sonra kullanılacağı için şimdiden belirtmek gerekir ki, bu süreklilik  $\lambda\delta(x - a)$  benzeri Dirac-delta fonksiyonu içeren potansiyeller için geçerli değildir. Böyle potansiyeller için süreklilik aşağıdaki gibi bir süreksizlik halini alır.

$$\begin{aligned} \left(\frac{du}{dx}\right)_{a+\varepsilon} - \left(\frac{du}{dx}\right)_{a-\varepsilon} &= \frac{2m}{\hbar^2} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx \lambda \delta(x - a) u(x) \\ &= \frac{2m}{\hbar^2} \lambda u(a) \end{aligned} \quad (4.17)$$

Bu problemde türevlerinin sürekliliği sağlandığına göre; türevlerinin sürekliliğinden,

$$\frac{d}{dx} u_1(x) \Big|_{x=0-} = \frac{d}{dx} u_2(x) \Big|_{x=0+} \quad (4.18)$$

$$ik(A - B) = iqC \quad (4.19)$$

elde edilir.

Bu tür problemleri çalışılırken, klasik bir dalga sisteminin davranışına benzer olarak yansıma ve geçme olasılıklarından bahsetmek mümkündür. Bu olasılıklarla ilişkili olarak, genellikle yansıma ve geçme katsayıları, sırasıyla,

$$R \equiv \frac{|j_{\text{yansıyan}}|}{|j_{\text{gelen}}|} \quad \text{ve} \quad T \equiv \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} \quad (4.20)$$

şeklinde tanımlanırlar.  $R$  ve  $T$ 'yi hesaplamadan önce olasılık akısı üzerinde biraz daha bilgilerimizi genişletmeliyiz: olasılık akısını üç boyutlu durum için yazacak olursak,

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} \left[ \Psi^*(\vec{r}, t) \vec{\nabla} \Psi(\vec{r}, t) - \Psi(\vec{r}, t) \vec{\nabla} \Psi^*(\vec{r}, t) \right] \quad (4.21)$$

bir vektör davranışına sahip olduğu açıkça görülür. Basamak potansiyeli probleminde,  $j_1$  (1. bölgedeki olasılık akısı) altında,

$$\vec{j}_1 = \vec{j}_{\text{gelen}} + \vec{j}_{\text{yansıyan}} \quad (4.22)$$

olarak yazılabilir.  $j_2$  (2. bölgedeki olasılık akısı) ise,

$$\vec{j}_2 = \vec{j}_{\text{geçen}} \quad (4.23)$$

olarak yazılabilir. Akının korunumu,  $\frac{\partial}{\partial x} j(x, t) = 0$ , ise

$$\vec{j}_1 = \vec{j}_2 \quad \text{veya} \quad \vec{j}_{\text{gelen}} + \vec{j}_{\text{yansıyan}} = \vec{j}_{\text{geçen}} \quad (4.24)$$

olmasını gerektirir. Tekrar basamak potansiyeli çalıştığımız bir boyutlu duruma döner ve vektör notasyonunu bırakırsak ve yönleri sadece “+” ve “-” işaretleriyle temsil edersek,

$$j_{\text{gelen}} = \frac{\hbar}{2mi} \left[ u_g^* \frac{d}{dx} u_g - u_g \left( \frac{d}{dx} u_g \right)^* \right] \quad (4.25)$$

olur. Burada  $u_g = Ae^{ikx}$  ile verilir ve  $x = -\infty$ 'den gelen dalga fonksiyonunu temsil eder. Böylece gelen akı,

$$j_{\text{gelen}} = \frac{\hbar k}{m} |A|^2 \quad (4.26)$$

olur. Benzer şekilde, yansıyan dalga  $u_y = Be^{-ikx}$  ve geçen dalga  $u_t = Ce^{iqx}$  ifadeleri ile tanımlanırlar. Böylece yansıyan ve geçen olasılık akıları,

$$j_{\text{yansıyan}} = -\frac{\hbar k}{m} |B|^2 \quad \text{ve} \quad j_{\text{geçen}} = \frac{\hbar q}{m} |C|^2 \quad (4.27)$$

olarak bulunurlar. Yansıma ve geçme katsayıları ise,

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \quad \text{ve} \quad T = \frac{q}{k} \frac{|C|^2}{|A|^2} \quad (4.28)$$

olarak bulunurlar.  $R$  ve  $T$ 'yi bilinmeyen  $A$ ,  $B$  ve  $C$  kat sayılarından kurtarabiliriz. Bunun için akının korunumundan ve dalga fonksiyonlarının ve türevlerinin sürekliliğinden,

$$\frac{\hbar k}{m} (|A|^2 - |B|^2) = \frac{\hbar q}{m} |C|^2 \quad (4.29)$$

$$A + B = C \quad (4.30)$$

$$ik(A - B) = iqC \quad (4.31)$$

elde ettiğimiz yukarıdaki eşitlikleri kullanabiliriz. Olasılık akısının korunumundan elde ettiğimiz denklemin yardımıyla, kolayca,

$$T + R = \frac{q}{k} \frac{|C|^2}{|A|^2} + \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1 \quad (4.32)$$

olacağı gösterilebilir. Sürekliliklerden elde edilen denklemlerden de,

$$B = \frac{k - q}{k + q} A \quad \text{ve} \quad C = \frac{2k}{k + q} A \quad (4.33)$$

olacağı gösterilebilir. Böylece  $R$  ve  $T$ ,

$$R = \left( \frac{k - q}{k + q} \right)^2 \quad \text{ve} \quad T = \frac{4kq}{(k + q)^2} \quad (4.34)$$

olarak bulunurlar.

$E < V_0$  durumu için dalga fonksiyonu,

$$u(x) = Te^{-\eta x} \quad (4.35)$$

halini alır. Burada  $\eta$  ( $V_0 > E$  olduğundan),

$$\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) \equiv \eta^2 \quad (4.36)$$

olarak tanımlanır. Benzer bir matematiksel süreçten geçilerek hesaplar yapıldığında dalga fonksiyonu genlikleri arasına,

$$B = \frac{k - i\eta}{k + i\eta} A \quad \text{ve} \quad C = \frac{2k}{k + i\eta} A \quad (4.37)$$



ilişkileri bulunur. Olasılık akıları hesaplandığında, gelen ve yansıyan akıların aynı kaldığı, fakat geçen akının sıfır olduğu görülecektir. Bu nedenle her ne kadar basamağın içine giren dalga fonksiyonunun genliği  $C$  sıfır olmasa da  $j_{\text{geçen}} = 0$  olduğundan, geçme olasılığı katsayısı,

$$T = \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = 0 \quad (4.38)$$

olur. Yansıma olasılığı katsayısı ise,

$$R = \frac{BB^*}{AA^*} = \left( \frac{k - i\eta}{k + i\eta} \right) \left( \frac{k + i\eta}{k - i\eta} \right) = 1 \quad (4.39)$$

olur. Aşağıdaki şekillerde  $R$ ,  $T$  ve dalga fonksiyonlarının genliklerinin  $E/V_0$  oranına göre davranışları gösterilmiştir.




Şekil 4.2: Yansıma ve geçiş katsayılarının  $E/V_0$ 'a göre davranışları. Şekil 4.3: Dalga fonksiyonu genliklerinin  $E/V_0$ 'a göre davranışları.

Elde edilen sonuçlar hakkında bazı fiziksel yorumlar yapılabilir:

- Klasik mekanik açısından bakıldığında buradaki yansıma olayı ilginçtir. Çünkü, bir potansiyelden geçen bir parçacığın kinetik enerjisini kaybedip, potansiyel enerjiye dönüştürerek, yavaşlaması beklenir. Burada gözlediğimiz yansıma davranışı ilgilendiğimiz sistemdeki parçacıkların dalga davranışı gösterdiklerini ve dalga mekaniği davranışına uygun davrandıklarını göstermektedir.
- $T + R = 1$  olması olasılık akısının korunumunun geçerliliğini onaylamaktadır. Eğer bütün parçacıkların, bütün uzay içerisinde var olma olasılığı 1 ise yansıma ve geçme olasılıklarının toplamının 1 olması, korunumun sağlandığını göstermektedir.
- $E \gg V_0$  için  $R \rightarrow 0$  ve  $q \rightarrow k$ , bunun nedeni kolayca anlaşılabilir. Parçacığın veya sistemin enerjisi arttıkça basamak potansiyelinin etkisi neredeyse yok gibidir.
- $E < V_0$  durumu için dalga fonksiyonun  $x$ 'in üstel azalan reel bir fonksiyonu olduğuna dikkat ediniz. Böylece  $x \rightarrow +\infty$  durumunda dalga fonksiyonu ıraksamamış (patlamamış) olur. Klasik mekanikle uyumlu şekilde  $R = 1$  ve  $T = 0$  (veya  $(j_{\text{geçen}} = 0)$ ) olduğuna da dikkat ediniz. Fakat geçen dalganın genliği ( $C \neq 0$ ) sıfır olmamıştır (bkz. Şekil 4.3) ve bu bir dalganın gösterebileceği davranıştır. Bu davranış kuantum fiziğinde "tünelleme" olarak adlandırılır. Sonsuza uzanan basamak potansiyeli yerine sonlu kalan bir bariyer potansiyeli çalışıldığında klasik olarak yasaklı olan bölgeden bir parçacığın geçebileceği (tünelleme yapabileceği) görülecektir.

## 4.2 Sonlu Potansiyel Kuyusu



Şekil 4.4: Sonlu kuyu potansiyeli,  $E > 0$  durumu.

Şekil 4.4'te gösterilen sonlu kuyu potansiyelinin matematik gösterimi,

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow -a > x \\ -V_0 & \Leftarrow -a \leq x \leq a \\ 0 & \Leftarrow a > x \end{cases} \quad (\text{kuyunun içi}) \quad (4.40)$$

olarak yazılabilir. Şekil incelendiğinde 1. ve 3. bölgelerde sabit ve sıfır değerli potansiyellerin, 2. bölgede ise sabit  $-V_0$  değerli bir potansiyelin olduğu görülebilir.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + V(x)u(x) = Eu(x) \quad (4.41)$$

Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi bu sistem için yukarıdaki gibi olacaktır. Birinci ve üçüncü bölge için denklem,

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} Eu(x) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2} E \equiv k^2 \quad (4.42)$$

ikinci bölge için ise,

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0) u(x) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0) \equiv q^2 \quad (4.43)$$

halini alır. Böylece bu sistemin en genel çözümü,

$$u(x) = \begin{cases} u_1(x) = A_I e^{ikx} + A_R e^{-ikx} & \Leftarrow -a > x \\ u_2(x) = A e^{iqx} + B e^{-iqx} & \Leftarrow -a \leq x \leq a \\ u_3(x) = A_T e^{ikx} & \Leftarrow a < x \end{cases} \quad (\text{kuyunun içi}) \quad (4.44)$$

olur. Eğer çözümleri basitleştirmek için  $A_I = 1$  tercih edilirse, üç bölgenin olasılık akıları,

$$j(x) = \begin{cases} j_1 = \frac{\hbar k}{m} (1 - |A_R|^2) & \Leftarrow -a > x \\ j_2 = \frac{\hbar q}{m} (|A|^2 - |B|^2) & \Leftarrow -a \leq x \leq a \\ j_3 = \frac{\hbar k}{m} |A_T|^2 & \Leftarrow a > x \end{cases} \quad (\text{kuyunun içi}) \quad (4.45)$$

halini alırlar. Zamandan bağımsız bir davranış incelediğimizden önceki çalıştığımız sonsuz kuyu sistemine benzer şekilde olasılık akısı korunmalıdır. Böylece üç bölgenin akıları arasında,

$$j_1 = j_2 = j_3 \implies \frac{\hbar k}{m} (1 - |A_R|^2) = \frac{\hbar q}{m} (|A|^2 - |B|^2) = \frac{\hbar k}{m} |A_T|^2 \quad (4.46)$$

eşitliği ortaya çıkar. Üç bölgenin dalga fonksiyonlarının ve türevlerinin  $x = \pm$ 'deki değerleri, süreklilik gereğince, birbirlerine eşit olmalıdır. Buna göre türevlerden ve dalga fonksiyonlarından elde edilen denklemlerin birbirlerine oranları da, aşağıda gösterildiği gibi, birbirlerine eşit olmalıdır.

$$\begin{aligned} \frac{1}{u_1(x)} \frac{d}{dx} u_1(x) \Big|_{x=-a} &= \frac{1}{u_2(x)} \frac{d}{dx} u_2(x) \Big|_{x=-a} \implies \frac{iqAe^{-iqa} - iqBe^{iqa}}{Ae^{-iqa} + Be^{iqa}} = \frac{ike^{-ika} - ikA_Re^{ika}}{e^{-ika} + A_Re^{ika}} \\ \frac{1}{u_2(x)} \frac{d}{dx} u_2(x) \Big|_{x=+a} &= \frac{1}{u_3(x)} \frac{d}{dx} u_3(x) \Big|_{x=+a} \implies \frac{iqAe^{iqa} - iqBe^{-iqa}}{Ae^{iqa} + Be^{-iqa}} = \frac{ikA_Te^{ika}}{A_Te^{ika}} = ik \end{aligned} \quad (4.47)$$

Denk. 4.47'de verilen eşitlikler ve bu eşitliklerin pay ve paydalarının ayrı ayrı eşitlikleri de kullanılarak,

$$A_R = e^{-i2ka} \frac{(k^2 - q^2) \sin 2qa}{(k^2 + q^2) \sin 2qa + i2kq \cos 2qa} \quad (4.48)$$

$$A_T = ie^{-i2ka} \frac{2kq}{(k^2 + q^2) \sin 2qa + i2kq \cos 2qa} \quad (4.49)$$

yansıyan ( $A_R$ ) ve geçen ( $A_T$ ) dalgaların genlikleri bulunmuş olur. İncelediğimiz bu sistemi sanki  $x = -\infty$ 'daki bir kuantum parçacığı kaynağından gelen parçacıkların sonlu kuyudan saçılması olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla çözüm olarak önerdiğimiz dalga fonksiyonları  $u_1 = u_{gelen} + u_{yansıyan}$  ve  $u_3 = u_{geçen}$  olarak da düşünülebilir. Bu durumda,

$$u_{gelen} = A_I e^{ikx}, \quad j_{gelen} = \frac{\hbar k}{m}, \quad (A_I = 1) \quad (4.50)$$

$$u_{yansıyan} = A_R e^{-ikx}, \quad j_{yansıyan} = \frac{\hbar k}{m} |A_R|^2 \quad (4.51)$$

$$u_{geçen} = A_T e^{ikx}, \quad j_{geçen} = \frac{\hbar k}{m} |A_T|^2 \quad (4.52)$$

ifadeleri ortaya çıkar. Geçiş  $T$  ve yansıma  $R$  katsayılarının tanımları hatırlanırsa sonlu kuyu için,

$$R = \frac{|j_{yansıyan}|}{|j_{gelen}|} = |A_R|^2 \quad (2. \text{ bölge sınırından } 1. \text{ bölgeye}) \quad (4.53)$$


$$T = \frac{|j_{geçen}|}{|j_{gelen}|} = |A_T|^2 \quad (1. \text{ bölgeden } 3. \text{ bölgeye}) \quad (4.54)$$

olarak bulunurlar. Elde edilen  $R$  ve  $T$  katsayılarının davranışları Şekil 4.5 ve Şekil 4.6'da verilmiştir. Şekil 4.5'te  $0 < E \ll V_0$  durumunda, beklendiği üzere, geçişin ( $T \rightarrow 0$ ) gittikçe azaldığı görülmektedir. Bunun aksine, Şekil 4.6'da  $E \gg V_0 > 0$  durumunda, beklendiği üzere, yansımanın ( $R \rightarrow 0$ ) gittikçe azaldığı görülmektedir. Fakat her iki durumda da bazı özel enerjilerde geçişin en büyük değere ( $T = 1$ ) ve yansımanın da en düşük değere ( $R = 0$ ) ulaştığı görülmektedir. Bu özel enerjiler "*geçiş rezonansları*" olarak adlandırılan rezonans durumlarının enerjileridir.


Bu tür saçılmalar düşük enerjili (0.1 eV) elektronların soygaz atomlardan (neon, argon v.b.) saçılması durumlarında gözlenmiştir. Bu etkiyi ilk farkedendenler Ramsauer ve Townsend olmuştur [2] ve bu duruma "*geçiş rezonansları*" adını vermişlerdir. Bu rezonansları veren enerjiler  $\sin(2qa) = 0$  şartını sağlayan enerjilerdir. Böylece  $A_R = 0$  ve dolayısıyla  $R = 0$  olacaktır. Bu şartı sağlayan enerjilerin,

$$E_n = -V_0 + \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.55)$$


olacağı rahatça gösterilebilir. Şekil 4.7 bu tür bir rezonans enerjisinde sonlu kuyudaki dalgaların sanal kısımlarının davranışları görülmektedir. Dikkatlice bakılırsa gelen dalganın genliğinin ve fazının hiç değişmeden geçtiği kolayca görülebilir. Dolayısıyla hiç yansımanın gerçekleşmediği ve tam bir geçişin gerçekleştiği söylenebilir. Şekil 4.8'da ise rezonansın gerçekleştiği enerjide dalgaların karelerinin (olasılık yoğunluklarının) davranışları verilmiştir. Bu şekilden gelen dalganın tamamen geçtiği daha açıkça anlaşılabılır. Eğer birinci bölgede yansıma sıfırdan farklı olsaydı, olasılık yoğunluğu düz bir çizgi yerine sinüsel olması (gelen ve yansıyan dalgaların tamamen yapıcı veya yıkıcı olmayan faz dışı girişimlerinden dolayı) gerekirdi.




Şekil 4.5:  $E/V_0 \leq 1$  durumunda  $E \rightarrow 0$  oldukça  $T \rightarrow 0$  ve  $R \rightarrow 1$  davranışları göstermelerine karşın, bazı özel enerji değerlerinde ( $T = 1$ ,  $R = 0$  olan yerlerde) "geçiş rezonansları" vardır.



Şekil 4.6:  $E/V_0 \geq 1$  durumunda  $T \rightarrow 1$  ve  $R \rightarrow 0$  davranışlarını göstermektedir. Çünkü enerji arttıkça beklendiği gibi kuyunun yansıma etkisi zayıflamaktadır.



Şekil 4.7: Şekil 4.5'teki  $E/V_0 = 0.885$  değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların sanal kısımlarının davranışları görülmektedir.




Şekil 4.8: Şekil 4.5'teki  $E/V_0 = 0.885$  değerinde rezonansın varlığı görülebilir. Bu değer için sonlu kuyuda gelen, geçen ve kuyu içindeki dalgaların karelerinin (olasılık yoğunluklarının) davranışları görülmektedir.

Yansıma olmamasının nedeni kuyunun içindeki dalganın birden çok yansıma yapması ve bu yansımaların tekrar birinci bölgeye geçerek birinci bölgedeki yansıyan dalgayla yıkıcı girişim yapması olarak izah edilebilir. Rezonsın gerçekleşme şartının aşağıdaki şekilde yeniden yazılmış hali optikte Fabry-Perot interferometresinin davranışını izah etmektedir [2].

$$\lambda = \frac{2\pi}{q} = \frac{4a}{n} \quad (4.56)$$

### 4.3 Bariyer Potansiyeli



Şekil 4.9: Bariyer potansiyeli,  $E < V_0$  durumu.

Şekil 4.9'daki bariyer potansiyeline  $x = -\infty$ 'dan  $0 < E < V_0$  aralığında bir enerjiyle gelen bir kuantum nesnenin durumunu inceleyelim. Bu problemin ilginçliği: klasik olarak yasaklı olan 2. bölgeden kuantum nesnenin geçme olasılığının bulunmasıdır. Bariyer potansiyeli aşağıdaki gibi formüleleştirilebilir.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \Leftarrow -a > x \\ V_0 & \Leftarrow -a \leq x \leq a \\ 0 & \Leftarrow a > x \end{cases} \quad (\text{bariyerin içi}) \quad (4.57)$$

Birinci ve üçüncü bölgelerde Schrödinger denklemi ve çözümleri bir önceki incelediğimiz sonlu kuyu potansiyelindekilerle aynıdır. Bariyerin içinde (2. bölgede ise) Schrödinger denklemi,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(x)}{dx^2} + V_0 u(x) = E u(x) \quad (4.58)$$

şekline sahip olur. Denklem yeniden düzenlenirse,

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) u(x) = 0 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) = q_b^2 \quad (4.59)$$

olmak üzere,

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} - q_b^2 u(x) = 0 \quad (4.60)$$

halini alır. Böylece her üç bölge için dalga fonksiyonları,

$$u(x) = \begin{cases} u_1(x) = A_I e^{ikx} + A_R e^{-ikx} & \Leftarrow -a > x \\ u_2(x) = A e^{-q_b x} + B e^{q_b x} & \Leftarrow -a \leq x \leq a \\ u_3(x) = A_T e^{ikx} & \Leftarrow a > x \end{cases} \quad (\text{bariyerin içi}) \quad (4.61)$$

olarak bulunur. Dikkat edilirse sonlu kuyu çözümleri ile bariyer çözümleri arasındaki tek fark 2. bölgede ortaya çıkmaktadır. Bu sayede sonlu kuyu için geçtiğimiz aşamalardan geçmeden,

$$q \rightarrow iq_b = i\sqrt{(2m/\hbar^2)(V_0 - E)} \quad (4.62)$$

olacağı da göz önünde tutulursa,  $A_R$  ve  $A_T$  genlikleri,

$$A_R = e^{-i2ka} \frac{(k^2 + q_b^2) \sinh 2q_b a}{(k^2 - q_b^2) \sinh 2q_b a - 2kq_b \cosh 2q_b a} \quad (4.63)$$

$$A_T = -e^{-i2ka} \frac{2kq_b}{(k^2 - q_b^2) \sinh 2q_b a - 2kq_b \cosh 2q_b a} \quad (4.64)$$

olarak bulunurlar. Böylece, daha önce olduğu gibi yansıma ( $R$ ) ve geçiş ( $T$ ) katsayıları (olasılıkları),


$$R = \frac{|j_{\text{yansıyan}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = |A_R|^2 \quad (2. \text{ bölge sınırından } 1. \text{ bölgeye}) \quad (4.65)$$

$$T = \frac{|j_{\text{geçen}}|}{|j_{\text{gelen}}|} = |A_T|^2 \quad (1. \text{ bölgeden } 3. \text{ bölgeye}) \quad (4.66)$$


eşitlikleriyle hesaplanabilirler. Geçiş  $T$  katsayısının açık hali,

$$T = \frac{(2kq_b)^2}{(k^2 + q_b^2)^2 \sinh^2 2q_b a + (2kq_b)^2} \quad (4.67)$$

olarak bulunur. Yansıma katsayısı ise  $R$  ise  $T + R = 1$  eşitliğinden hesaplanabilir.  $T + R = 1$  olduğu birinci ve üçüncü bölgelerin akılarının eşitliklerinden rahatça ortaya konabilir.  $T$  ve  $R$ 'nin davranışları Şekil 4.10'daki sistem için Şekil 4.11'de çizilmiştir. Şekil 4.10'da görüleceği üzere klasik olarak yasaklı olan ikinci bölgeden (bariyerin içinden) olasılık dalgaları geçebilmektedir. Bu nedenle  $0 < E < V_0$  (veya  $0 < E/V_0 < 1$ ) enerjili bu olasılık dalgalarının geçiş katsayıları Şekil 4.11'den görüldüğü üzere sıfır olmamıştır.



Şekil 4.10: Bir kuantum dalganın sanal kısmının bir bariyer potansiyelinden tünellemesi. Bu örnek için keyfi birimlerde:  $a = 0.045$ ,  $E = 14$ ,  $V_0 = 20$  ve  $\hbar = m = 1$  alınmıştır.  $E/V_0 = 14/20 = 0.7$  için  $T > 0.8$  olduğu Şekil 4.11'den görülebilir.




Şekil 4.11: Bu şekilde, Şekil 4.10'daki örnek için,  $0 < E/V_0 < 1$  aralığında  $R$  yansıma ve  $T$  geçiş katsayılarının davranışları gösterilmektedir. Klasik fizik açısından yasaklı olan ikinci bölge için geçiş katsayısının sıfır olmadığı açıkça görülmektedir.

Olasılık dalgalarının (dalga fonksiyonlarının) geçişi bariyerin genişliğine çok hassastır. *Kalın* bir bariyer  $q_b a \gg 1$  ile ifade edilebilir. Bu durumda geçiş katsayısı,

$$T \cong \left( \frac{4kq_b}{k^2 + q_b^2} \right)^2 e^{-2q_b a} \quad (4.68)$$

halini alır. Aslında  $q_b a \propto (V_0 - E)a$  olduğunu biliyoruz. Böylece geçiş katsayısının hem bariyerin kalınlığı  $a$ 'ya hem de bariyer potansiyelinin yüksekliği ve olasılık dalgasının enerjisi arasındaki farka hassas olduğu ortaya çıkmış oluyor. Örneğin, iki iletken tel  $a = 1$  nm kalınlığında bir oksit tabaka ile ayrılmışsa ve varsayalım ki,  $e^{-2\kappa a} = 10^{-10}$  olarak bulunduyorsa, (iletim elektronlarının yoğunluğu  $10^{22} \text{ cm}^{-3}$  olduğundan) bir çok elektron bu oksit tabakadan geçebilir. Fakat, oksit tabakanın kalınlığı 5 kat daha fazla olsaydı ( $a = 1$  nm),  $e^{-2\kappa a} = 10^{-50}$  olurdu. Bu durumda efektif olarak elektronların geçişi yasaklanmış olur. Tünelleme olasılığının bu aşırı hassasiyeti taramalı tünelleme mikroskoplarının geliştirilmesini sağlamıştır [3].



Şekil 4.12: Yavaş değişen bir bariyer potansiyelinin kalın dikdörtgen bariyerler olarak yaklaşık halinin temsili.

Çoğunlukla gerçek fiziksel sistemler keskin bir dikdörtgen bariyer şeklinde olmayabilirler. Örneğin Şekil 4.12'deki gibi yavaş değişen bir potansiyel şeklinde olabilirler. Yavaş değişen bir potansiyel için Şekil 4.12'te gösterildiği gibi *kalın* bariyerlerden oluşan *dilim*lerin toplamı gibi bir yaklaşıklık yapılabilir. Bu durumda farklı iki  $k$  ve  $q_b$  değilse yavaş değişen bir  $q_b$  varmış gibi düşünülebilir. Böylece  $q_b a \gg 1$  için ortaya çıkan Denk. 4.68'teki yaklaşıklık her bir dilim için,

$$\ln T_{\text{dilim}} \cong \ln \left( \frac{4q_b k}{k^2 + q_b^2} \right)^2 - 2q_b a \approx \text{sabit} - 2q_b a \quad (4.69)$$

şeklinde yaklaşık olarak yeniden yazılabilir. Bu ifade bütün bariyer için aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir.

$$\begin{aligned} \ln T &= \sum_{\text{dilim}} \ln T_{\text{dilim}} = -2 \sum_n \Delta x_n \langle q_b \rangle_n \\ &= -2 \int_{\text{bariyer}} dx \sqrt{2m(V(x) - E)/\hbar^2} \end{aligned} \quad (4.70)$$

Burada  $\Delta x_n$  her bir dilimin genişliği ve  $\langle q_b \rangle_n$  ise dilimler için ortalama  $q_b$  değeridir. Böylece yavaş değişen böyle bir potansiyel için geçiş katsayısı,

$$T = C e^{-2 \int dx \sqrt{2m(V(x) - E)/\hbar^2}} \quad (4.71)$$

ile hesaplanabilir. Bu yaklaşıklık *dönüm noktalarında* (enerji ve bariyer potansiyel yüksekliğinin eşit olduğu değerlerde) iyi çalışmaz. Çünkü, bu durumda,  $q_b a \gg 1$  şartı altında Denk. 4.67 için Denk. 4.68 iyi bir yaklaşık olamaz. Bu yaklaşıqlığın iyi çalışabilmesi için  $V(x)$ 'in  $x$ 'in yavaş değişen bir fonksiyonu olması gerektiği de unutulmamalıdır. Aksi takdirde dilimlerden oluşan yaklaşıklık ancak *dar* bir bariyer potansiyeli için daha uygundur. Her ne kadar bu yaklaşıklık tünelleme olayının fiziğinin anlaşılmasına yardımcı olsa da Denk. 4.68 çok iyi bir yaklaşıklık değildir. Daha iyi bir yaklaşıklık dönüm noktalarını da dikkate alan *WKB* (*Wentzel-Kramers-Brillouin*) yaklaşıqlığıdır.

#### 4.4 Kuantum Tünellemenin Uygulamaları

Termonükleer reaksiyonlar, metaller ve yarı-iletkenlerde iletkenlik gibi fiziksel olguların anlaşılmasında kuantum tünelleme önemli bir yere sahiptir. Gamov, Condon ve Gurney kararsız ağır çekirdeklerin bünyelerinden alfa (helyum atomunun çekirdeği) parçacıkları atarak kararklı duruma geçişlerini izah edebilmişlerdir. Kurdukları modele göre alfa parçacıkları ağır çekirdeklerin içinde (proton ve nötronlara benzer şekilde) ağır çekirdeğin Coulomb potansiyel

alanı tarafından oluşturulan bariyerden daha düşük enerjide bulunmaktadırlar. Klasik olarak bu bariyeri aşmaları mümkün değildir. Fakat deneylerde parçacıkların ağır çekirdeklerden yayınlandığı kuantum tünelleme modeline uygun olarak gözlenmiştir.

Ayrıca, tünelleme olgusu tünel diyodu olarak adlandırılan elektronik devre elemanının da geliştirilmesini sağlamıştır. Bu diyot akım elektronlarının enerjisinin ayarlanmasıyla bariyerin özelliklerinin değiştirilerek tünelleyen elektronların sayısının kontrol edilmesi ilkesine dayanır.

Tünellemenin en önemli uygulaması taramalı tünelleme mikroskopudur. Çok ince uçlu bir iletken yine incelenecek bir iletken yüzeye  $\sim 1$  nm'den daha yakın tutularak yüzeyin taranması ilkesine dayanır. İncelenecek malzemenin kendisi pozitif potansiyelde tutulursa iletken uçtaki elektronlar malzemeye geçmek isteyecektir. Fakat fotoelektrik etkiden biliyoruz ki; metallerden elektron koparabilmek için aşılması gereken bir iş fonksiyonu (potansiyeli) vardır. Dolayısıyla bu potansiyel çalıştığımız örnekte olduğu gibi tünellemesi gereken bir bariyerdir. Bu bariyerden tünelleyen elektronlar iletken uçtaki akımdaki değişimler olarak okunurlar ve böylece iletken ucun yüzeye ne kadar yakın veya uzak olduğu ölçülmüş olur. Bu sürecin terisi de mümkündür; incelenen malzeme yerine iletken uç pozitif potansiyelde tutulabilir. Sonuçta yine akımdaki değişiklikler iletken ucun malzemeye yakınlığı veya uzaklığı hakkında bilgi verecektir. Böylece malzemenin yüzeyinin haritası çıkarılmış olur [1].

## 4.5 Sonlu Potansiyel Kuyusunda Bağlı Durumlar

Şekil 4.4'te gösterilen ve Denk. 4.57 ile tanımlanan sonlu potansiyel kuyusunu  $E > 0$  (veya saçılma) durumları için çalıştık. Bu potansiyel çekici özellikte bir kuyu şeklinde olduğundan  $E < 0$  durumu için ise bağlı durum çözümleri ortaya çıkacaktır. Klasik fizikte de bağlı durum potansiyelleri mevcuttur. Örneğin, güneşimiz etrafındaki gezegenler evrensel kütle çekimi ilkesince güneşin çekim potansiyeli ( $-GmM/r$ ) altında bağlı durumda bulunurlar. Böylece kararlı Kepler yörüngelerinde güneş etrafındaki döngülerine devam ederler. Kuantum ve Klasik bağlı durumlar arasındaki en temel fark birincisinin kesikli ikincisinin sürekli enerji seviyelerine sahip olmasıdır.

Zamandan bağımsız bir boyutlu Schrödinger denklemi için bağlı durum çözümleri olarak aşağıdaki dalga fonksiyonları önerilebilir.

$$u(x) = \begin{cases} u_1(x) = C_1 e^{kx} & \Leftarrow -a > x \\ u_2(x) = A \cos qx + B \sin qx & \Leftarrow -a \leq x \leq a \quad (\text{kuyunun içi}) \\ u_3(x) = C_3 e^{-kx} & \Leftarrow a > x \end{cases} \quad (4.72)$$

Bağlı durumlarda  $E < 0$  durumunu çalıştığımız için enerjiyi  $E = -|E|$  şeklinde göstermek daha uygun olacaktır. Böylece dalga fonksiyonlarındaki  $k$  ve  $q$  dalga sayıları,

$$\frac{2m}{\hbar^2} |E| \equiv k^2 \quad \text{ve} \quad \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - |E|) \equiv q^2 \quad (4.73)$$

olarak tanımlanabilirler. Böylece  $k^2$  ve  $q^2$  reel ve sıfırdan büyük değerlere sahip olurlar. Schrödinger denklemi  $k^2$  ve  $q^2$  ifadeleri ile yeniden yazılırsa, Denk. 4.72'deki çözümler elde edilir.

Dikkat edilirse 1. ve 3. bölge çözümleri üstel davranışlı reel dalga fonksiyonlarıdır. Bunun nedeni  $E < 0$  durumunda, tünelleme olayında olduğu gibi, bağlı durum dalgasının uç (kuyruk) kısımlarının duvarlardan içeri sızmasıdır. Birinci bölge için  $u_1(x) = C_1 e^{kx}$  seçilmiştir, çünkü  $-x$  yönünde azalan bir fonksiyondur. Böylece fiziksel olmayan ve ıraksayan bir çözümden kaçınılmış olur. Benzer şekilde üçüncü bölge için ise  $u_3(x) = C_3 e^{-kx}$  seçilmiştir, çünkü  $+x$  yönünde azalan bir fonksiyondur. İkinci bölgede ise  $-V_0 < E < 0$  olduğundan kuantum nesnesi kuyunun içindedir, fakat kuyunun içinde kalmak şartıyla serbest dalga davranışına sahip olacaktır. Bu nedenle ikinci bölge için sinüs davranışına sahip çözümler önerilmiştir.

Bağlı durum enerji özdeğerlerini elde etmek için gerekli sınır şartlarını uygulamak isteyebiliriz. Fakat daha önce çalıştığımız sonsuz kuyu örneğinde olduğu gibi bu kuyu içinde  $x \rightarrow -x$  parite dönüşümü altında  $u_2(x)$ 'in kosinüslü kısmı *çift* sinüslü kısmı ise *tek* pariteye sahip olacaktır. Bu nedenle kuyunun içindeki çözümleri çift ve tek çözümler olarak ayrı ayrı çalışmak gerekir. Çift çözümler için birinci ve üçüncü bölgenin ( $k^2$ ) kuantum özellikleri aynı olduğundan,  $C_1 = C_3$  alınabilir. Tek çözümler için ise yine her iki bölgenin kuantum özellikleri aynı fakat kuyu içindeki dalga fonksiyonu anti simetrik davranışta olduğundan,  $C_1 = -C_3$  olmalıdır.  $C_1$  ve  $C_3$  arasındaki ilişki Şekil 4.13'ten çok daha iyi anlaşılabilir.




Figure 4-6 Solutions for a discrete spectrum in an attractive potential well.

Şekil 4.13: Tek ve çift çözümler.

Önceki çalıştığımız potansiyellere benzer şekilde bu potansiyelin çözümleri olan dalga fonksiyonları ve türevleri de yine  $x = \pm a$  noktasında süreklidir. Bu durumda türevlerin dalga fonksiyonlarına oranları da,

$$\frac{1}{u(x)} \frac{du(x)}{dx} \quad (4.74)$$

$x = \pm a$ 'da sürekli olacaktır. Çift çözümler için  $B = 0$  olmalıdır, tek çözümler için ise  $A = 0$  olmalıdır. Böylece çift çözümler için  $u_2(x) = A \cos qx$  ve tek çözümler için  $u_2(x) = B \sin qx$  olacaktır.

$$\frac{1}{u(x)} \frac{du(x)}{dx} = \begin{cases} u'_1/u_1 = k \\ u'_2/u_2 = -q \tan qx, & \text{çift çözümler için} \\ u'_2/u_2 = +q \cot qx, & \text{tek çözümler için} \\ u'_3/u_3 = -k \end{cases} \quad (4.75)$$

Tek ve çift çözüm durumları için elde edilen yeni süreklilik şartları  $x = -a$  veya  $x = +a$ 'da uygulanabilir. Süreklilik şartları  $x = -a$ 'da uygulanacak olursa, çift çözümler için;

$$\begin{aligned} u'_1/u_1 &= u'_2/u_2 \\ k &= -q \tan q(-a) \\ k &= q \tan qa \end{aligned} \quad (4.76)$$

tek çözümler için ise,

$$\begin{aligned} u'_1/u_1 &= u'_2/u_2 \\ k &= q \cot q(-a) \\ k &= -q \cot qa \end{aligned} \quad (4.77)$$

eşitlikleri elde edilir. Elde edilen bu eşitlikler  $a$  ile genişletilirse,

$$\begin{aligned} ka &= +qa \tan qa, & \text{çift çözümler için} \\ ka &= -qa \cot qa, & \text{tek çözümler için} \end{aligned} \quad (4.78)$$

hallerini alırlar. Hem  $k$  hem de  $q$  aslında  $E$ 'nin bir fonksiyonu olduğuna göre,

$$ka \equiv v(E) \quad \text{ve} \quad qa \equiv u(E) \quad (4.79)$$


tanımları yapılırsa,

$$v = +u \tan u \quad \text{ve} \quad v = -u \cot u \quad (4.80)$$

transandantal denklemleri elde edilir. Yeterli bir çabayla  $v$  ve  $u$  arasında,

$$v^2 + u^2 = \frac{2m}{\hbar^2} V_0 a^2 \quad (4.81)$$

ilişisinin olduğu rahatça görülebilir. Bu bir çember denklemdir. Transandantal eşitliklerden ve bu denklemden faydalanılarak



| n | $E_n$     | $u(E_n)$ | $v(E_n)$ | Parite |
|---|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | -34.48179 | 1.43973  | 11.74424 | Çift   |
| 2 | -32.89916 | 2.89886  | 11.47156 | Tek    |
| 3 | -30.29412 | 4.33861  | 11.00802 | Çift   |
| 4 | -26.66667 | 5.77350  | 10.32796 | Tek    |
| 5 | -22.04482 | 7.19866  | 9.39038  | Çift   |
| 6 | -16.47059 | 8.60916  | 8.11679  | Tek    |
| 7 | -10.04202 | 9.99159  | 6.33783  | Çift   |
| 8 | -3.09524  | 11.29686 | 3.51866  | Tek    |

Şekil 4.15: Sonlu kuyu için  $\hbar = m = 2$  ve  $a = 2, V_0 = 35$  keyfi birimlerdeki değerleri için yukarıdaki enerji özdeğerleri bulunmuştur.

Şekil 4.14: Transandantal denklemlerin tek ve çift çözümleri.

## Kaynaklar

- [1] Z. Ficek, *Quantum Physics for Beginners* (Pan Stanford Publishing, Singapore, 2016).
- [2] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics*, 3. bs. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2003).
- [3] J. S. Townsend, *Quantum Physics, A Fundamental Approach to Modern Physics* (University Science Books, Sausalito, CA, 2010).